

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Sorkil Bloc

**Type(s) de produit**

TP14: Rodenticides

**Numéro d'autorisation:** 74/12/L-000

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** LU-0001653-0000

---

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Sorkil Bloc
---------------------------------	-------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Pelsis Belgium NV
	Adresse	Industrieweg 15 B-2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation		74/12/L-000
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		LU-0001653-0000
Date de l'autorisation		29/12/2017
Date d'expiration de l'autorisation		31/12/2026

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	LARC
Adresse du fabricant	ZA de Kerampaou 29140 MELGVEN France
Emplacement des sites de fabrication	LARC site 1 ZA de Kerampaou 29140 MELGVEN France

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Difenacoum
Nom du fabricant	PELGAR INTERNATIONAL LTD
Adresse du fabricant	UNIT 13 Newman Lane GU34 2QR ALTON Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	PELGAR INTERNATIONAL LTD site 1 UNIT 13 Newman Lane GU34 2QR ALTON Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	substance active	56073-07-5	259-978-4	0,005 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation

RB Appât (prêt à l'emploi)

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H360D: Peut nuire au fœtus.</p> <p>H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ..</p>
Conseils de prudence	<p>P201: Se procurer les instructions avant utilisation.</p> <p>P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</p> <p>P260: Ne pas respirer les poussières.</p> <p>P280: Porter des gants de protection.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P501: Éliminer le contenu conformément aux réglementations en vigueur.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Souris et/ou rats - professionnels qualifiés - intérieur**

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: roof rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Rodenticide utilisé à l'intérieur, dans les bâtiments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts  Description détaillée: - appâts prêts à l'emploi, à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés - points d'appâtage couverts et protégés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: - rat : 80-200 g d'appât par points d'appât espacés de 15 mètres.- souris : 25-30 g d'appât par points d'appât espacés de 3 mètres.  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: - rat : 80-200 g d'appât par points d'appât espacés de 15 mètres. - souris : 25-30 g d'appât par points d'appât espacés de 3 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	Taille d'emballage minimale: 3 kg d'appât.  °Seau de 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Blocs dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit

---

°Cartons 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Blocs dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 150 ou 200 g de produit

°Blocs dans des boîtes d'appâtage en PE pré-remplies - pour les souris: 2\*20 g, 1\*25 g, 1\*28 g ou 1\*30 g

°Blocs dans des boîtes d'appâtage en PE pré-remplies - pour les rats: 5\*20 g, 4\*25 g, 4\*28 g, 4\*30 g, 3\*40 g, 2\*50 g, 2\*70 g, 2\*80 g, 1\*100 g, 1\*150 g ou 1\*200 g

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 4.2. Description de l'utilisation

**Tableau 2. Souris et/ou rats – professionnels qualifiés – à l'extérieur autour des bâtiments**

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: roof rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur autre: Other  à l'extérieur autour des bâtiments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés + Points d'appâts couverts et protégés  Description détaillée: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés- Points d'appâts couverts et protégés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: - rat : 80-200 g d'appât par points d'appât espacés de 15 mètres. - souris : 25-30 g d'appât par points d'appât espacés de 3 mètres.  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: - rat : 80-200 g d'appât par points d'appât espacés de 15 mètres.

	- souris : 25-30 g d'appât par points d'appât espacés de 3 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Taille d'emballage minimale: 3 kg d'appât.</p> <p>°Seau de 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Blocs dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Cartons 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Blocs dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Blocs dans des boites d'appâtage en PE pré-remplies - pour les souris: 2*20 g, 1*25 g, 1*28 g ou 1*30 g</p> <p>°Blocs dans des boites d'appâtage en PE pré-remplies - pour les rats: 5*20g, 4*25 g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g, 1*150 g ou 1*200 g</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites stratégiques pour minimiser l'exposition aux espèces non cibles

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- Ne pas placer ce produit directement dans les terriers.

#### **4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### **4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

### **4.3. Description de l'utilisation**

**Tableau 3. Souris – professionnels – intérieur**

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur

	Rodenticide à utiliser à l'intérieur des bâtiments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.  Description détaillée: Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 25 -30 g de produit par poste d'appâtage. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimale entre les postes est de 3 mètres.  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications:  25 -30 g de produit par poste d'appâtage. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimale entre les postes est de 3 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Taille d'emballage minimum 3 kg.  °Seaux 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28 ou 30 g de produit °Cartons 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28 ou 30 g de produit °Des boîtes d'appât PE pré-remplies - pour souris: 2*20 g, 1*25 g, 1*28 g ou 1*30 g

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

### 4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

### 4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

### 4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 4.4. Description de l'utilisation

**Tableau 4. Rats – professionnels – intérieur**

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: roof rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Rodenticide à utiliser à l'intérieur des bâtiments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.  Description détaillée: Appâts prêts à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: - 80 - 200 g d'appât par poste d'appâtage. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimale entre les postes devrait être de 15 mètres.  Dilution (%): -

	<p>Nombre et fréquence des applications:</p> <p>- 80 - 200 g d'appât par poste d'appâtage. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimale entre les postes devrait être de 15 mètres.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Taille d'emballage minimum 3 kg.</p> <p>°Seaux 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Cartons 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Des boites d'appât PE pré-remplies - pour rats, 5*20 g, 4*25 g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g,1*150 g ou 1*200 g</p>

#### 4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les stations d'appâtage doivent être inspectées seulement 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 4.5. Description de l'utilisation

**Tableau 5. Souris et/ou rats – professionnels – à l'extérieur autour des bâtiments**

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes  Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: roof rat Stade de développement: autre: Juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur  A l'extérieur autour des bâtiments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.  Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Rats ( <i>Rattus norvegicus</i> & <i>Rattus rattus</i> ): 80 - 200 g d'appât par station. Si plus d'une station est nécessaire, la distance minimum entre les postes devrait être de 15 metres. Souris ( <i>Mus musculus</i> ): 25 - 30 g d'appât par poste. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimum entre les postes devrait être de 3 metres.  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications:  Rats ( <i>Rattus norvegicus</i> & <i>Rattus rattus</i> ): 80 - 200 g d'appât par station. Si plus d'une station est nécessaire, la distance minimum entre les postes devrait être de 15 metres.

	Souris ( <i>Mus musculus</i> ): 25 - 30 g d'appât par poste. Si plus d'un poste est nécessaire, la distance minimum entre les postes devrait être de 3 metres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Taille d'emballage minimum 3 kg.</p> <p>°Seaux 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg, contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Cartons 3 kg, 5 kg, 7.2 kg, 10 kg contenant: Dans des sachets individuels PE ou PP, ou en vrac. - Blocs de 20, 25, 28, 30, 40, 50, 70, 80,100, 150 ou 200 g de produit</p> <p>°Des boites d'appât PE pré-remplies - pour souris: 2*20 g, 1*25 g, 1*28 g ou 1*30 g</p> <p>°Des boites d'appât PE pré-remplies - pour rats, 5*20 g, 4*25 g, 4*28 g, 4*30 g, 3*40 g, 2*50 g, 2*70 g, 2*80 g, 1*100 g,1*150 g ou 1*200 g</p>

#### 4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.

- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Ne pas utiliser directement dans les terriers.

#### 4.5.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

---

Lorsque des postes d'appâtage sont placés près des eaux de surface (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) ou à proximité de systèmes d'évacuation des eaux., assurez-vous que le contact avec l'eau est évité.

**4.5.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.5.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
  - Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
  - Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)
  - Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
  - Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
  - Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
  - L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.
  - Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
  - Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
  - Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
  - Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
  - Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
  - Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
  - Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
  - Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

## 5.2. Mesures de gestion des risques

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.

Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette eUou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»).

Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.

Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

- En cas:

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

---

- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

-Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

-Ne pas provoquer de vomissement.

-En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison (Tel.: 8002-5500)».

- Dangereux pour la faune.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- Durée de conservation : 24 mois. Conserver à moins de 25 °C.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues;

porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.