

**RO**

**ANEXĂ**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

BROS – momeala raticida sub forma de boabe de grau impregnate

**Tip(uri) de produs**

TP 14: Rodenticide

**Numărul autorizației:** RO/2019/0087/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-00110

**Numărul deciziei de reglementare R4BP:** RO-0008243-0000

## Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

### 1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	BROS GRÂU RATICID BROS -MOMEALA RATICIDA SUB FORMA DE B OABE DE GRÂU IMPREGNATE
--------------------------------	---

### 1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresă	Karpia 24 61-619 Poznan Polonia
Numărul autorizației		RO/2019/0087/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-0 0110
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0008243-0000
Data autorizației		30/10/2013
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

### 1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C.Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	C.Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Denumirea producătorului	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresa producătorului	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Polonia

### 1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C.Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	C.Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Dr Tezza S.r.L.
Adresa producătorului	Via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia

---

## Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

### 2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,0029 % (de greutate)

### 2.2. Tip(uri) de formulare

XX Altele: gata de utilizare: grăun#e

---

### Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol:}.
Fraze de precau#ie	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citi#i cu aten#ie #i urma#i toate instruc#iunile. P260: Nu inspira#i praful. P280: Purta#i mănuși de protecție. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Arunca#i conținutul la un centru autorizat pentru colectarea de#eurilor.. P501: Arunca#i recipientul la un centru autorizat pentru colectarea de#eurilor..

## Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

### 4.1. Descrierea utilizării

**Tabel 1. Utilizare #1 - Șoareci de casă și șobolani bruni- Publicul larg - în interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte  Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior  în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală  Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #oareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică #i 10 m în caz de infestare slabă). #obolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică #i 10 m în caz de infestare slabă).  Diluare (%): 0  Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioni#ti)
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea maximă a pachetului: 150g. Numar de cutii pentru momeală #i / sau rezerve per pachet: până la 150g Gramajul momealilor din cutii #i/sau rezerve: plicule#e individuale de 10 până la 100 grame. Material: carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

---

--	--

#### **4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare**

- Monitorizați cutiile pentru momeală și consumul de momeală, realimentați cutiile și îndepărtați rozătoarele moarte cel puțin o dată la 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv o dată la 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar după aceea cel puțin o dată pe săptămână.

- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

#### **4.1.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare**

a se vedea secțiunea 5.2

#### **4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

a se vedea secțiunea 5.3

#### **4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

a se vedea secțiunea 5.4

—

#### 4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

#### 4.2. Descrierea utilizării

**Tabel 2. Utilizare #2 - Șobolani bruni - Publicul larg - În exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Dimensiunea maximă a pachetului: 150g. Numar de cutii pentru momeală și / sau rezerve per pachet: până la 150g Gramajul momealilor din cutii și/sau rezerve: plicule individuale de 10 până la 100 grame. Material: carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

---

--	--

#### **4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare**

- Plasa#i cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocui#i orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de ac#iunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte #i pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumple#i cu momeală, dacă este necesar.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

#### **4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

a se vedea sec#iunea 5.2

#### **4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

a se vedea sec#iunea 5.3

#### **4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

a se vedea sec#iunea 5.4



#### 4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

#### 4.3. Descrierea utilizării

**Tabel 3. Utilizare #3 - Șoareci de casă - Uz profesional - în interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în plicule#e sau ca momeală vrac
Rata (ratele) și frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg Numar de pungi individuale per ambalaj: până la 10 kg.

	<p>Grame de momeală per pungă: plicule#e individuale de 10 până la 60 g.</p> <p>Materiale de ambalaj: pungi, saci, găle#i, tuburi, sticle #i cutii de carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE, sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC.</p> <p>Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar men#ionat mai sus.</p>
--	--

#### **4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare**

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate la cel pu#in 2-3 zile la începutul tratamentului #i cel pu#in săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte #i pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Re-umple#i cu momeală dacă este necesar.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

#### **4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

a se vedea sec#iunea 5.2

#### **4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

- Atunci când plasa#i cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### **4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

a se vedea secțiunea 5.4

#### 4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

#### 4.4. Descrierea utilizării

**Tabel 4. Utilizare #4 - Șobolani bruni - Uz profesional - în interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în plicule#e sau ca momeală vrac
Rata (ratele) și frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: -

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Dimensiunea minimă a ambalajului: 3kg  Numar de pungi individuale per ambalaj: până la 10 kg.  Grame de momeală per pungă: pliculele individuale de 10 până la 100 g.  Materiale de ambalaj: pungi, saci, gălele, tuburi, sticle și cutii de carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE, sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC.</p> <p>Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.</p>

#### 4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

#### 4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

#### 4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

–

#### 4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

### 4.5. Descrierea utilizării

**Tabel 5. Utilizare #5 - Șobolani bruni - Uz profesional - În exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în plicule#e sau ca momeală vrac
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs per punct de momeală la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distan#a minimă dintre cutii

	<p>trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă).</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>-</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Marimea minimă a ambalajului: 3kg</p> <p>Numar de pungi individuale per ambalaj: până la 10 kg.</p> <p>Grame de momeală per pungă: pliculele individuale de 10 până la 100 g.</p> <p>Materiale de ambalaj: pungi, saci, gălele, tuburi, sticle și cutii de carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE, sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC.</p> <p>Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.</p>

#### 4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici (de ex.. Ploaie, zăpadă, etc). Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

#### 4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

---

#### 4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

–

#### 4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

### 4.6. Descrierea utilizării

**Tabel 6. Utilizare #6 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - în interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte  Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile și Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior

	în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliata: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în plicule#e sau ca momeală vrac
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală; #oareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Marimea minimă a ambalajului: 3kg Numar de pungi individuale per ambalaj: până la 10 kg. Grame de momeală per pungă: plicule#e individuale de 10 până la 100 g. Materiale de ambalaj: pungi, saci, găle#i, tuburi, sticle #i cutii de carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE, sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC. Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar men#ionat mai sus.

#### 4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărta#i produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

#### 4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informa#i persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . #i ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Lua#i în considerare măsuri preventive (de ex. astupa#i găurile, îndepărta#i poten#ialele surse de mâncare #i apă pe cât posibil) pentru a îmbunătă#i aportul de momeală #i reducerea posibilită#ii de reapari#ie a invaziei.



---

- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală;

- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.

- Folosiți acest produs doar în interior și în spații inaccesibile pentru copii sau animale non-#intă.

#### **4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

#### **4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

a se vedea secțiunea 5.4

–

#### **4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

a se vedea secțiunea 5.5

### **4.7. Descrierea utilizării**

**Tabel 7. Utilizare #7 - Șobolani bruni - Uz profesional instruit - În exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolani bruni Etapă de dezvoltare: altele: Juvenile #i Adulte
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în plicule#e sau ca momeală vrac
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Marimea minimă a ambalajului: 3kg Numar de pungi individuale per ambalaj: până la 10 kg. Grame de momeală per pungă: plicule#e individuale de 10 până la 100 g. Materiale de ambalaj: pungi, saci, găle#i, tuburi, sticle #i cutii de carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE, sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC. Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar men#ionat mai sus.

#### 4.7.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Proteja#i momeala de ac#iunea factorilor atmosferici. Plasa#i punctele pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocui#i orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de ac#iunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărta#i produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respecta#i orice instruc#iuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
- Purta#i mănu#i de protec#ie din cauciuc în timpul manipulării.

---

#### **4.7.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului acestea vor fi colectate și îndepărtați cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală;
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

#### **4.7.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

#### **4.7.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

a se vedea secțiunea 5.4

–

#### **4.7.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

a se vedea secțiunea 5.5

---

---

## Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucțiuni de utilizare

#### Utilizare generală

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Înainte de utilizarea rodenticidelor, mai întâi aplicați metode non- chimice (de ex. capcane) .
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Nu deschideți pliculețele cu momeală.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă șinta momelii.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Nu plasați cutiile cu momeală lângă scurgeri unde acestea pot intra în contact cu apa.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Momelile trebuie asigurate astfel încât acestea să nu fie scoase din cutiile cu momeală.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.

#### Uz profesionist

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și avertiza că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă șinta momelii.
- Plasați produsul în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.

---

<sup>1</sup>Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Dacă cantitatea de aport de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare amplasarea mai multor cutii pentru momeală și posibilitatea de a trece la o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru minimizarea prafului (ex. #tergere cu cârpa udă).

### **Uz profesionist instruit**

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și a avertiza că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă șinta momelii.
- Plasați produsul pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Se va împiedica pătrunderea în sol, în apele de suprafață, în sistemele de canalizare sau în pânza freatică.
- Purtați mănuși de protecție din cauciuc în timpul manipulării.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Frecvența vizitelor în zona tratată este stabilită de operator, luând în considerare inspecția desfășurată la începutul tratamentului. Frecvența trebuie să fie consecventă cu recomandările oferite de codul de bune practici.
- Dacă cantitatea de aport de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare amplasarea mai multor cutii pentru momeală și posibilitatea de a trece la o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru minimizarea prafului (ex. #tergere cu cârpa udă).

---

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

### **Utilizare generală**

- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu se spală suporturile de momeală cu apă, între aplicații.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
  - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex. "utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
  - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului ( de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului acestea vor fi colectate și îndepărtați cel puțin de fiecare dată când se verifica suporturile de momeală;
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

### **Uz profesionist**

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului acestea vor fi colectate și îndepărtați cel puțin de fiecare dată când se verifica suporturile de momeală;
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați anticoagulantul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
  - produsul nu va fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru uz profesionist").
  - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex. "utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
  - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului ( de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Nu se spală suporturile de momeală cu apă, între aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

### **Uz profesionist instruit**

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar că produsul va fi furnizat doar pentru utilizare profesionistă - profesioniști care dețin o certificare care este în conformitate cu cerințele aplicabile de instruire (respectiv, „doar pentru profesioniști instruiți”).
- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă.
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.

- 
- Nu utilizați alternativ diferiți anticoagulanți cu putere comparabilă sau mai slabă, din motive de rezistență. Pentru tratament alternativ, luați în considerare un rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.
  - Nu se spală suporturile de momeală cu apă, între aplicații.
  - Îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

### **5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. La ingerare, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot include sângerări nazale și gingivale. În cazurile severe, pot apărea echimoze și prezența sângelui în urină sau fecale.
- Antidot: Vitamina K1 administrată doar de personal medical sau veterinar.
- În caz de:
  - Contact cu pielea, spălați cu apă și apoi cu apă și săpun.
  - Contact cu ochii, verificați întotdeauna dacă există lentile de contact și îndepărtați-le, clătiți ochii cu lichid de clătire sau cu apă, păstrați pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
  - Contact bucal, clătiți gura cu apă, cu atenție. Nu administrați produse pe cale orală unei persoane care și-a pierdut cunoștința. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Telefon de urgență: +40 - 021 318 36 06. Consultați un chirurg veterinar la ingerarea de către animale de companie.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mutați și nu deschideți"; "conține rodenticid"; "denumire comercială sau număr autorizație "; "substanță/ e activă/ e" și "în caz de accident, contactați un centru toxicologic +40 - 021 318 36 06"
- Periculos pentru fauna

### **5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid. Ambalajele, resturile de produs, cutiile pentru momeală folosite și rozătoarele moarte trebuie eliminate ca deșeurile periculoase în conformitate cu legislația locală. Datorită riscului de boli transmise de rozătoare, evitați contactul cu pielea, utilizați mănuși sau unelte.

### **5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

- Produsul se va păstra în ambalajul original, închis etanș, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, sigur și inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și animalelor care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare. Protejați de lumina directă. Nu depozitați împreună cualimente, băuturi sau furaje.



---

- Durata de via#ă la raft: doi ani

---

## Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Datorită acțiunii întârziate, rodenticidele cu anticoagulant sunt eficiente la 4 până la 10 zile de la consumarea momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente cum ar fi cleștii pentru preluarea acestora.
- Acest produs conține un agent amar și un colorant.

### Etichetarea produsului completă mai jos:

GHS08

Atenție

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) în caz de expunere prelungită sau repetată.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P260 Nu inspirați praful.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor.