

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

RACO rágcsálóirtó szemes csalétek

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2013-MA-14-00032-0000

R4BP eszközszám: HU-0001451-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	RACO rágcslóírtó szemes csalétek
------------------	----------------------------------

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	ARMOSA TECH SA
	Cím	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgium
Az engedély száma		HU-2013-MA-14-00032-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0001451-0000
Az engedély megadásának dátuma		30/09/2011
Az engedély lejáratának dátuma		31/12/2026

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	ARMOSA SA
A gyártó címe	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium
Gyártási helyek	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Difenakum
A gyártó neve	Pelgar
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR ALTON HANTS Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Prazka 28002 Kolin Csehország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	hatóanyag	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	<p>H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.</p> <p>H373: Károsíthatja a szerveket , ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér).</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.</p> <p>P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.</p> <p>P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: por.</p> <p>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Elzárva tárolandó.</p> <p>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.</p>

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - házi egerek és patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: - házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: - vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: - házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó, felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Egerek irtásakor:</u> 20-30 g csalétek/csalétekállomás, a csalétekállomások között legalább 2 méternek kell lennie. <u>Patkányok irtásakor:</u> 90-100 g csalétek/csalétekállomás, a csalétekállomások között legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Forgalomba kerülő kiserelés tömege 2,5 kg - 10 kg, amelyben a szemes csalétek egyenként PE/PP tasakokban kerülnek becsomagolásra: - 10 g, 25 g, 50 g, 100 g vagy ömlesztve kiserelési egységként.

	<p>A csomagolás külön-külön zacskókban/zsákokban, a forgalomba kerülő kiszerelés tömege 2,5 kg - 10 kg</p> <p>Csomagolás formája:</p> <ul style="list-style-type: none">- vödör (PP, PE): a forgalomba kerülő kiszerelés tömege 2,5 kg - 10 kg- zacskó (PE/PP) kartondobozban: a forgalomba kerülő kiszerelés tömege 2,5 kg - 10 kg- papírsák PE belső réteggel (ömlesztett csalétek): a forgalomba kerülő kiszerelés tömege 2,5 kg - 10 kg
--	---

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

Egerek irtásakor: __

Rendszeresen ellenőrizze a csalétek állomásokat, a kihelyezés első 10-14 napja közben, és pótolja az elfogyasztott csalétket, vízzel érintkezett vagy szennyezett csalétket cserélje ki.

Patkányok irtásakor:

Ne mozgassa el a kihelyezett csalétek állomását. Amennyiben nem tapasztal aktivitást a kihelyezett csalétek állomás körül 7-10 napon belül, helyezze át a csalétek állomását nagyobb aktivitást mutató területre.

Amennyiben minden csalétek elfogyott és a fertőzés továbbra is fennáll, helyezzen ki több csalétek pontot. A csalétek állomásban a csalétek mennyiségét ne növelje.

A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

Ne alkalmazza a terméket pulzáló/ritmikus kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - egerek és patkányok- szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtó termékek esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: - házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: - vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és érett egyedek Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: - házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és érett egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Egerek irtásakor:</u> 20-30 g csalétek/csalétekállomás, a csalétekállomások között legalább 2 méternek kell lennie. <u>Patkányok irtásakor:</u>

	90-100 g csalétek/csalétekállomás, a csalétekállomások között legalább 5 méternek kell lennie. Az üregekbe 90-100 g csalétek kerüljön üregenként.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Legkisebb csomagolásméret: 2.5 kg Legnagyobb csomagolási méret: 10 kg Az egyes csalétek egyenként PE/PP tasakokban csomagolva : 10 g, 25 g, 50 g, 100 g vagy ömlesztve A csomagolás külön-külön zacskókban/zsákokban, legfeljebb 10 kg-ig. Csomagolóanyagok: - vödör (PP, PE) - zacskó (PE/PP) kartondobozban - papírzák PE belső réteggel (ömlesztett csalétek)

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Egerek irtásakor:

Rendszeresen ellenőrizze a csalétek állomásokat, a kihelyezés első 10-14 napja közben, és pótolja vagy cserélje ki az elfogyasztott, elázott vagy szennyezett csalétket.

Patkányok irtásakor:

Ne mozgassa el a kihelyezett csalétek állomást. Amennyiben nem tapasztal aktivitást a kihelyezett csalétek állomás körül 7-10 napon belül, helyezze át a csalétek állomást nagyobb aktivitást mutató területre.

Amennyiben minden csalétek elfogyott és a fertőzés továbbra is fennáll, helyezzen ki több csalétek tálcát. A csalétek állomásokban a csalétek mennyiségét ne növelje.

Védje a csalétket a légköri viszonyoktól (pl. eső, hó), elázástól. Ne nyissa fel a csalétket tartalmazó zacskókat. A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket vagy a csalétek állomásokat.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket folyamatos kihelyezéssel a rágcsálófertőzés megelőzése vagy a rágcsálók aktivitásának megfigyelése céljából.

4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéri nyílt területek és szeméttelpek (hulladéklerakók)

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtó termékek esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: - vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Rattus rattus</i> Közhasználatú név: egyéb: - házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: - fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás egyéb: Other Kültéri nyílt területek Hulladéklerakók
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása

	Részletes leírás: Használatra kész csalétek zárt, felnyitás ellen védett csalétekállomásokban
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Patkányok irtásakor:</u> 90-100 g csalétek/csalétekállomás, a csalétekállomások között legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Legkisebb csomagolásméret: 2.5 kg Az egyes csalétek egyenként PE/PP tasakokban csomagolva : 10 g, 25 g, 50 g, 100 g vagy ömlesztve A csomagolás külön-külön zacskókban/zsákokban, legfeljebb 10 kg-ig. Csomagolóanyagok: - vödör (PP, PE) - zacskó (PE/PP) kartondobozban - papírzásák PE belső réteggel (ömlesztett csalétek) Csomagolás mérete: 2.5 kg - 25 kg

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Ne mozdítsa el a kihelyezett csalétek állomást. Amennyiben nem tapasztal aktivitást a kihelyezett csalétek állomás körül 7-10 napon belül, helyezze át a csalétek állomást nagyobb aktivitást mutató területre.

Amennyiben minden csalétek elfogyott és a fertőzés továbbra is fennáll, helyezzen ki több csalétek tálcát. A csalétek állomásokban a csalétek mennyiségét ne növelje.

Védje a csalétket a légköri viszonyoktól (pl. eső, hó), elázástól. Ne nyissa fel a csalétket tartalmazó zacskókat. A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket vagy a csalétek állomásokat.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat

Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket folyamatos kihelyezéssel a rágcslófertőzés megelőzése vagy a rágcslók aktivitásának megfigyelése céljából.

4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékokat). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.

Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.

A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.

A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.

Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadást gátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadást gátló rágcsálóirtó használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak, ezért a tetemeiket ne fogja meg csupasz kézzel. Használjon védőkesztyűt vagy fogóeszközt, amikor eltávolítja a tetemeiket.

A termékszemek kiömlésének elkerüléséhez helyezze a csalétket az etetőtálcába, csalétekállomásba és használjon adagoló eszközt. Minimalizálja a termék porlását, kiszóródását (pl. nedves feltöréssel).

Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.

Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább - A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.

A csalétekállomásokat és a kihelyezéshez használt szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.

A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtószert tartalmaz”; „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)”.

Továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenmérget, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon.

Megjegyzés:

A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

Ellenszer: kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Továbbá:

- Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

- Szembe kerülés esetén: óvatosan öblítse ki a nyitott szemet, legalább 10 percen keresztül. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.

- Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel.

Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Az eredeti csomagolásban, lezárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 24 hónap.

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

II. forgalmi kategóriájú irtószer

Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00032-0000

A rágcsálóirtó csomagoláson feltüntetendő az alábbi szöveg:

Hatóanyaga: 0,005 % difenakum

Ellenszere: K1-vitamin

Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00032-0000