



Bratislava, 25. februára 2021
Naša značka: 30373/2021-4320-40949
Ref. číslo: bio/645/O/21/DM

DODATOK č. 2
k rozhodnutiu o obnove autorizácie biocídneho výrobku
č. SK16-MRS-003
Názov výrobku: Ratimor Brodifacoum Wax Blocks

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) oznámením administratívnych zmien identifikačné číslo BC-RU064228-05 predloženým dňa 29. januára 2021 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovaných podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 1, Oddiel 2, položka 2 ako „*Pridanie názvu k biocídnemu výrobku, ak neexistuje riziko zámieny s názvami iných biocídnych výrobkov.*“ došlo podľa článku 6 ods. 3, druhý pododsek nariadenia o zmenách k zmene biocídneho výrobku. V zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o obnove autorizácie č. bio/1215/O/18/RM zo dňa 16. mája 2018, zmenené dodatkom č. 1 bio/2177/O/19/DB zo dňa 11.10.2019 mení v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/1215/O/18/RM zo dňa 16. mája 2018, zmenené dodatkom č. 1 bio/2177/O/19/DB zo dňa 11.10.2019 o obnove autorizácie biocídneho výrobku **Ratimor Brodifacoum Wax Blocks** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
generálny riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko**

Príloha 1

Bratislava, 25. februára 2021
Naša značka: 30373/2021-4320-40949
Ref. číslo: bio/645/O/21/DM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	Ratimor Brodifacoum Wax Blocks
Obchodné názvy výrobku	Ratimor Brodifacoum Wax Blocks Glodacid Plus parafínové bloky Brodifakum parafínové bloky Ratimor Brodifacoum parafínové bloky

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Unichem d.o.o
	Adresa	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Číslo autorizácie	SK16-MRS-003	
R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.	BC-MK024525-38	
Dátum obnovy autorizácie	16. mája 2018	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	09. apríla 2023	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Unichem d.o.o
Adresa výrobcu	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Brodifakum
Názov výrobcu	Activa Srl
Adresa výrobcu	Via Feltre 32, 20132 Milan, Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22, 37050 S.Maria di Zevio, Taliansko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Účinná látka	56073-10-0	259-980-5	0,0029

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P260 Nevdychujte prach. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/lekársku starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 20g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 100g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej

	<p>staničke na myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 100g.</p> <p>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 100g.</p>
--	--

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p>
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách

	odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g. - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g.

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť 5.5.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g. - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g.

	- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g.
--	---

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.4. Opis použitia

Použitie 4 – Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový	Minimálna veľkosť balenia 3 kg.

materiál	<p>Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.</p> <p>Voľné bloky (5g - 20g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénoch (PE) alebo polypropylénoch (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 2 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.
----------	--

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.5. Opis použitia

Použitie 5 – Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel

hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.6. Opis použitia

Použitie 6 – Myš domová a/alebo potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.

Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 60g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternosnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky sa majú kontrolovať [v prípade myší – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrázde, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.7. Opis použitia

Použitie 7 – Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p>
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou.
Dávkovanie a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p>
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.</p> <p>Voľné bloky (5g - 60g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo

	jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.
--	---

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Ak sa používa pri pulznom umiestňovaní návnad: Nahraďte skonsumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7 dňových intervaloch. Pozbierajte rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.

4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.8. Opis použitia

Použitie 8 – Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá

	<p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá</p>
Oblasti použitia	<p>Vonkajšie Vonku okolo budov</p>
Spôsoby aplikácie	<p>Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.</p>
Dávkovanie a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p>
Kategória používateľov	<p>Vyškolený profesionál</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p>

4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternosťnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Ak sa používa pulzné umiestnenie návnad: Nahraďte skonsumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7-dňových intervaloch. Pozbierajte rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.

Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia cieľových druhov zvierat.

Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu: Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia cieľových druhov zvierat a detí. Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

4.8.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

4.8.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.9. Opis použitia

Použitie 9 – Potkany – profesionáli – kanalizácie

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: Mladé zvieratá, dospelé zvieratá
Oblasti použitia	Kanalizácie
Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použiť do 200g návnady na šachtu. Počet a časový rozvrh aplikácie:

	Pri vysokom zamorení použiť 200g na šachtu.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.</p> <p>Voľné bloky (10g - 200g):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 10g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 10g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.9.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavené.

4.9.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Umiestnite návnady len do stokových systémov, ktoré sú pripojené na čistiareň odpadových vôd.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

4.9.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.9.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.9.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zväziť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky a zabráňte ich kontaktu s pokožkou.

Zabráňte kontaktu s pokožkou pri odstraňovaní zvyškov návnady.

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zväzťe použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zväzťe tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staníčky.

Trénovaní profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staníčky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staníčky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staníčky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia kontroly deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zväzťe presun deratizačných staníčiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zväzťe použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu.

Zväzťe tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Široká verejnosť:

Zväzťe preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staníčkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staníčkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné staníčky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staníčky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo

dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné stanice.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne). [Ak je to náležité, uveďte ak sa vyžaduje častejšia alebo každodenná kontrola].

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

- Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“)

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné stanice s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné stanice podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné stanice s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

Trénovaní profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie [Pokiaľ nie je autorizované trvalé umiestnenie návnady].

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie.

Na sriedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom

- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút

- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu

výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajú na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo. Farbivo môže byť buď Durazol red 2BN 110 liquid alebo Ecozol blue N liquid v koncentrácii 0,08% w/w.

V prípade kombinovaného balenia pre myši a potkany pre neprofesionálnych užívateľov je maximálne množstvo návnad na jedno balenie 300 g.

- koniec dokumentu -