

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: OFF!® rozprašovač

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0011294-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0011294-0000

Obsah

| | |
|---|---|
| Administrativní informace | 1 |
| 1.1. Obchodní název přípravku | 1 |
| 1.2. Držitel povolení | 1 |
| 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků | 1 |
| 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek | 2 |
| 2. Složení přípravku a jeho typ složení | 2 |
| 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product | 2 |
| 2.2. Typ složení přípravku | 2 |
| 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení | 2 |
| 4. Povolené(á) použití | 3 |
| 5. Obecná pravidla pro používání | 5 |
| 5.1. Pokyny pro používání | 5 |
| 5.2. Opatření ke zmírnění rizika | 5 |
| 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy | 5 |
| 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu | 5 |
| 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování | 5 |
| 6. Další informace | 5 |

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

| |
|----------------------------|
| OFF!® rozprašovač |
| Autan® Protect rozprašovač |
| OFF!® Protect rozprašovač |
| OFF!® Junior rozprašovač |
| Autan® Junior rozprašovač |
| Autan® rozprašovač |

1.2. Držitel povolení

| | | |
|---|-----------------|--|
| Jméno (název) a adresa držitele povolení | Jméno (název) | S.C. Johnson s.r.o. |
| | Adresa | Radlicka 519-16 150 00 Praha 5 Česká republika |
| Číslo povolení | CZ-0011294-0000 | |
| Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 | CZ-0011294-0000 | |
| Datum udělení povolení | 18/08/2017 | |
| Datum skončení platnosti povolení | 20/02/2027 | |

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

| | |
|----------------------------------|---|
| Název výrobce | S.C. Johnson Europlant B.V. |
| Adresa výrobce | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemsko |
| Umístění výrobních závodů | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemsko |

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

| | |
|---------------------------|---|
| Účinná látka | 23 - N,N-diethyl-m-toluamid |
| Název výrobce | Vertellus Performance Materials Inc |
| Adresa výrobce | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Spojené státy |
| Umístění výrobních závodů | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Spojené státy |

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| N,N-diethyl-m-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | účinná látka | 134-62-3 | 205-149-7 | 7,2248 |

2.2. Typ složení přípravku

| |
|-------------------------------------|
| kapalina na bázi rozpouštědla (RFU) |
|-------------------------------------|

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu..

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - neprofesionální použití

| | |
|--|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | VII.2 Ochrana zdraví Repelentní přípravek k přímému použití na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET ve formě rozprašovače. Určeno pro použití širokou veřejností. |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Latinský název: Culicidae: Obecný název: komáři Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: Ixodidae: Obecný název: klíšťata Vývojové stadium: Dospělci |
| Oblast použití | Vnitřní Venkovní IV.1 Použití v interiérech (dobře větrané prostory) IV.2 Použití v exteriérech |
| Metoda(y) aplikace | Metoda: Stříkání Podrobný popis: Repelent proti komárům a klíšťatům. Až 2 hodiny po použití odpuzuje komáry, kteří mohou přenášet žlutou zimnici, horečku dengue a západonilskou horečku. Odpuzuje klíšťata až 3 hodiny po použití. |
| Aplikační dávka(y) a četnost aplikací | Míra aplikace: 1g výrobku na 645 cm ² Ředění (%): 100 Počet a načasování aplikace: U dospělých a dětí starších 12 let neaplikujte vícekrát než 3x za 24 hodin. U dětí mladších 12 let neaplikujte vícekrát než 2 krát za den. |
| Kategorie uživatelů | Široká veřejnost (neprofesionál) |
| Velikost balení a obalový materiál | 50 ml, 60 ml, 65 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml, 225 ml, 250 ml HDPE nádobka s rozprašovací pumpičkou |

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Kapalinu naneste rovnoměrně na obnaženou pokožku pomocí rozprašovací pumpičky a rozetřete rukou na části těla:
Dospělí: 5 nástříků na každou ruku, 7 nástříků na obličej, 5 nástříků na krk, 4 nástříky na horní část každého chodidla a 12 nástříků na spodní část každé nohy.
Děti starší 2 let včetně: 3 nástříky na tvář, 3 nástříky na krk, 2 nástříky na horní část každého chodidla a 3 nástříky na každé předloktí.
Nepoužívejte pro děti mladší 2 let.
Při použití na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte, vyhněte se očím a ústům.
Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let.
Nepoužívejte pod oblečením.
Nevdechujte aerosoly.
Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou.
Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách.
Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.
Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání/pobodání hmyzem.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Kapalinu naneste rovnoměrně na obnaženou pokožku pomocí rozprašovací pumpičky a rozetřete rukou na části těla.
Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.
Je určený pro neprofesionální použití.
Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.
Vyhýbejte se kontaktu s očima a ústy.
U dětí do 12 let můžete výrobek nanášet na odhalenou pokožku či oblečení max. 2 krát denně.
U dospělých nebo dětí nad 12 let můžete výrobek nanášet max. 3 krát denně.
Nepoužívejte u dětí do 2 let.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Pokyny pro první pomoc:
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem.
Nevylévejte do kanalizace.
Prázdný obal znovu nepoužívejte.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Chraňte před mrazem.
Skladujte v původním obalu.
Maximální doba skladování 3 roky.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Viz. povolená použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz. povolená použití.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz. povolená použití.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz. povolená použití.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz. povolená použití.

6. Další informace

