

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

DIFETEC P-29F

Typ(y) výrobku

PT14: Rodenticídy

Číslo autorizácie: SK17-MRS-027

Číslo položky v R4BP: SK-0017855-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	DIFETEC P-29F BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP BONIRAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP BONIRAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP BONIRAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP ZED DF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP STEGORAT NEXT PASTA FLUO-NP STEGORAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP STEGORAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP STEGORAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO BROS mäkká návnada na myši a potkany III BONITOP SENSITIVE PASTA FLUO BONITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO RataStop GARDENTOP PASTA FLUO
------------------------	---

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	ZAPI S.p.A.
	Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko
Číslo autorizácie		SK17-MRS-027
Číslo položky v R4BP		SK-0017855-0000
Dátum autorizácie		22/11/2017
Dátum skončenia platnosti autorizácie		31/12/2026

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	ZAPI S.p.A.
Adresa výrobcu	Via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Difenakum
Názov výrobcu	PM Tezza S.r.l.
Adresa výrobcu	Viale del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Taliansko

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	účinná látka	56073-07-5	259-978-4	0,0029

2.2. Typ(y) úpravy

XX Iné: Návnada na okamžité použitie: pasta

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe(krvi) H350 Môže spôsobiť rakovinu uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo; {1::}.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.</p> <p>P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.</p> <p>P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.</p> <p>P280: Noste ochranné rukavice (vyškolení profesionáli)</p> <p>P308 + P313: PO expozícii alebo podozrení z nej:: Vyhľadajte lekársku lekársku pomoc.</p> <p>P308 + P313: PO expozícii alebo podozrení z nej:: Vyhľadajte lekársku starostlivosť.</p> <p>P314: Vyhľadajte lekársku pomoc{0:pomoc ošetrenie}.</p> <p>P314: Vyhľadajte lekársku starostlivosť{0:pomoc ošetrenie}.</p> <p>P405: Uchovávajte uzamknuté.</p> <p>P501: Zneškodnite obsah odovzdaním dodávateľovi s licenciou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo na zberné miesto, s výnimkou prázdnych čistých obalov, ktoré sa môžu likvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný..</p> <p>P501: Zneškodnite nádobu odovzdaním dodávateľovi s licenciou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo na zberné miesto, s výnimkou prázdnych čistých obalov, ktoré sa môžu likvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný..</p>

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Použitie 1 – Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnadové formulácie:Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.Zakryté a chránené miesta s návnadou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 2-5 metrov. Potkany: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5-10 metrov. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba. Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Označené plastové (PP) vedro s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg. Označená kartónová krabica s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.

Označená plastová (PET) vamička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 50 g, obsahujúca návnadu pre myši – od 3 kg do 15 kg.

Označená plastová (PET) vamička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 100 g, obsahujúca návnadu pre potkany – od 3 kg do 15 kg.

Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vamičky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 50 g pre myši - od 3 kg do 15 kg.

Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vamičky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 100 g pre potkany - od 3 kg do 15 kg.

Potlačená plastová tuba (HDPE) (na použitie aplikačnou pištoľou) – 600 g v označenej kartónovej krabici alebo v označenom plastovom (PP) vedre – od 3 kg do 15 kg.

Plastové (PE) vrečko s potlačou (10/15 g vrečká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.1.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Trvalé umiestnenie návnad je striktno obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete miesta s návnadou blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.1.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.2. Opis použitia

Tabuľka 2. Použitie 2 – Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnadové formulácie:Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.Zakryté a chránené miesta s návnadou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 2-5 metrov. Potkany: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5-10 metrov. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba. Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.

Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Označené plastové (PP) vedro s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Označená kartónová krabica s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 50 g, obsahujúca návnadu pre myši – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 100 g, obsahujúca návnadu pre potkany – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 50 g pre myši - od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 100 g pre potkany - od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Potlačená plastová tuba (HDPE) (na použitie aplikačnou pištoľou) – 600 g v označenej kartónovej krabici alebo v označenom plastovom (PP) vedre – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Plastové (PE) vrecko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.</p>

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.2.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Trvalé umiestnenie návnad je striktno obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.2.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.3. Opis použitia

Tabuľka 3. Použitie 3 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 2-5 m. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba.

	Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Označená, vopred naplnená deratizačná stanička (PP) odolná proti neoprávnenej manipulácii (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 50 g.</p> <p>Označená plastová (PP, PE, HDPE) nádoba odolná voči neoprávnenej manipulácii deťmi (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 50 g.</p> <p>Kartónová krabica s potlačou so systémom opätovného uzatvárania/bez neho a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 50 g.</p> <p>Označené plastové (PP) vedro so systémom opätovného uzatvárania a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 50 g.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou - do 50 g.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou; v kartónovej krabici - do 50 g.</p> <p>Plastové (PE) vrecko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) pre myši - do 50 g.</p>

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.3.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.2.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite oddiel 5.3

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.3.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.4. Opis použitia

Tabuľka 4. Použitie 4 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5-10 m. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Označená, vopred naplnená deratizačná stanička (PP) odolná proti neoprávnenej manipulácii (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 100 g. Označená plastová (PP, PE, HDPE) nádoba odolná voči neoprávnenej manipulácii deťmi (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 150 g. Kartónová krabica s potlačou so systémom opätovného uzatvárania/bez neho a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 150 g. Označené plastové (PP) vedro so systémom opätovného uzatvárania a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – do 150 g.

Označená plastová (PET) vamička s odtrhnutelným viečkom s potlačou – do 100 g. Označená plastová (PET) vamička s odtrhnutelným viečkom s potlačou; v kartónovej krabici – do 100 g. Plastové (PE) vrečko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) pre potkany – do 150 g.

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.4.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.2.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite oddiel 5.3.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.4.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.5. Opis použitia

Tabuľka 5. Použitie 5 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Do 100 g návnady na deratizačnú staničku každých 5-10 m. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Označená, vopred naplnená deratizačná stanička (PP) odolná proti neoprávnenej manipulácii (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 100 g. Označená plastová (PP, PE, HDPE) nádoba odolná voči neoprávnenej manipulácii deťmi (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 150 g. Kartónová krabica s potlačou so systémom opätovného uzatvárania/bez neho a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) - do 150 g. Označené plastové (PP) vedro so systémom opätovného uzatvárania a vnútorným neutrálnym plastovým (PE) vreckom (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – do 150 g. Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou – do 100 g. Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou; v kartónovej krabici – do 100 g. Plastové (PE) vrecko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) pre potkany – do 150 g.

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.5.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.2.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite oddiel 5.3.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.5.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.6. Opis použitia

Tabuľka 6. Použitie 6 – Myš domová a potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady

	Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Myši: do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 2-5 metrov. Potkany: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5-10 metrov.</p> <p>Riedenie (%): 0</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba. Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba.</p> <p>Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.</p>
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Označené plastové (PP) vedro s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg. Označená kartónová krabica s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg. Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 50 g, obsahujúca návnadu pre myši – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 100 g, obsahujúca návnadu pre potkany – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 50 g pre myši - od 3 kg do 15 kg. Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 100 g pre potkany - od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Potlačená plastová tuba (HDPE) (na použitie aplikačnou pištoľou) – 600 g v označenej kartónovej krabici alebo v označenom plastovom (PP) vedre – od 3 kg do 15 kg. Plastové (PE) vrecko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.</p>

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pre myši: Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pre potkany: Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.6.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.2.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete miesta s návnadou blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.6.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

4.7. Opis použitia

Tabuľka 7. Použitie 7 – Myš domová a potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé a mladé jedince
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

<p>Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia</p>	<p>Aplikačná dávka: Myši: do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 2-5 metrov. Potkany: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5-10 metrov.</p> <p>Riedenie (%): 0</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba. Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba.</p> <p>Potkany: Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10 m od seba.</p>
<p>Kategória(-ie) používateľov</p>	<p>odborník</p>
<p>Veľkosti balenia a obalový materiál</p>	<p>Označené plastové (PP) vedro s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg. Označená kartónová krabica s vnútornou PE vložkou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg. Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 50 g, obsahujúca návnadu pre myši – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Označená plastová (PET) vanička s odtrhnutelným viečkom s potlačou, 100 g, obsahujúca návnadu pre potkany – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 50 g pre myši - od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Kartónová krabica obsahujúca označené plastové (PET) vaničky s odtrhnutelným viečkom s potlačou, každá po 100 g pre potkany - od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Potlačená plastová tuba (HDPE) (na použitie aplikačnou pištoľou) – 600 g v označenej kartónovej krabici alebo v označenom plastovom (PP) vedre – od 3 kg do 15 kg.</p> <p>Plastové (PE) vrecko s potlačou (10/15 g vrecká z filtračného papiera na čaj) – od 3 kg do 15 kg.</p>

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternosnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Pre myši: Deratizačné staničky sa majú prezerat' najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pre potkany: Deratizačné staničky sa majú prezerat' len každých 5 až 7 dní na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.7.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.7.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechý, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné stanice pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné stanice musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej stanice.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staníc/miest s návnadou na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulačného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. V prípade nevyprázdniteľných vreciek: Neotvárajte vrecká, ktoré obsahujú návnadu.

Použite špachtľu na post-aplikáciu (čistenie/likvidáciu) návnady.

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné stanice by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechý, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné stanice pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné stanice mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun miest s návnadou na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulačného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

Použite špachtľu na post-aplikáciu (čistenie/likvidáciu) návnady.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Vyškolení profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie (pokiaľ nie je autorizované trvalé umiestnenie návnady).

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulačného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou deratizačné staničky ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Široká verejnosť:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulačné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulačných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že: výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulačnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
 - zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
 - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí
- Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „DIFETEC P-29F alebo číslo autorizácie“, „účinná látka: difenakum“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Vyškolení profesionáli:

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Odporúča sa používanie rukavíc.

Široká verejnosť:

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Profesionáli:

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

-

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.
Doba použiteľnosti: 2 roky.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulačné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.