



## PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, 2013 -04- 2 6

Nr .PB/PL/2013/0071/A/MR

**LiphaTech S.A.S.**  
**Bonnel BP 3**  
**47480 Pont du Casse**  
**Francja**

## DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252, ze zm.)

**wydaje się pozwolenie nr PL/2013/0071/A/MR na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego GENERATION BLOCZKI**

**1. Nazwa produktu biobójczego:**

GENERATION BLOCZKI

**2. Rodzaj produktu (grupa produktowa):**

kat. III, gr. 14 wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych (Dz. U. Nr 16, poz. 150);

**3. Postać użytkowa produktu biobójczego:**

Bloczki, przynęta gotowa do użycia.

**4. Przeznaczenie produktu biobójczego:**

Zwalczanie myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*).

**5. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:**

LiphaTech S.A.S, Bonnel BP 3, Pont du Casse 47480, Francja

**6. Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy:**

Substancja czynna:

3-[3-(4'-bromo[1,1'bifenylo]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaft-1-yl]-4-hydroksy-2H-1-benzotiopiran-2-on/Difetialon

CAS: 104653-34-1

[zaw. 0,0025 g/100 g]

Wytwórca:

• LiphaTech S.A.S, Bonnel BP 3,  
Pont du Casse 47480, Francja

**7. Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:**

LiphaTech S.A.S, Bonnel BP 3, Pont du Casse 47480, Francja

**8. Rodzaj opakowania:**Użytkownik powszechny:

Bloczki o masie od 10 do 40 g luzem lub pakowane pojedynczo w zgrzewaną termicznie saszetkę (PP, PE), pakowane w karmniki deratyzacyjne (PP, HDPE, PS) bez możliwości otwierania/uzupełniania, do zwalczania myszy (zawierające 50 g przynęty) i szczurów (zawierające 200 g przynęty) w opakowaniu zewnętrznym:

karton (tektura) – do 1,5 kg przynęty

torba (PE) – do 1,5 kg przynęty

Bloczki o masie od 10 do 40 g pakowane pojedynczo w zgrzewaną termicznie saszetkę (PP, PE), pakowane w karmniki deratyzacyjne (PP, HDPE, PS) z możliwością otwierania/uzupełniania, do zwalczania myszy (zawierające 50 g przynęty) i szczurów (zawierające 200 g przynęty) w opakowaniu zewnętrznym:

karton (tektura) – do 1,5 kg przynęty

torba (PE) – do 1,5 kg przynęty

Bloczki o masie od 10 do 40 g pakowane pojedynczo w zgrzewaną termicznie saszetkę (PP, PE) w opakowaniu zewnętrznym:

wiaderko (PP) – do 1,5 kg przynęty

karton (tektura) z wewnętrzną wkładką (PE, PP) – do 1,5 kg przynęty

torebka (PP, PE) – do 1,5 kg przynęty

Użytkownik profesjonalny:

Bloczki o masie od 10 do 40 g luzem lub pakowane pojedynczo w zgrzewaną termicznie saszetkę (PP, PE), pakowane w karmniki deratyzacyjne (PP, HDPE, PS) bez możliwości otwierania/uzupełniania, do zwalczania myszy (zawierające 50 g przynęty) i szczurów (zawierające 200 g przynęty) w opakowaniu zewnętrznym:

karton (tektura) – od 2 do 60 karmników

torba (PE) – od 2 do 60 karmników

Bloczki o masie od 10 do 40 g luzem lub pakowane pojedynczo w zgrzewaną termicznie saszetkę (PP, PE) w opakowaniu zewnętrznym:

wiaderko (PP) – do 20 kg

torba (PP, PE) – do 4 kg przynęty

karton (tektura) z wewnętrzną wkładką (PP, PE) – do 20 kg przynęty

**9. Okres ważności produktu biobójczego:**

3 lata od daty produkcji.

**10. Zakres i warunki obrotu i stosowania produktu biobójczego:**

Produkt jest przeznaczony dla użytkowników powszechnych do stosowania wewnątrz i wokół budynków oraz dla użytkowników profesjonalnych do stosowania wewnątrz i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych.

## **11. Inne postanowienia decyzji:**

Treść etykiety stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Dodatkowe wymagania:

Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie powinna być stosowana.

Chronić przed dziećmi.

Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach.

Użytkownik profesjonalny:

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.


**Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 31.10.2014r.**

### **UZASADNIENIE**

Od uzasadnienia niniejszej decyzji odstąpiono na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ponieważ uwzględniła ona w całości żądanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Z upoważnienia Prezesa  
WICEPREZES  
ds. Produktów Biobójczych  
*Barbara Jaworska-Luczak*  
Barbara Jaworska-Luczak

Załączniki:

1. Treść etykiety dla użytkowników powszechnych
2. Treść etykiety dla użytkowników profesjonalnych

Otrzymują:

1. Strona reprezentowana przez: P. Anna Marczak, ul. Cypryjska 29, 02-761 Warszawa
2. a/a

# GENERATION BLOCZKI

## Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczków

### Stosowanie powszechne - Szczury i Myszy wewnątrz i wokół budynków

Bloczki w saszetkach w sprzedaży wraz z karmnikiem deratyzacyjnym lub bez.

Zawiera Bitrex®, substancję gorzką zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem przez ludzi.  
Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi.

#### **Substancja czynna:**

Difetialon – 0,0025 g/100g

#### **Zalecenia stosowania GENERATION BLOCZKI:**

- Wyeliminować, o ile jest to możliwe, alternatywne źródła pożywienia przed zastosowaniem produktu
- Znaleźć oznaki aktywności gryzoni, takie jak odchody, gniazda, ślady, ścieżki przebiegu, wygryzienia. Umieścić produkt jak najbliżej tych miejsc.
- Dozwolone jest jedynie stosowanie w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych, które powinny być przytwierdzone do podłoża.
- Przed zastosowaniem produktu ocenić poziom infestacji (liczebność szkodników).
- Starannie przeczytać i stosować się do instrukcji zamieszczonych na etykiecie.
- Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie powinna być stosowana.

#### **Charakterystyka GENERATION BLOCZKI:**

W formie bloczków w oparciu o antykoagulant: Difetialon.

Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach.

Do stosowania przeciwko szczurom (śniadym i wędrownym) oraz myszom domowym, wewnątrz i wokół budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem miejsc przechowywania produktów roślinnych). Produkt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu przez gryzonia. Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnienie od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania antykoagulantu i zapobiegania powstaniu nieufności innych gryzoni, dzięki czemu kontynuują konsumowanie produktu.

#### **Zalecenia stosowania GENERATION BLOCZKI:**

Noszenie rękawic jest zalecane na każdym etapie prowadzenia zwalczania. Po zakończeniu pracy zanieczyszczone rękawice należy przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Przynętę rozmieścić możliwie najbliżej śladów bytowania gryzoni (wzdłuż ścian, w pobliżu odchodów, gniazd, śladów, ścieżek przebiegu, wygryzionych miejsc). Unikać pozostawiania gryzoniom innych możliwości żywienia poprzez wyeliminowanie, w miarę możliwości, alternatywnych źródeł pokarmu w miejscu zwalczania.

Szczury i myszy mają różne zwyczaje pobierania pożywienia. Gdy szczur znajdzie źródło pożywienia, zjada z niego tak dużo, ile potrzebuje. Myszy domowe konsumują chaotycznie pobierając małe ilości pożywienia z wielu miejsc. Oznacza to, że w przypadku zwalczania myszy obszar zwalczania musi być pokryty wieloma miejscami wyłożenia przynęty.

Przynęta musi być bezpiecznie umieszczona i zabezpieczona, aby zminimalizować ryzyko spożycia przez inne zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania (w szczególności psy, koty, świnie i drób) lub dzieci. Przynętę należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie mogła ona zostać przemieszczona. Karmniki deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować.

W przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, miejsca te powinny być w trakcie deratyzacji odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia produktu powinna znajdować się informacja, że

## Treść oznakowania opakowania Stosowanie powszechne

kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia.

Liczba miejsc wyłożenia przynęty zależy od obszaru zwalczania oraz zakresu i poziomu inwazji gryzoni. Ilość przynęty w każdym miejscu wyłożenia powinna być dostosowana do odpowiedniej dawki:

### **MYSZY**

Miejsce zwalczania	Poziom infestacji	Dawki stosowania
Wewnątrz i wokół budynków	Wysoka infestacja	rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1 – 1,5 m.
	Niska infestacja	rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 2 – 3 m.

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.

### **Zalecana częstość kontroli:**

**Wewnątrz i wokół budynków:** Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

**Uzupełnianie przynęty:** Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 50g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.

### **SZCZURY**

Miejsce zwalczania	Poziom infestacji	Dawki stosowania
Wewnątrz i wokół budynków	Wysoka infestacja	rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 4 – 5 m.
	Niska infestacja	rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8 – 10 m.

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.

### **Zalecana częstość kontroli:**

**Wewnątrz i wokół budynków:** Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1- 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1- 2 tygodnie.

**Uzupełnianie przynęty:** Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 200g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.

**Produkt dostępny wyłącznie w saszetkach:** Nie otwierać saszetek i nie wyjmować z nich przynęty.

Czas zwalczania może zająć np. od 2 do 5 tygodni, w zależności od poziomu infestacji.

W czasie zwalczania regularnie wynajdywać i usuwać martwe gryzonie, przynajmniej tak często jak przynęta jest sprawdzana i uzupełniana. Zapobiegnie to problemom zdrowia publicznego oraz wtórnego zatrucia zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.

Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać w krótkich odstępach czasu w trakcie stosowania, co najmniej tak często jak są sprawdzane i/lub uzupełniane karmniki z przynętą.

Po zakończeniu zwalczania całą pozostałą przynętę usunąć i utylizować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu. Chronić przed dostępem dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.

### **PIERWSZA POMOC :**

## Treść oznakowania opakowania Stosowanie powszechne

**Skutki uboczne połknięcia:** brak natychmiastowych skutków ubocznych, działanie opóźnione, blednięcie błon śluzowych (usta, powieki) krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, krwioplucie, liczne lub rozległe krwiaki, na ogół nagłe wystąpienie bólu trzewnego. W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie powodować wymiotów. Natychmiast udać się do lekarza i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody przez 15-20 minut. Soczewki kontaktowe wyjąć po 5 minutach i kontynuować płukanie oka. W kontakcie ze skórą, przemyć wodą z mydłem. W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. Wskazania dla lekarza: Produkt zawiera antykoagulant, podawanie witaminy K1 może być konieczne przez dłuższy okres czasu. W razie wypadku natychmiast skontaktować się z pogotowiem lub Centrum Zatruc aby skonsultować leczenie.

### **POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:**

Opakowania po produkcji oraz wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu, zamknięte w oznakowanym pojemniku, niewykorzystany produkt oraz padłe gryzonie traktować jako odpad niebezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (spalarnie), zgodnie z lokalnymi przepisami. Opakowania nie mogą być ponownie wykorzystywane, w tym także jako surowce wtórne.

Unikać zrzutów do środowiska. W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów.

### **INFORMACJE PRAWNE:**

Nazwa produktu: GENERATION BLOCZKI

Pozwolenie Nr: z dnia

Podmiot odpowiedzialny: Lipha Tech S.A.S., Bonnel BP 3, 47480 Pont Du Casse (Francja)

Substancja czynna: 25 mg/kg difetialonu (0,0025%) (CAS 104653-34-1)

Postać użytkowa produktu: gotowa do stosowania przynęta w formie bloczków

Typ produktu: PT 14 rodentycyd

Rodzaj użytkownika: stosowanie powszechne

Zwalczane organizmy: szczury (wędrowny i śniady), myszy domowe, młode i dorosłe osobniki

**R52/53 :** Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

### **ZALECENIA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:**

**S1/2 :** Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

**S13 :** Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

**S20/21 :** Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

**S35 :** Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

**S46 :** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

**S49 :** Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu

Produkt niebezpieczny dla psów i kotów.

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie.

Karta charakterystyki produktu jest dostępna na żądanie


Nr serii:

Zawartość netto:

Okres trwałości produktu: do 3 lat od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.

Data produkcji:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych  
Wyrobnów Medycznych  
i Produktów Biobójczych  
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa  
Regon: 015249601

Z upoważnienia Prezesa  
WICEPRZES  
ds. Produktów Biobójczych  
  
Barbara Jaworska-Luczak

2013 -04- 2 6

Treść oznakowania opakowania  
Stosowanie profesjonalne

## GENERATION BLOCZKI

Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczków.  
**Stosowanie profesjonalne - Szczury i Myszy  
wewnątrz i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych**

### PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA PROFESJONALNEGO

Bloczki w osłonie (w saszetkach) lub bez w sprzedaży wraz z karmnikiem deratyzacyjnym lub bez.

Zawiera Bitrex®, substancję gorzką zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem przez ludzi.  
Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi.

#### **Substancja czynna:**

Difetialon – 0,0025 g/100g

#### **Zalecenia stosowania GENERATION BLOCZKI:**

- Wyeliminować, o ile jest to możliwe, alternatywne źródła pożywienia przed zastosowaniem produktu.
- Znaleźć oznaki aktywności gryzoni, takie jak odchody, gniazda, ślady, ścieżki przebiegu, wygryzienia. Umieścić produkt jak najbliżej tych miejsc.
- Zaleca się stosowanie zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników deratyzacyjnych, które powinny być przytwierdzone do podłoża.
- Starannie przeczytać i stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na etykiecie.
- Przed zastosowaniem produktu ocenić poziom infestacji (liczebność szkodników).
- Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie powinna być stosowana.

#### **Dotyczy wyłącznie stosowania w kanałach ściekowych :**

Starannie przeczytać i przestrzegać zaleceń stosowania podanych poniżej.

Zwalczanie zależy od poziomu nasilenia szkodników, ocenianego na podstawie śladów stwierdzonych w czasie okresowej lub okazjonalnej inspekcji na zlecenie władz lokalnych. W przypadku stosowania w kanałach ściekowych przynęta powinna zostać umieszczona w taki sposób, by uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczenie oraz ograniczyć prawdopodobieństwo porwania jej przez strumień wody.

#### **Charakterystyka GENERATION BLOCZKI:**

W formie bloczków w oparciu o antykoagulant: Difetialon.

Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach.

Do stosowania przeciwko szczurom (śniadym i wędrownym) oraz myszom domowym, wewnątrz i wokół budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem miejsc przechowywania produktów roślinnych). Do stosowania przeciwko szczurom w kanałach ściekowych. Produkt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu przez gryzonia. Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnienie od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania antykoagulantu i zapobiegania powstaniu nieufności innych gryzoni, dzięki czemu kontynuują konsumowanie produktu.

#### **Zalecenia stosowania GENERATION BLOCZKI:**

Noszenie rękawic jest zalecane na każdym etapie prowadzenia zwalczania. Po zakończeniu pracy zanieczyszczone rękawice należy przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Przynętę rozmieścić możliwie najbliżej śladów bytowania gryzoni (wzdłuż ścian, w pobliżu odchodów, gniazd, śladów, ścieżek przebiegu, wygryzionych miejsc). Unikać pozostawiania gryzoniom innych możliwości żywienia poprzez wyeliminowanie, w miarę możliwości, alternatywnych źródeł pokarmu w miejscu zwalczania.

Szczury i myszy mają różne zwyczaje pobierania pożywienia. Gdy szczur znajdzie źródło pożywienia, zjada z niego tak dużo, ile potrzebuje. Myszy domowe konsumują chaotycznie pobierając małe ilości pożywienia z wielu miejsc. Oznacza to, że w przypadku zwalczania myszy obszar zwalczania musi być pokryty wieloma miejscami wyłożenia przynęty.

## Treść oznakowania opakowania Stosowanie profesjonalne

Przynęta musi być bezpiecznie umieszczona i zabezpieczona, aby zminimalizować ryzyko spożycia przez inne zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania (w szczególności psy, koty, świnie i drób) lub dzieci. Zalecamy takie zabezpieczenie przynęty (np. przez przykrycie płytką) aby nie mogła zostać przemieszczona. Zaleca się stosowanie karmników deratyzacyjnych, na szczury i na myszy, szczególnie w obszarach przygotowywania żywności i miejscach publicznych. Karmniki deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. Przy stosowaniu w norach, przynęty muszą być umieszczone pod ziemią i nie mogą być dostępne z jej powierzchni.

W przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, miejsca te powinny być w trakcie deratyzacji odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia produktu powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia.

Liczba miejsc wyłożenia przynęty zależy od obszaru zwalczania oraz zakresu i poziomu inwazji gryzoni. Ilość przynęty w każdym miejscu wyłożenia przynęty powinna być dostosowana do odpowiedniej dawki:

### **MYSZY**

Miejsce zwalczania	Poziom infestacji	Dawki stosowania
Wewnątrz i wokół budynków	Wysoka infestacja	rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1 – 1,5 m.
	Niska infestacja	rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 2 – 3 m.

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.

### **Zalecana częstość kontroli:**

**Wewnątrz i wokół budynków:** Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1- 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

**Uzupełnianie przynęty:** Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 50g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.

### **SZCZURY**

Miejsce zwalczania	Poziom infestacji	Dawki stosowania
Wewnątrz i wokół budynków	Wysoka infestacja	rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 4 – 5 m.
	Niska infestacja	rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8 – 10 m.
W kanałach ściekowych		rozstawić do 200 g przynęty przytwierdzonej za pomocą drutu do drabiny w każdym szybie kanału ściekowego.

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykladać w sposób przypadkowy.

### **Zalecana częstość kontroli:**

**Wewnątrz i wokół budynków:** Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie.

**Kanały ściekowe:** Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc.

**Uzupełnianie przynęty:** Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 200g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.



## Treść oznakowania opakowania Stosowanie profesjonalne

**W przypadku produktu sprzedawanego z karmnikiem deratyzacyjnym:** Umieść zalecaną ilość bloczków (w zależności od ich wielkości) w karmniku deratyzacyjnym, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi powyżej.

**W przypadku produktu sprzedawanego w saszetkach:** Nie otwierać saszetek i nie wyjmować z nich przynęty.

Czas zwalczania podlega ocenie wykwalifikowanego pracownika firmy deratyzacyjnej i w zależności od poziomu inwazji może zająć od 2 do 5 tygodni. W czasie zwalczania regularnie wynajdywać i usuwać martwe gryzonie, przynajmniej tak często jak przynęta jest sprawdzana i uzupełniana. Zapobiegnie to problemom zdrowia publicznego oraz wtórnego zatrucia zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać w trakcie stosowania, w krótkich odstępach czasu, co najmniej tak często jak są sprawdzane i/lub uzupełniane karmniki z przynętą. Po zakończeniu zwalczania całą pozostałą przynętę usunąć i utylizować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu. Chronić przed dostępem dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.

### **PIERWSZA POMOC :**

**Skutki uboczne połknięcia:** brak natychmiastowych skutków ubocznych, działanie opóźnione, błędnięcie błon śluzowych (usta, powieki), krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, krwioplucie, liczne lub rozległe krwiaki, na ogół nagłe wystąpienie bólu trzewnego. W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie powodować wymiotów. Natychmiast udać się do lekarza i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody przez 15-20 minut. Soczewki kontaktowe wyjąć po 5 minutach i kontynuować płukanie oka. W kontakcie ze skórą, przemyć wodą z mydłem. W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. Wskazania dla lekarza: Produkt zawiera antykoagulant, podawanie witaminy K1 może być konieczne przez dłuższy okres czasu. W razie wypadku natychmiast skontaktować się z pogotowiem lub Centrum Zatruc aby skonsultować leczenie.

### **POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:**

Opakowania po produkcie oraz wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu, zamknięte w oznakowanym pojemniku, niewykorzystany produkt oraz padłe gryzonie traktować jako odpad niebezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (spalarnie), zgodnie z lokalnymi przepisami. Opakowania nie mogą być ponownie wykorzystywane, w tym także jako surowce wtórne.

Unikać zrzutów do środowiska. W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów.

### **INFORMACJE PRAWNE:**

Nazwa produktu: GENERATION BLOCZKI

Pozwolenie Nr: z dnia

Podmiot odpowiedzialny: Lipha Tech S.A.S., Bonnel BP 3, 47480 Pont Du Casse (Francja)

Substancja czynna: 25 mg/kg difetialonu (0,0025%) (CAS 104653-34-1)

Postać użytkowa produktu: gotowa do stosowania przynęta w formie bloczków

Typ produktu: PT 14 rodentycyd

Rodzaj użytkownika: stosowanie profesjonalne

Zwalczane organizmy: szczury (wędrowny i śniady) i myszy (domowe), młode i dorosłe osobniki

**R52/53 :** Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

### **ZALECENIA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:**

**S1/2 :** Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

**S13 :** Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

**S20/21 :** Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

**S35 :** Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

**S46 :** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Treść oznakowania opakowania  
Stosowanie profesjonalne

**S49** : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu

Produkt niebezpieczny dla psów i kotów.

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie.

Karta charakterystyki produktu jest dostępna na żądanie

Nr serii:

Zawartość netto:

Okres trwałości produktu: do 3 lat od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.

Data produkcji:

Urząd Reinsuracji Produktów Leczniczych  
Wyrobow Medycznych  
i Produktow Biobójczych  
ul. Zabkowska 41, 03-736 Warszawa  
Regon: 015249601

Z upoważnienia Prezesa  
WICEPREZES  
ds. Produktow Biobójczych

  
Barbara Jaworska-Luczak

2013 -04- 2 6