

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: ECOGEL ROACHES

Produkto tipas (-ai): PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0019165-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	16
5.1. Naudojimo instrukcijos	16
5.2. Rizikos valdymo priemonės	16
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	16
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	17
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	17
6. Kita informacija	18

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

EC GEL ROACHES
MAGNUM GEL
ROACHES GEL
ROACHES BAIT
X GEL ROACHES

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Laboratorios Econovar S.L.
	Adresas	Vía Augusta, 48 08006 Barcelona Ispanija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0019165-0000	
Autorizacijos liudijimo data	29/08/2017	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/12/2025	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	MYLVA, S.A.
Gamintojo adresas	Vía Augusta, 48 08006 Barcelona (España) Telefono: +34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344 08006 BARCELONA Ispanija
Gamybos vieta	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395- Barcelona (España) 08395 BARCELONA Ispanija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	37 - Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	ADAMA Agriculture España S.A.
Gamintojo adresas	Calle Mendez Alvaro, 20-5 28045 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Izraelis
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Kinija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 2-oktil- 2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

turinį išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus..

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 1 – Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais - neprofesionalus naudojimas buityje.

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Blattella germanica</i> Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: <i>Blatta orientalis</i> Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: <i>Periplaneta americana</i> Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Išsamus aprašymas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m ² (3-4 lašai/m ²). Juodasis tarakonas (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m ² (4-6 lašai/m ²) Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16g/m ² – 0,24 g/m ² (4-6 lašai/m ²) Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m ² (3-4 lašai/m ²). Juodasis tarakonas (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m ² (4-6 lašai/m ²) Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16g/m ² – 0,24 g/m ² (4-6 lašai/m ²)

Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.

Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Plastikinis (LDPE) švirškintas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių. Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas. Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių. Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais. Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.

Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.

Netepti ant paviršių ar indų, kurie gali liestis su pašarais ir maistu.

Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo būdas 2 Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais – profesionalus naudojimas

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: *Blattella germanica*
Bendrinis pavadinimas: German cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: *Blatta orientalis*
Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: *Periplaneta americana*
Bendrinis pavadinimas: American Cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto /kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).
Išsamus aprašymas:
Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto /kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 lašai/m²). Juodasis tarakonas (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 lašai/m²) Amerikinis tarakonas (*Periplaneta Americana*): 0,16 g/m² – 0,24 g/m² (4-6 lašai/m²)
Skiedimas (%): 0
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g).

Naminis prūsokas (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m²

(3-4 lašai/m²).

Juodasis tarakonas (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 lašai/m²)

Amerikinis tarakonas (*Periplaneta Americana*): 0,16 g/m² – 0,24 g/m² (4-6 lašai/m²)

Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.

Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Plastikinis (LDPE) švirškstas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas.

Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių.

Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo į akis ir ant odos.
Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.
Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.
Netepti ant paviršių ar indų, kurie gali liestis su pašarais ir maistu.
Naudoti tik uždarose sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimo būdas 3 – Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais – kvalifikuotas profesionalus naudojimas

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Išsamus aprašymas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklausomai nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 lašai/m²). Juodasis tarakonas (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 lašai/m²) Amerikinis tarakonas (*Periplaneta Americana*): 0,16 g/m² – 0,24 g/m²(4-6 lašai/m²)
Skiedimas (%): 0
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Dozavimas: priklausomai nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g).

Naminis prūsokas (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m²

(3-4 lašai/m²).

Juodasis tarakonas (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 lašai/m²)

Amerikinis tarakonas (*Periplaneta Americana*): 0,16 g/m² – 0,24 g/m²(4-6 lašai/m²)

Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.

Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Plastikinis (LDPE) švirškštas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

Plastikinė (LDPE) kasetė, kurioje produkto yra 15 g, 20 g, 30 g, 35 g, 40 g ar 50 g.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas.

Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių.

Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Naudojimo metu dėvėti tinkamas pirštines
Vengti patekimo į akimis ir ant odos.
Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.
Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.
Netepti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistu.
Produkto maisto pramonėje galima naudoti tik nesant maisto produktų, išskyrus sandėliavimo patalpas, kuriose laikomi produktai yra tinkamai supakuoti.
Būtina imtasi tinkamų priemonių, kad užtikrinti, jog ant maisto, įrangos ir virtuvės reikmenų, naudojamų prieš tai šiuo produktu apdorotose patalpose, nebūtų veikliosios medžiagos likučių.
Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.
Taikyti integruotus kenkėjų kontrolės metodus, kai derinamas cheminių medžiagų, fizinės kontrolės būdų ir kitų visuomenės sveikatos priemonių naudojimas, atsižvelgiant į specifines vietines sąlygas (klimatą, kontroliuojamus organizmus, naudojimo sąlygas ir kt.).
Patikrinti produkto veiksmingumą vietoje: jei reikia, iširti sumažėjusio veiksmingumo priežastis ir įsitikinti, ar nėra atsparumo, arba nustatyti galimą atsparumą.
Nenaudoti ten, kur įtariamas arba nustatytas atsparumas produktui.
Jei biocidinis produktas neveiksmingas, informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimo būdas 4 – Patalpose - Padėkliukų su masalu naudojimas – neprofesionalus naudojimas buityje.

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica
Bendrinis pavadinimas: German cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis
Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana
Bendrinis pavadinimas: American Cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpose

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas
Išsamus aprašymas:
Padėkliukų su masalu naudojimas

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m²). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m²).

Skiedimas (%): 0

Taikymo skaičius ir laikas:

Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.

Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra:

- 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m²).
- 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m²).

Naudojimo dažnis: po 4 savaičių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.

Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių.
Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.
2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.
3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.
Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.
Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Naudojimo būdas 5 – Patalpose - Padėkliukų su masalu naudojimas – profesionalus naudojimas.

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: *Blattella germanica*
Bendrasis pavadinimas: German cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: *Blatta orientalis*
Bendrasis pavadinimas: Oriental cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: *Periplaneta americana*
Bendrasis pavadinimas: American Cockroach

	Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas Išsamus aprašymas: Padėkliukų su masalu naudojimas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliam paplitimui (5 g/22 m²). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitimui (10 g/22 m²).</p> <p>Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.</p> <p>Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitimui (5 g/22 m²). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitimui (10 g/22 m²). <p>Naudojimo dažnis: po 4 savaičių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių.

Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.
2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.
3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo, padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Naudojimo būdas 6 – Patalpose- Padėkliukų su masalu naudojimas – kvalifikuotas profesionalus naudojimas

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica
Bendrinis pavadinimas: German cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis
Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana
Bendrinis pavadinimas: American Cockroach
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpose

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas
Išsamus aprašymas:

Padėkliukų su masalu naudojimas

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliam paplitimui (5 g/22 m²). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitimui (10 g/22 m²).

Skiedimas (%): 0

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m², priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.

Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra:

- 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m²).

- 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m²).

Naudojimo dažnis: po 4 savaičių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.

Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių.

Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.
2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.
3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

Taikyti integruotus kenkėjų kontrolės metodus, kai derinamas cheminių medžiagų, fizinės kontrolės būdų ir kitų visuomenės sveikatos priemonių naudojimas, atsižvelgiant į specifines vietines sąlygas (klimatą, kontroliuojamus organizmus, naudojimo sąlygas ir kt.).

Patikrinti produkto veiksmingumą vietoje: jei reikia, iširti sumažėjusio veiksmingumo priežastis ir įsitikinti, ar nėra atsparumo, arba nustatyti galimą atsparumą.

Nenaudoti ten, kur įtariamas arba nustatytas atsparumas produktui.

Jei biocidinis produktas neveiksmingas, informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį 5.3.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį 5.4.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę ar informacinį lapelį, laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Prieš naudojimą reikia įvertinti paplitimo apimtį ir vietas.

Naudoti tik patalpose.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliosios medžiagos skiriasi, kad išvengti atsparumo atsiradimo.

Masalo negalima dėti vietose, kur jis galėtų užteršti maistą, pašarus ar geriamąjį vandenį.

Produktą naudoti pakartotinai, tik kol esant kenkėjų paplitimui.

Produktą naudoti rekomenduojamais kiekiais ir intervalais.

Siekiant veiksmingo produkto naudojimo, patariama laikytis geros higienos praktikos: pašalinti ir užkirsti patekimą prie maisto šaltinių. Masalas turi būti pagrindinis prieinamas tarakonų maisto šaltinis.

Siekiant efektyvumo, tikrinti masalą kartą per savaitę ir pakeisti / papildyti, jei jis sugadintas ar užterštas.

Masalą naudoti saugiai, kad nekiltų pavojus, kad ji gali suvartoti kiti gyvūnai arba vaikai.

Nemesti produkto ant žemės, į vandens telkinius, praustuves ar kanalizaciją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. (P273).

Naudoti tik uždarose sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

Nesunaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas visas kitas atliekas (t.y. negyvus vabzdžius) šalinti pagal vietinius reikalavimus.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

- Patekus į akis, skalauti ne trumpiau kaip 15 minučių dideliu kiekiu vandens. NEPAMIRŠTI išimti kontaktinius lęšius.
- Patekus ant odos, plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, netrinti.
- Jeigu būtina, nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą ir, esant galimybei, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Nepalikti nukentėjusiojo asmens be priežiūros.

Gydymo patarimai gydytojams ir slaugos personalui

- Simptominis ir palaikomasis gydymas

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Priemonės, skirtos apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės: Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenius), kanalizaciją, drenažo sistemas ir kt., naudoti tinkamas barjerines priemones ir uždaromas drenažo sistemas.

Pasitarkite su atsakingomis tarnybomis dėl nuotėkio į vandens telkinius, drenažo sistemas ar kanalizaciją.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipyusią medžiagą absorbuoti inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaoliniu ...), surinkti į talpyklas, tinkamai paženklinti ir tvarkyti kaip pavojingas atliekas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (P501).

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikant originalioje talpykloje ir įprastomis sąlygomis, tinka naudoti 4 metus.

Laikyti originalioje talpykloje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Produktą rekomenduojama laikyti 5 - 45 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalūs vartotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Profesionalūs vartotojai: vartotojai, naudojantys biocidinius produktus darbo vietoje.

Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalūs vartotojai: vartotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buityje).

Produkto sudėtyje yra kartumo turinčios medžiagos, atgrasančios žmones ir gyvūnus.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių ir galėtų dozuoti produktą.

Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Vartotojai turi informuoti, jei produktas neveiksmingas, ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie galėtų rodyti kenkėjų atsparumo atsiradimą.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr.138261-41-3, EB 428-040-8, 2,150 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (48 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas:MYLVA, S.A., Vía Augusta, 48, ES-08006 Barcelona (Ispanija).

Liudijimas išduotas: Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barcelona (Ispanija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10008(A-18VAP393045/A-19-186), galioja iki 2022-08-29