



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2019/0010/MRA / IE/BPA 70526

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 18.11.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

- Nr. Autorizației naționale care a fost reînnoită : IE/BPA 70163, cu autorizația națională nr. **IE/BPA 70526**

II. Data emiterii autorizației : 26.11.2019

III. Data expirării autorizației : 27.04.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: MASTER RAT BAIT

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LODI S.A.S.

ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S.

ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Compagnie Générale des Biocides (CGB)

ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

ADRESA LOCULUI DE FABRICARE : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANTE ACTIVE : PelGar International Limited

ADRESA : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK

ADRESA UNITĂȚILOR DE FABRICARE : Prazska, 280 02 Kolin, Czech Republic

VI.

TIPUL DE PRODUS: TP14 Rodenticide

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : profesioniști și profesioniști instruiți.

VIII.

TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida sub formă de boabe de cereale impregnate



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

IX COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA


- 1) Substanta activa
a) *substante chimice*

Denumirea IUPAC	Bromadiolona
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substantă activă	0,005%

- 2) **Substanta inactivă/nonactivă-neprecizat**

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

- A. **Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice***

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 Pericol
Fraze de risc (H)	H360D Poate dăuna fătului. H372 Risc dovedit de efecte grave pentru organe (sânge) ca urmare a expunerilor repetate sau a unei expuneri prelungite.
Fraze de prudență P	P201 Obțineți instrucțiunile înainte de utilizare. P202 Nu manipulați produsul înainte să fi citit și înțeles toate precauțiile în materie de securitate. P260 Nu respirați praful/ aburii/gazele/ ceața/vaporii/aerosolii. P264 Spălați-vă cu grijă mâinile după manipularea produsului. P270 Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în momentul manipulării acestui produs. P280 Purtați mănuși de protecție P308+P313 ÎN CAZ de expunere dovedită sau suspectată: cereți sfatul medicului. P314 Cereți sfatul medicului în caz de boală. P405 Păstrați produsul sub cheie. P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor

XI. AMBALAREA

AMBALAREA PRODUSULUI:
Utilizatori:
Profesionali – soareci de casă / interior
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
Dimensiune minimă a pachetului: 5 kg.
Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.
Grame/kg de momeală per sac: 25 g sau în pachet ca momeală liberă.
Material de ambalare:
Recipient tip galeata (PP, PE): 25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).
Momeală liberă: 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 5,5 kg, 6 kg, 6,5 kg, 7 kg,



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.

Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.

Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP (25g): 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Profesionali - șobolani / interior

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 25g, 50 g, 100g.

Material de ambalare:

Recipient tip galeata (PP, PE):

25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25)

50g: 1 kg (20*50), 1.5 kg (30*50), 2 kg (40*50), 2.5 kg (50*50), 3 kg (60*50), 3.5 kg (70*50), 4 kg (80*50), 4.5 kg (90*50), 5 kg (100*50), 5.5 kg (110*50), 6 kg (120*50), 6.5 kg (130*50), 7 kg (140*25), 7.5 kg (150*50), 8 kg (160*50), 8.5 kg (170*50), 9 kg (180*50), 9.5 kg (190*50), 10 kg (200*50).

100g: 1 kg (10*100), 1.5 kg (15*100), 2 kg (20*100), 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)

Momeală individuală: 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.

Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.

Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP 25g, 50g, 100g:

25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

50g: 1 kg (20*50), 1.5 kg (30*50), 2 kg (40*50), 2.5 kg (50*50), 3 kg (60*50), 3.5 kg (70*50), 4 kg (80*50), 4.5 kg (90*50), 5 kg (100*50), 5.5 kg (110*50), 6 kg (120*50), 6.5 kg (130*50), 7 kg (140*25), 7.5 kg (150*50), 8 kg (160*50), 8.5 kg (170*50), 9 kg (180*50), 9.5 kg (190*50), 10 kg (200*50).

100g: 1 kg (10*100), 1.5 kg (15*100), 2 kg (20*100), 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100).

Profesionali – șoareci de casa și sau șobolani /exterior, în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 25 g sau în pachet ca momeală liberă

Material de ambalare:

Recipient tip galeata (PP, PE): : 25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Momeală liberă: 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.

Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.

Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP (25g): 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Profesionali instruiți – șoareci de casa și sau șobolani /interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 25 g sau în pachet ca momeală liberă

Material de ambalare:

Recipient tip galeata (PP, PE): : 25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Momeală liberă: 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.

Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.

Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP (25g): 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Profesionali instruiți – experți-, șoareci de casă și sau șobolani la exterior și în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 25 g sau în pachet ca momeală liberă

Material de ambalare:

Recipient tip galeata (PP, PE): : 25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Momeală liberă: 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.

Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.

Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP (25g): 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25).

Profesionali instruiți șobolani– experți – zone exterioare deschise și depozite de deseuri

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 25g, 50 g, 100g.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Material de ambalare:

Recipient tip galeata (PP, PE): 25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25) 50g: 1 kg (20*50), 1.5 kg (30*50), 2 kg (40*50), 2.5 kg (50*50), 3 kg (60*50), 3.5 kg (70*50), 4 kg (80*50), 4.5 kg (90*50), 5 kg (100*50), 5.5 kg (110*50), 6 kg (120*50), 6.5 kg (130*50), 7 kg (140*25), 7.5 kg (150*50), 8 kg (160*50), 8.5 kg (170*50), 9 kg (180*50), 9.5 kg (190*50), 10 kg (200*50)
100g: 1 kg (10*100), 1.5 kg (15*100), 2 kg (20*100), 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)
Momeală individuală: 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg and 10 kg.
Momeală liberă în cutie de carton cu căptușeală interioară din PE / ambalaje sac din hârtie cu căptușeală interioară din PE: 5 kg, 10 kg and 20 kg.
Cutie de carton/pungi căptușite PE/PP 25g, 50g, 100g:
25g: 1 kg (40*25), 1.5 kg (60*25), 2 kg (80*25), 2.5 kg (100*25), 3 kg (120*25), 3.5 kg (140*25), 4 kg (160*25), 4.5 kg (180*25), 5 kg (200*25), 5.5 kg (220*25), 6 kg (240*25), 6.5 kg (260*25), 7 kg (280*25), 7.5 kg (300*25), 8 kg (320*25), 8.5 kg (340*25), 9 kg (360*25), 9.5 kg (380*25), 10 kg (400*25)
50g: 1 kg (20*50), 1.5 kg (30*50), 2 kg (40*50), 2.5 kg (50*50), 3 kg (60*50), 3.5 kg (70*50), 4 kg (80*50), 4.5 kg (90*50), 5 kg (100*50), 5.5 kg (110*50), 6 kg (120*50), 6.5 kg (130*50), 7 kg (140*25), 7.5 kg (150*50), 8 kg (160*50), 8.5 kg (170*50), 9 kg (180*50), 9.5 kg (190*50), 10 kg (200*50)
100g: 1 kg (10*100), 1.5 kg (15*100), 2 kg (20*100), 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)

XII.

INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Poate fi utilizat în interior și exterior în jurul clădirilor, zone exterioare deschise și depozite de deseuri.

Utilizatori profesioniști: - în interior

Soareci: 25 g momeala, în stații de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mică).

Instrucțiuni de utilizare:

Pentru soareci, fixați 25 g de momeala în stații de momeala inviolabile, la distanța de 5 m (2 m pentru infestare mare) una de cealaltă, în zonele în care soarecii sunt activi.

Verificați în mod regulat consumul de momeala și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul s-a oprit.

Repetati tratamentul în situațiile în care există dovezi privind o nouă infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Soarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de combatere să mutați momeala la fiecare 2-3 zile în momentul în care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Inspectați frecvent punctele de momeala în timpul primelor 10-14 zile și înlocuiți orice momeala consumată de rozatoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată cu mizerie. Dacă din anumite zone a fost consumată toată momeala, creșteți cantitatea de momeala, punând mai multe puncte de momeala. Nu creșteți dimensiunea punctului de momeala. Înlocuiți orice



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

momeala care a fost consumata de rozatoare sau a fost deteriorata de apa sau contaminata cu mizerie.

Statiile de momeala trebuie vizitate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Reumpleti cu momeala atunci cand este necesar.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante.

Luati in considerare masurile de combatere preventiva (de ex. gauri, indepartati potentialele alimente si bauturi, pe cat posibil) pentru a imbunatati aportul produsului si pentru a reduce probabilitatea de reinfestare.

Nu utilizati acest produs pentru tratamente cu momeala permanente sau pulsate.

Inlaturati momeala ramasa sau statiile de momeala la finalul perioadei de tratament.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 50-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

Pentru sobolani, fixati 50-100 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 10 m (5 m pentru uninfestare mare) una de cealalta.

Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Nu miscati si nu deranjati statiile de momeala timp de cateva zile dupa aplicarea ei. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare.

Statiile de momeala trebuie vizitate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Reumpleti cu momeala atunci cand este necesar.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante.

Luati in considerare masurile de combatere preventiva (de ex. gauri, indepartati potentialele alimente si bauturi, pe cat posibil) pentru a imbunatati aportul produsului si pentru a reduce probabilitatea de reinfestare.

Nu utilizati acest produs pentru tratamente cu momeala permanente sau pulsate.

Inlaturati momeala ramasa sau statiile de momeala la finalul perioadei de tratament.

Utilizatori profesioniști: - exterior in jurul cladirilor

Soareci: 25 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 50-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

Pentru soareci, fixati 25 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 5 m (2 m pentru uninfestare mare) una de cealalta, in zonele in care soarecii sunt activi.

Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata cu mizerie. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala.

Pentru sobolani, fixati max. 100 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 10 m (5 m pentru unfestare mare) una de cealalta. Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Nu miscati si nu deranjati statiile de momeala timp de cateva zile dupa aplicarea ei. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala. Inlocuiti momelile din interiorul capcanelor, deteriorate de apa sau contaminate cu pamant.

Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante

Luati in considerare masurile de combatere preventiva, de ex. gauri, indepartati potentialele alimente si bauturi, pe cat posibil, pentru a imbunatati aportul produsului si pentru a reduce probabilitatea de reinfestare.

Nu utilizati acest produs pentru tratamente cu momeala permanente sau pulsate.

Inlaturati momeala ramasa sau statiile de momeala la finalul perioadei de tratament.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in interior

Soareci: 25 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 50-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

Pentru soareci, fixati 25 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 5 m (2 m pentru unfestare mare) una de cealalta, in zonele in care soarecii sunt activi.

Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata cu mizerie. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala.

Pentru sobolani, fixati 50 - 100 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 10 m (5 m pentru unfestare mare) una de cealalta. Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Nu miscati si nu deranjati statiile de momeala timp de cateva zile dupa aplicarea ei. Daca nu se



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala. Inspectati regulat punctele de momeala si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care a fost deteriorata, pana la incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete).

Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile.

Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante

Inlaturati momeala ramasa la finalul perioadei de tratament.
Nu utilizati acest produs pentru tratamente pulsatorii.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.
- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in exterior in jurul cladirilor

Soareci: 25 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu): 50-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

In vizuini: 50-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

Pentru soareci, fixati 25 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 5 m (2 m pentru unefestare mare) una de cealalta, in zonele in care soarecii sunt activi.

Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata cu mizerie. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala.

Pentru sobolani, fixati 50 - 100 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 10 m (5 m pentru unefestare mare) una de cealalta. Verificati in mod regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete). Nu miscati si nu deranjati statiile de momeala timp de cateva zile dupa aplicarea ei. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare. Daca din anumite zone a fost consumata toata momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti dimensiunea punctului de momeala. Inspectati regulat punctele de momeala si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care a fost deteriorata, pana la incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatiile in care exista



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete).

Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile.

Statiile de momeala trebuie vizitate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Reumpleti cu momeala atunci cand este necesar.

Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante
Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

Pentru aplicare directa in vizuini: Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile in vizuinile cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

Nu utilizati acest produs pentru tratamente pulsatorii.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 50-100 g momeala/statie de intoxicare.

-infestare mare: statii de intoxicare la fiecare 5 m

-infestare mica: statii de intoxicare la fiecare 10 m.

In vizuini: 50-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

Pentru sobolani, fixati 50 - 100 g de momeala in statii de momeala inviolabile, la distanta de 10 m

(5 m pentru unfestare mare) una de cealalta, sau direct in vizuina. Verificati in mod regulat

consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand consumul s-a

oprit. Repetati tratamentul in situatiile in care exista dovezi privind o noua infestare (de ex. urme

sau excremente proaspete). Nu miscati si nu deranjati statiile de momeala timp de cateva zile dupa

aplicarea ei. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati

momeala intr-o zona cu activitate mai mare. Daca din anumite zone a fost consumata toata

momeala, cresteti cantitatea de momeala, punand mai multe puncte de momeala. Nu cresteti

dimensiunea punctului de momeala.

Inspectati regulat punctele de momeala si inlocuiti orice momeala consumata de rozatoare sau care

a fost deteriorata, pana la incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatiile in care exista

dovezi privind o noua infestare (de ex. urme sau excremente proaspete).

Inspectati frecvent punctele de momeala in timpul primelor 10-14 zile.

Statiile de momeala trebuie vizitate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin

saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt

intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Reumpleti cu momeala atunci cand este

necesar.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.

Atunci cand alegeti un rodenticid pentru utilizare trebuie luata in considerare starea de rezistenta a populatiei tinta. In acele zone in care se suspecteaza dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. Pentru a combate raspandirea rezistentei, se recomanda sa alternati momeli care contin diferite ingrediente active anticoagulante
Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

Pentru aplicare directa in vizuini: Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile in vizuinile cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

Nu utilizati acest produs pentru tratamente pulsatorii.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE Pastrati recipientul original inchis etans. Depozitati in spatiu rocoros, uscat, bine ventilat, departe de actiunea directa a razelor solare. Depozitati in afara zonei de acces a copiilor, pasarilor, animalelor de casa, a celor de ferma.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE
2 ani

ALTE INFORMATII : Restrictii pentru utilizarea produsului biocid: Se va impiedica patrunderea in sol, in apele de suprafata, in sistemele de canalizare sau in apele din panza freatica . Se va aplica numai in cadrul recipientelor (spatiilor) pentru momeala asigurate si marcate in mod corespunzator. Momeala trebuie fixata astfel incat sa nu poata fi scoasa de catre rozatoare in afara statiilor.

Din cauza modului lent de actiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

Prezentă autorizație este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RȘI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative.

Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2013/0010/MRA/IE/BPA 70163+IE/BPA 70164

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca