

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

MEGALON 27 PASTA

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2022/0326/MRS/IT/2021/00732/AUT

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0028900-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	MEGALON 27 PASTA RATTIDION 27 PASTE TOPIN 27 PASTA RAT KAT 27 PASTE INDORAT 27 PASTE RODEXION 27 PASTA
--------------------------------	---

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	INDUPHARMA S.R.L
	Adresă	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE, PADOVA Italia
Numărul autorizației	RO/2022/0326/MRS/IT/2021/00732/AUT	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	RO-0028900-0000	
Data autorizației	14/12/2012	
Data de expirare a autorizației	30/12/2026	

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	INDUPHARMA S.r.l.
Adresa producătorului	Via Sorgaglia, 40 35020 Arre (PD) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Sorgaglia, 40 35020 Arre (PD) Italia

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Activa Srl
Adresa producătorului	via Feltre 32 20132 Milano Italia
Adresa locurilor de producție	Dr. Tezza s.r.l - Via Tre Ponti 22 37059 S. Maria di Zevio (VR) Italia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,0027 % (de greutate)
Denatonium benzoate	benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diazanium; benzoate	Substanță inactivă	3734-33-6	223-095-2	0,001 % (de greutate)
Calcium hidroxid	calcium; dihidroxid	Substanță inactivă	1305-62-0	215-137-3	0,375 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor (blood) în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nici o altă cale de expunere nu provoacă acest pericol: }.
Fraze de precau#ie	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: Arunca#i conținutul la national and international regulations. P501: Arunca#i recipientul la national and international regulations.

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Șoareci de casă – specialiști – la interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior -
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 60 g g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg

până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în plicule cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Șobolani – specialiști – la interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior -
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Șoareci de casă și/sau șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: - Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior La exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: House mice: 60 g de momeală per capcană. Brown rat: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): -

	Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separa#i, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.</p> <p>Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separa#i, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.</p> <p>Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separa#i, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.</p>

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Proteja#i momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasa#i capcanele în zone fără risc de inundare.

- Capcana trebuie inspectată, pentru #oareci, cel pu#in o dată la 2-3 zile de la începerea tratamentului, pentru #obolani doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal ulterior (pentru #oareci #i #obolani), pentru a vedea dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimenta#i cu momeală atunci când este necesar.

- Înlocui#i momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu introduce#i produsul direct in vizuini.

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când amplasa#i capcanele în apropierea apelor de suprafa#ă (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de iriga#ii) sau a sistemelor de scurgere a apelor, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Șoareci de casă – publicul larg – la interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Mus musculus</i> Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior -
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 60 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluaie (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până

	<p>la 150 g (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g).</p> <p>Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g).</p>
--	---

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Șobolani – publicul larg – la interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior -
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g). Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculele cu greutatea de 10-20 g).

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Șobolani – publicul larg – la exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior Outdoor around buildings
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g).

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în plicule#e cu greutatea de 10-20 g).

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Amplasa#i capcanele în zone fără risc de inundare.
- Înlocui#i momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.
- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimenta#i cu momeală atunci când este necesar.

4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consulta#i „Instruc#iuni generale de utilizare

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consulta#i „Instruc#iuni generale de utilizare

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consulta#i „Instruc#iuni generale de utilizare

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Consulta#i „Instruc#iuni generale de utilizare

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Specialiști

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate a acestora și a determina cauza și amploarea infestării.
- Îndepărtați hrana care este ușor accesibilă rozătoarelor (ex. cereale vrac sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem integrat de combatere a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (de exemplu astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum a produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată prezența rozătoarelor (de exemplu căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate de sol sau pe alte structuri.
- Capcanele trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că ele conțin rodenticide și că nu trebuie mișcate sau deschise (a se vedea secțiunea „Detalii despre efectele probabile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului”, pentru informații care trebuie incluse pe etichetă).
- Când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate pe parcursul perioadei de tratament și trebuie afișat un anunț care să explice riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, precum și să indice primele măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire, informații care trebuie puse la dispoziție alături de produs.
- Momeala trebuie fixată astfel încât să nu poată fi extrasă din capcană.
- Amplasați produsul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă, precum și a altor animale care nu sunt vizate.
- Amplasați produsul departe de hrană, băutură și furaje pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele care intră în contact cu acestea.
- Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (cauciuc) pe parcursul manipulării produsului.
- Când manevrați produsul nu mâncați, nu beți sau fumați. După manipularea produsului spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
- În cazul unui consum scăzut de momeală în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare relocarea capcanelor în locuri mai îndepărtate, precum și posibilitatea de a o înlocui cu o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile consumul de momeală continuă și nu se observă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Acolo unde au fost excluse alte cauze, este posibil să existe rozătoare rezistente la produs, ca urmare luați în considerare utilizarea unui rodenticid fără anticoagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid cu anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea curselor ca o măsură alternativă de control.
- La sfârșitul perioadei de tratament îndepărtați momeala rămasă sau capcanele.

Publicul larg

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
- Înainte de a utiliza produse rodenticide, luați în considerare eventuale metode de combatere nechimice (de exemplu, curse).
- Îndepărtați hrana care este ușor accesibilă rozătoarelor (ex. cereale vrac sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate de sol sau pe alte structuri.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

-
- Amplasa#i produsul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie #i animalelor de fermă, precum #i a altor animale care nu sunt vizate.
 - Amplasa#i produsul departe de hrană, băutură #i furaje pentru animale, precum #i de ustensilele sau suprafe#ele care intră în contact cu acestea.
 - Nu amplasa#i capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde acestea pot intra în contact cu apa.
 - Când manevra#i produsul nu mânca#i, nu be#i sau fuma#i. După manipularea produsului spăla#i-vă mâinile #i pielea direct expusă.
 - La sfâr#itul perioadei de tratament îndepărta#i momeala rămasă sau capcanele.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Exper#i

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informa#i persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu utilizatorii zonei tratate #i ai împrejurimilor acestora) în legătura cu campania de combatere a rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căuta#i #i îndepărta#i frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului (de exemplu, cel pu#in de două ori pe săptămână).
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare #i a eficien#ei tratamentului.
- Nu folosi#i momeli care con#in substan#e active anticoagulante ca momeli permanente pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.
- Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să indice clar următoarele:
 - produsul nu trebuie să fie furnizat publicului larg (de exemplu, „numai pentru exper#i”).
 - produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării (de exemplu, „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării”).
 - utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informa#iile men#ionate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).
- Utilizând acest produs rozătoarele ar trebui să fie eliminate în 35 de zile. Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar faptul că în cazul suspectării lipsei de eficien#ă a acestuia până la sfâr#itul tratamentului (se observă încă o activitate a rozătoarelor), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a rozătoarelor.
- Nu spăla#i capcanele cu apă între utilizări.
- Elimina#i rozătoarele moarte în conformitate cu cerin#ele locale.

Publicul larg

- Analiza#i posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupa#i găurile, îndepărta#i cât mai mult posibil eventualele surse de hrană #i băutură) pentru a cre#te #ansa de consum a produsului #i pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Nu utiliza#i rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu, pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a detecta prezen#a rozătoarelor).
- Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să indice clar următoarele:
 - produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării (de exemplu, „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii #i a deteriorării”).
 - utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informa#iile men#ionate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).
- Utilizând acest produs rozătoarele ar trebui să fie eliminate în 35 de zile. Informa#iile despre produs (eticheta #i/sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar faptul că în cazul suspectării lipsei de eficien#ă a acestuia până la sfâr#itul tratamentului (se observă încă o activitate a rozătoarelor), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a rozătoarelor.
- Căuta#i #i îndepărta#i rozătoarele moarte pe durata tratamentului, cel pu#in cu aceea#i frecven#ă cu care sunt inspectate capcanele.
- Îndepărta#i rozătoarele moarte în conformitate cu cerin#ele locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Experți

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazurile severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau urină.
- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.
- In caz de:
 - Expunere cutanată: spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
 - Expunerea ochilor: clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Expunere orală: clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de către un animal de companie.
 - Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mișca și nu deschide”; „conține un rodenticid”; „numele produsului sau numărul autorizației”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București sau la 112”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

Publicul larg

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazurile severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau urină.
- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.
- In caz de:
 - Expunere cutanată: spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
 - Expunerea ochilor: clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Expunere orală: clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de către un animal de companie.
 - Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mișca și nu deschide”; „conține un rodenticid”; „numele produsului sau numărul autorizației”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București sau la 112”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Experți

- La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Publicul larg

- La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Se recomandă folosirea mănușilor.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 35°C. Păstra și recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.
- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.
- Perioada de valabilitate: 2 ani.

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși sau instrumente, cum ar fi clești, atunci când le îndepărtați.
- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.