

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Propasta

Produktart(en)

PT14: Rodentizide

Zulassungsnummer: AT-0008109-0000

R4BP-Assetnummer: AT-0008109-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Propasta BrodiPads Interratox Wurfbeutel BrodEx Paste Schaumann Ratten- und Mäuseköder
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	ARMOSA TECH SA
	Anschrift	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
Zulassungsnummer		AT-0008109-0000
<i>R4BP-Assetnummer</i>		AT-0008109-0000
Datum der Zulassung		30/07/2013
Ablauf der Zulassung		01/07/2026

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Armosa SA
Anschrift des Herstellers	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
Standort der Produktionsstätten	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

Name des Herstellers	Compagnie Générale des Biocides
Anschrift des Herstellers	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Brodifacoum
Name des Herstellers	PelGar International Limited
Anschrift des Herstellers	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)
Standort der Produktionsstätten	Prazska 54 28002 Kolin Tschechien

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Wirkstoff	56073-10-0	259-980-5	0,004 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

RB Fertigköder

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	<p>H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.</p> <p>H373:: Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht)Blut.</p>
Sicherheitshinweise	<p>P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.</p> <p>P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.</p> <p>P280: Schutzhandschuhe tragen.</p> <p>P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: ärztlichen Ärztlichen Rat einholen hinzuziehen.</p> <p>P314: Ärztliche(n) ärztliche Hilfe hinzuziehen{0:Rat Hilfe} hinzuziehen, wenn Sie sich unwohl fühlen.</p> <p>P405: Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p>P501: Inhalt in / Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen.</p>

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Mäuse - Berufsmäßige Verwender - Innenbereich

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Mus musculus</i> Trivialname: Sonstige: Hausmaus Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 10 g Köder pro Köderpunkt Verdünnung (%): --- Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Mäuse: - Geringer Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - Starker Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 3 Meter Häufigkeit: ---
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen: Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g Verpackungsmaterial und Packungsgrößen: Pappkartonschachtel: 50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g;

	18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g; 18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg
--	--

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 2 bis 3 Tage und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird, die Köderstationen intakt sind und um tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2. Ratten - Berufsmäßige Verwender - Innenbereich

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide

Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i> Trivialname: Sonstige: Wanderratte Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 60 g Köder pro Köderpunkt Verdünnung (%): --- Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Ratten: - Geringer Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 10 Meter - Starker Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter Häufigkeit: ---
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen: Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g Verpackungsmaterial und Packungsgrößen: Pappkartonschachtel: 50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g; 18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g; 18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 5 bis 7 Tage und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen wird, die Köderstationen intakt sind und um tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.3. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 3. Mäuse und/oder Ratten - Berufsmäßige Verwender - Außenbereich: um Gebäude

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Mus musculus</i> Trivialname: Sonstige: Hausmaus Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i> Trivialname: Sonstige: Wanderratte Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte
Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung

	Außenbereich: um Gebäude
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Anwendung als Köder</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in manipulationssicheren Köderstationen</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: Mäuse: 10 g Köder pro Köderpunkt, Ratten: 60 g Köder pro Köderpunkt</p> <p>Verdünnung (%): ---</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Mäuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - Starker Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 3 Meter <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 10 Meter - Starker Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter <p>Häufigkeit:</p> <p>---</p>
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg</p> <p>Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel</p> <p>Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen:</p> <p>Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg</p> <p>Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg</p> <p>Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g</p> <p>Verpackungsmaterial und Packungsgrößen:</p> <p>Pappkartonschachtel: 50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g; 18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g; 18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g</p> <p>Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg</p>

4.3.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die Köderstationen zu Beginn der Behandlung mindestens alle 2 bis 3 Tage für Mäuse sowie alle 5 bis 7 Tage für Ratten und danach mindestens wöchentlich kontrollieren, um zu überprüfen, ob der Köder angenommen

wird, die Köderstationen intakt sind und um tote Nagetiere im Anwendungsbereich zu entfernen. Bei Bedarf Köder nachfüllen.

4.3.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Die Köder vor Wettereinflüssen (z. B. Regen, Schnee etc.) schützen und in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden können. Durch Wasser beschädigte oder durch Schmutz verunreinigte Köder ersetzen. Das Produkt nicht direkt in die Erde (z. B. in Nagetierbaue oder -löcher) einbringen.

4.3.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.3.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.3.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.4. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 4. Mäuse und/oder Ratten - Konzessionierte Schädlingsbekämpfer - Innenbereich

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Mus musculus</i> Trivialname: Sonstige: Hausmaus Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i> Trivialname: Sonstige: Wanderratte Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte

Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung- in manipulationssicheren Köderstationen- verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt als Köderpunkte
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Mäuse: 10 g Köder pro Köderpunkt, Ratten: 60 g Köder pro Köderpunkt Verdünnung (%): --- Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Mäuse: - Geringer Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - Starker Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 3 Meter Ratten: - Geringer Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 10 Meter - Starker Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter Häufigkeit: ---
Anwenderkategorie(n)	Geschulte berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen: Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g Verpackungsmaterial und Packungsgrößen: Pappkartonschachtel: 50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g; 18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g; 18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg

4.4.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Bei Verwendung zur Pulsbeköderung:

Angenommene Köder erstmalig nach 3 Tagen und dann in Abständen von maximal 7 Tagen ersetzen.

Verschüttete Köder und tote Nagetiere entfernen.

4.4.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.4.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.4.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.4.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.5. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 5. Mäuse und/oder Ratten - Konzessionierte Schädlingsbekämpfer - Außenbereich: um Gebäude

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Mus musculus</i> Trivialname: Sonstige: Hausmaus Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i> Trivialname: Sonstige: Wanderratte Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte
Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung

	Außenbereich: um Gebäude
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Anwendung als Köder</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung- in manipulationssicheren Köderstationen- verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt als Köderpunkte- direkt in Nagetierbaue oder -löcher</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: Mäuse: 10 g Köder pro Köderpunkt, Ratten: 60 g Köder pro Köderpunkt bzw. 60-100 g Köder pro Nagetierbau</p> <p>Verdünnung (%): ---</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Mäuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - Starker Befall: 10 g Köder pro Köderpunkt alle 3 Meter <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 10 Meter - Starker Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - 60-100 g Köder pro Nagetierbau <p>Häufigkeit:</p> <p>---</p>
Anwenderkategorie(n)	Geschulte berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg</p> <p>Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel</p> <p>Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen:</p> <p>Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln:</p> <p>2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg</p> <p>Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln:</p> <p>2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg</p> <p>Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g</p> <p>Verpackungsmaterial und Packungsgrößen:</p> <p>Pappkartonschachtel:</p> <p>50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g;</p> <p>18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g;</p> <p>18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g</p> <p>Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg</p>

4.5.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Bei Verwendung zur Pulsbeköderung:

Angenommene Köder erstmalig nach 3 Tagen und dann in Abständen von maximal 7 Tagen ersetzen.

Verschüttete Köder und tote Nagetiere entfernen.

4.5.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Die Köder vor Wettereinflüssen (z. B. Regen, Schnee etc.) schützen und in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden können. Durch Wasser beschädigte oder durch Schmutz verunreinigte Köder ersetzen.

Bei Anwendung direkt in Nagetierbaue oder -löcher:

Die Köder so platzieren, dass die Exposition von Kindern und Nichtzielorganismen minimiert wird. Die Eingänge zu Nagetierbaue und -löcher nach Einbringung der Köder abdecken oder verschließen, um zu verhindern, dass Köder an die Oberfläche gelangen.

4.5.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.5.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.5.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.6. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 6. Ratten - Konzessionierte Schädlingsbekämpfer - Außenbereich: offenes Gelände und Mülldeponien

Produktart	PT14: Rodentizide
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Nicht relevant für Rodentizide
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Rattus norvegicus</i> Trivialname: Sonstige: Wanderratte Entwicklungsstadium: Sonstige: Juvenile, Adulte

Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung Außenbereich: offenes Gelände und Mülldeponien
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung- in manipulationssicheren Köderstationen- verdeckt und gleichermaßen zugriffsgeschützt als Köderpunkte- direkt in Nagetierbaue oder -löcher
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 60 g Köder pro Köderpunkt bzw. 60-100 g Köder pro Nagetierbau Verdünnung (%): --- Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Ratten: - Geringer Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 10 Meter - Starker Befall: 60 g Köder pro Köderpunkt alle 5 Meter - 60-100 g Köder pro Nagetierbau Häufigkeit: ---
Anwenderkategorie(n)	Geschulte berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Mindestverpackungsgröße der Umverpackung: 3 kg Köderportionen: 10 g einzeln verpackt in Beutel Verpackungsmaterialien und Packungsgrößen: Kübel (PP/PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Pappkartonschachtel (Innenauskleidung aus PE) mit 10 g Beuteln: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg; 5,5 kg; 6 kg; 6,5 kg; 7 kg; 7,5 kg; 8 kg; 8,5 kg; 9 kg; 9,5 kg; 10 kg Kunststoff-Kartuschen (PP): 50 g; 100 g; 150 g; 200 g; 250 g; 260 g; 270 g; 280 g; 310 g; 500 g Verpackungsmaterial und Packungsgrößen: Pappkartonschachtel: 50 x 50 g; 25 x 100 g; 20 x 150 g; 15 x 200 g; 10 x 250 g; 12 x 250 g; 18 x 250 g; 10 x 260 g; 12 x 260 g; 18 x 260 g; 10 x 270 g; 12 x 270 g; 18 x 270 g; 10 x 280 g; 12 x 280 g; 18 x 280 g; 10 x 310 g, 12 x 310 g; 18 x 310 g; 5 x 500 g Vorgefüllte Köderstationen (PP/PS/PVC) mit 2 x 10 g oder 3 x 10 g in Pappkartonschachtel: 2,5 kg; 3 kg; 3,5 kg; 4 kg; 4,5 kg; 5 kg

4.6.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Bei Verwendung zur Pulsbeköderung:

Angenommene Köder erstmalig nach 3 Tagen und dann in Abständen von maximal 7 Tagen ersetzen.
Verschüttete Köder und tote Nagetiere entfernen.

4.6.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Die Köder vor Wettereinflüssen (z. B. Regen, Schnee etc.) schützen und in Bereichen platzieren, die nicht überschwemmt werden können. Durch Wasser beschädigte oder durch Schmutz verunreinigte Köder ersetzen.

Bei Anwendung direkt in Nagetierbaue oder -löcher:

Die Köder so platzieren, dass die Exposition von Kindern und Nichtzielorganismen minimiert wird. Die Eingänge zu Nagetierbaue und -löcher nach Einbringung der Köder abdecken oder verschließen, um zu verhindern, dass Köder an die Oberfläche gelangen.

4.6.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Wenn Köder in der Nähe von Gewässern (z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben) oder Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird.

4.6.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.6.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen.

Vor der Beköderung die Nagetierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache ermitteln und das Ausmaß des Befalls abschätzen.

Für Nagetiere leicht erreichbare Nahrungsquellen (z. B. verschüttetes Getreide oder Lebensmittelabfälle) wenn möglich entfernen. Zu Beginn der Beköderung den Bereich nicht reinigen, da dies die Nagetiere stört und die Akzeptanz von Ködern erschwert.

Das Produkt nur als Teil einer integrierten Schädlingsbekämpfung zusammen mit Hygienemaßnahmen und gegebenenfalls physikalischen Methoden der Schädlingskontrolle verwenden.

Um die Annahme des Produkts zu verbessern und einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende Maßnahmen ergreifen: Löcher verschließen, Nahrungsquellen und Tränken möglichst entfernen.

Das Produkt sollte in der unmittelbaren Umgebung der zuvor festgestellten Aufenthaltsorte der Nagetiere angebracht werden (z. B. Nagetierwege, Nistplätze, Fressstellen, Löcher, Baue usw.).

Die Köderstationen müssen, sofern möglich, am Boden oder an anderen Strukturen befestigt werden.

Köderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, dass sie Rodentizide enthalten und nicht berührt werden dürfen (siehe Abschnitt 5.3. für die auf dem Etikett aufzuführenden Informationen).

Wenn das Produkt in öffentlich zugänglichen Bereichen verwendet wird, sollten die behandelten Bereiche markiert werden und ein Hinweis angebracht werden, um das Risiko einer primären oder sekundären Vergiftung darzustellen, sowie welche Maßnahmen im Falle einer Vergiftung ergriffen werden müssen.

Der Köder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der Köderstation entfernt werden kann.

Das Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nichtzielorganismen platzieren. Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist zu vermeiden.

Bei Gebrauch des Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch des Produktes Hände und Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen.

Die Köderannahme regelmäßig kontrollieren und angenommene oder verdorbene Köder erneuern bis keine Annahme mehr erfolgt. Bei Anzeichen von erneutem Befall (z. B. frische Spuren oder Kotreste) Behandlung wiederholen.

Bei einer im Verhältnis zu der abgeschätzten Befallsstärke geringen Köderannahme ist die Änderung des Orts der Auslegung oder die Formulierung des Köders zu prüfen.

Werden Köder nach 35 Tagen immer noch unvermindert stark angenommen, ohne dass die Aktivität der Nagetiere abnimmt, muss die wahrscheinliche Ursache hierfür ermittelt werden. Es besteht in solchen Fällen der Verdacht auf Resistenz gegen den eingesetzten Wirkstoff. Der Einsatz eines anderen Rodentizids mit einem nicht-antikoagulanten Wirkstoff oder, falls vorhanden, mit einem potenteren antikoagulanten Wirkstoff ist zu prüfen und alternative Bekämpfungsmaßnahmen wie z. B. Fallen sind zu berücksichtigen.

Die Verwendung dieses Produktes sollte einen Befall mit Nagetieren innerhalb von 35 Tagen beseitigen.

Nach Abschluss der Beköderung alle Köder und Köderreste entfernen und entsorgen (Problemstoffsammelstelle oder befugter Sammler für gefährliche Abfälle, siehe Abschnitt 5.4.), um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Köder in Beuteln: Die Beutel mit dem Köder nicht öffnen.

Die Köderpaste mit einem ausreichend langen Applikator (z. B. Spatel) platzieren, um die Exposition der Hände zu vermindern.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Aus den Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass das Produkt nicht an nicht-berufsmäßige Verwender abgegeben werden darf.

Wenn möglich, vor der Beköderung alle Nutzer des beköderten Bereichs und dessen Umgebung über die Maßnahmen zur Nagetierbekämpfung informieren.

Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Das Produkt nicht als permanenten Köder zur Vorbeugung von Nagetierbefällen oder zur Überwachung von Nagetieraktivität verwenden.

Das Produkt nicht länger als 35 Tage ohne Überprüfung der Befallssituation und der Wirksamkeit der Beköderung verwenden.

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Antikoagulanzen vergleichbarer oder geringerer Potenz ist keine sichere Möglichkeit des Resistenzmanagements.

Zwischen den Anwendungen Köderstationen bzw. Utensilien, die für die Abdeckung und den Schutz der Köderstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen. Der Zulassungsinhaber muss auf dem Etikett bzw. in der Gebrauchsanweisung genaue Angaben zur Reinigung des Zubehörs (z. B. Köderstation) und zum Einsammeln von Köderresten machen.

Bei der Handhabung des Produktes chemikalienresistente Schutzhandschuhe tragen (welches Handschuhmaterial geeignet ist, ist vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen anzugeben).

Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagetieren absuchen und diese entfernen (Problemstoffsammelstelle oder befugter Sammler für gefährliche Abfälle, siehe Abschnitt 5.4.), um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Dieses Produkt enthält einen blutgerinnungshemmenden Stoff (Antikoagulans). Bei Verzehr können folgende Symptome auftreten, auch verspätet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. In schweren Fällen kann es zu Blutergüssen (Hämatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen.

Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem/tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden darf.

Im Falle von:

- Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen.
- Exposition der Augen: die Augen mindestens 10 Minuten bei geöffneten Augenlidern mit Augenspülung oder Wasser ausspülen.
- Orale Exposition: Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. Kontaktieren Sie einen Tierarzt im Falle einer Vergiftung eines Haustieres.

Gefährlich für Wildtiere.

Köderstationen müssen mit den folgenden Informationen gekennzeichnet werden: „Nicht bewegen oder öffnen“; „Enthält ein Rodentizid (Ratten- bzw. Mäusegift)“; „Bezeichnung des Produkts“; „Wirkstoff(e)“ und „Bei einem Zwischenfall die Vergiftungsinformationszentrale anrufen“.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Das Präparat ist ein Rodentizid und kann bei Einnahme zum Tod führen; daher muss bei der Entsorgung darauf geachtet werden, keine Nichtzielorganismen in Gefahr zu bringen.

Produktreste, Verpackungsbehälter, tote Nagetiere und alle nach Abschluss der Bekämpfung nicht angenommenen Köder bei Problemstoffsammelstellen oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nur im Originalbehälter an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Die Verpackung verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Die Lagerstabilität des Produktes beträgt 2 Jahre.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Aufgrund ihrer verzögerten Wirksamkeit wirken blutgerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulanzen) 4 bis 10 Tage nach der Aufnahme.

Nagetiere können Krankheiten übertragen (z. B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen, verwenden.

Dieses Produkt enthält einen Bitter- und einen Farbstoff.