

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** Pesguard® Gel

**Tipo(s) de producto:** TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

**Número de la autorización:** EU-0024951-0000

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** EU-0024951-0000

## Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	6
5.1. Instrucciones de uso	6
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	6
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	7
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	7
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	8
6. Información adicional	8

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

Pesguard® Gel

### 1.2. Titular de la autorización

<b>Razón social y dirección del titular de la autorización</b>	Razón social	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Dirección	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francia
<b>Número de la autorización</b>	EU-0024951-0000	
<b>R4BP 3 Número de referencia de activo</b>	EU-0024951-0000	
<b>Fecha de la autorización</b>	15/07/2021	
<b>Fecha de vencimiento de la autorización</b>	30/06/2026	

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

<b>Nombre del fabricante</b>	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
<b>Dirección del fabricante</b>	8810 10th Avenue North MN 55427 Minneapolis Estados Unidos
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road MN 55318 Chaska Estados Unidos

### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

<b>Sustancia activa</b>	15 - (E)-1-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (clotianidina)
<b>Nombre del fabricante</b>	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
<b>Dirección del fabricante</b>	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japón
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita Japón
<b>Sustancia activa</b>	61 - Piriproxifeno
<b>Nombre del fabricante</b>	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
<b>Dirección del fabricante</b>	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japón
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori Japón

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
(E)-1-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (clotianidina)		Sustancia activa	210880-92-5	433-460-1	0,526
Piriproxifeno	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Sustancia activa	95737-68-1	429-800-1	0,515
Ácido acético	Ácido acético	Principio no activo	64-19-7	200-580-7	0,3
Sorbato de potasio	(E,E)-hexa-2,4-dienoato de potasio	Principio no activo	24634-61-5	246-376-1	0,5

### 2.2. Tipo de formulación

RB - Cebo (listo para usar)

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

**Indicaciones de peligro**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua.

En caso de irritación o erupción cutánea:Consultar a un médico

Llevar guantes.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

Recoger el vertido.

**4. Uso(s) autorizado(s)****4.1 Descripción de uso****Uso 1 - Uso profesional – Cebo atrayente listo para usar****Tipo de producto**

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

Insecticida

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Blattella germanica  
Nombre común: Cucaracha rubia o alemanaGerman  
Etapa de desarrollo: Ninfas

Nombre científico: Blattella germanica  
Nombre común: Cucaracha rubia o alemanaGerman  
Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Supella longipalpa  
Nombre común: Cucaracha de banda marrón  
Etapa de desarrollo: Ninfas

Nombre científico: Supella longipalpa  
Nombre común: Cucaracha de banda marrón  
Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Blatta orientalis  
Nombre común: Cucaracha negra, oriental o común  
Etapa de desarrollo: Ninfas

Nombre científico: Blatta orientalis  
Nombre común: Cucaracha negra, oriental o común  
Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Periplaneta americana  
Nombre común: Cucaracha americana o cucaracha roja  
Etapa de desarrollo: Ninfas

Nombre científico: Periplaneta americana  
Nombre común: Cucaracha americana o cucaracha roja  
Etapa de desarrollo: Adultos

<b>Ámbito de utilización</b>	Interior  En rendijas y grietas o lugares ocultos, inaccesibles para las personas o los animales de compañía: detrás de frigoríficos, armarios y estanterías, debajo de los muebles/accesorios de cocina, dentro de los cuadros eléctricos, espacios vacíos y tuberías, debajo de los accesorios de baño, etc.
<b>Método(s) de aplicación</b>	Método: Aplicación del cebo Descripción detallada:  Un cebo insecticida listo para usar (ready to use – RTU) en forma de gel contra cucarachas detectadas en espacios sanitarios públicos
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	Tasa de aplicación: Pesguard® Gel se debe aplicar como una serie de puntos con un diámetro aproximado de 4 mm (cada punto con aproximadamente 0,032 g del cebo). Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación:  En caso de infestación intensa, con presencia de especies de cucaracha más grandes (B. orientalis o P. americana), en lugares especialmente sucios u obstruidos o sin posibilidad de eliminar fuentes alternativas de alimentos, se debe incrementar la dosis de aplicación (ej. 2 en lugar de 1 punto por m2 en caso de infestación leve). · Infestación leve: 1–2 (0,032–0,064 g) puntos por m <sup>2</sup> · Infestación moderada: 3–6 (0,096–0,192 g) puntos por m <sup>2</sup> · Infestación intensa: 6–10 (0,192–0,320 g) puntos por m <sup>2</sup> No se debe exceder de 11 aplicaciones al año.
<b>Categoría(s) de usuarios</b>	Profesional
<b>Tamaños de los envases y material del envasado</b>	Jeringa de polipropileno (PP) de 30 g  Tapón de rosca superior de polietileno de alta densidad (PEAD)

#### 4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Ver instrucciones generales de uso

#### **4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico**

Ver instrucciones generales de uso

#### **4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Ver instrucciones generales de uso

#### **4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver instrucciones generales de uso

#### **4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver instrucciones generales de uso

## 5. Instrucciones generales de uso

### 5.1. Instrucciones de uso

Siempre lea la etiqueta o el prospecto antes del uso del producto y observe/siga todas las indicaciones proporcionadas.

No exponga las gotas del cebo a la luz solar o el calor (ej. radiador).

El recipiente de plástico precargado con Pesguard® Gel se debe utilizar con el émbolo proporcionado o un dispositivo específico para la aplicación de cebo de uso común en la industria del control de plagas. Para conocer las instrucciones del uso del aplicador, consulte el manual del fabricante.

Introduzca el cebo en rendijas y grietas, espacios vacíos o lugares ocultos, inaccesibles para las personas o los animales de compañía, donde puedan habitar, alimentarse y reproducirse los insectos. Estos espacios suelen ser calientes/húmedos y oscuros (detrás de frigoríficos, armarios y estanterías, debajo de los muebles/accesorios de cocina, dentro de las cajas eléctricas, espacios vacíos y tuberías, debajo de los accesorios de baño, etc.). Antes de aplicar el tratamiento, se recomienda realizar una inspección o captura para confirmar la infestación. Asegúrese de eliminar cualquier fuente alternativa de alimentos y concentre la ubicación del cebo en forma de puntos individuales en las zonas de actividad de las cucarachas. El producto se debe aplicar únicamente en espacios inaccesibles para los niños y animales de compañía.

No aplique Pesguard® Gel en lugares donde pueda entrar en contacto con agua o en espacios que se limpian con regularidad. Las cucarachas suelen morir unas horas después de ingerir una dosis de Pesguard Gel. En espacios infestados, las cucarachas muertas suelen aparecer dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación del tratamiento.

Retire el tapón de la boquilla, acerque la parte superior a la superficie a tratar y empuje el émbolo hacia abajo. Una vez terminado el tratamiento, vuelva a colocar el tapón sobre el dispensador.

El cebo se adherirá a superficies sin grasa y sin polvo, y seguirá siendo flexible y apetecible para las cucarachas siempre que se mantenga visible en el lugar de aplicación.

El lugar tratado se debe someter a una inspección visual al cabo de 1–2 semanas. En espacios sustancialmente afectados por la infestación, puede resultar necesaria una segunda aplicación de Pesguard® Gel, si el primer tratamiento ha sido consumido y aún se observan cucarachas vivas.

Se recomienda una segunda inspección visual de los lugares de colocación del cebo al cabo de 2–4 semanas después del tratamiento inicial. Vuelva a aplicar el cebo cuando su presencia ya no se pueda apreciar, respetando las dosis indicadas para los distintos niveles de infestación (leve, moderada o intensa). Reponga el cebo antes de que sea completamente consumido para prevenir la reaparición de las cucarachas.

Informe al titular de la autorización, si el tratamiento resulta ineficaz.

Derrames y residuos del producto se deben eliminar igual que en el caso de desechos químicos.

Tome precauciones para evitar el contacto del gel con superficies expuestas. Si el gel entra en contacto con una superficie expuesta, elimine el gel con papel absorbente y limpie el lugar con toallitas húmedas desechables.

Durante las visitas de control, inspeccione los lugares de colocación del cebo y vuelva a aplicarlo según sea necesario.

No coloque el cebo en lugares de frecuente lavado, ya que el cebo será eliminado durante la limpieza. No utilice este producto dentro o encima de equipos eléctricos, donde existan posibilidades de producirse una descarga eléctrica. Evite el contacto con tejidos y ropa, ya que el cebo puede dejar manchas.

### 5.2. Medidas de mitigación del riesgo



Lleve guantes de protección resistentes a los agentes químicos a la hora de manipular el producto (el titular de la autorización deberá especificar el material de los guantes entre la información proporcionada acerca del producto).  
No aplique el cebo en lugares donde previamente se hayan utilizado insecticidas repelentes sin limpiar bien la superficie con toallitas húmedas desechables. No aplique insecticidas repelentes después de la aplicación del cebo.  
No aplique el producto directamente sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas o animales.

Derrames y residuos del producto se deben eliminar igual que en el caso de desechos químicos.

Evite la colocación del gel sobre tejidos o alfombras, ya que el producto puede dejar manchas sobre algunos materiales absorbentes. Para evitar manchas, el material expuesto al cebo se debe limpiar inmediatamente con toallitas húmedas desechables.

Los materiales de limpieza se deben eliminar igual que en el caso de desechos sólidos.

### **5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Este biocida contiene clotianidina, una sustancia peligrosa para las abejas

#### Efectos directos o indirectos probables

No se esperan efectos adversos con el uso del producto de acuerdo con las indicaciones.

#### Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente las prendas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste después del lavado, solicitar atención médica.

Contacto con los ojos: Si aparecen síntomas, enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o al médico.

Ingestión: En caso de ingestión: Si aparecen síntomas, llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o al médico.

En caso de inhalación: no aplicable.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos: Puede causar irritación temporal en los ojos.

#### Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Evite la liberación del producto al medio ambiente.

### **5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase**

Envases vacíos, restos de producto, materiales de limpieza y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.  
No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

### **5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Proteger de heladas. Almacenar lejos de la luz solar directa.  
Vida útil: 2 años.

### **6. Información adicional**