



Luxembourg, le 04/04/2019

## LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Vu le règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;

Conformément à l'article 33 (MRs) du règlement précité ;

Vu l'autorisation N° IE/BPA 70537 (Asset N° IE-0000317-0000) du 18/07/2013, délivrée par l'Etat membre de référence Irlande pour le produit biocide dénommé «Vertox Rolled Oat Bait» ;

Conformément au rapport d'évaluation et au résumé des caractéristiques du produit biocide y relatifs ;

Vu la demande de reconnaissance mutuelle présentée le 28/06/2018 par Pelgar International Ltd, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire GU 34 2QR, Grande-Bretagne, tendant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour le produit biocide dénommé «Rodi Bro Flocons Pro»;

Vu la procédure de reconnaissance mutuelle N° BC-MH040815-39;

### Arrête :

**Art. 1<sup>er</sup>** – En application de l'article 19, paragraphes (1) à (4), du Règlement (EU) N° 528/2012, l'autorisation du produit biocide «**Rodi Bro Flocons Pro**» est accordée conformément au dossier produit à l'appui de la demande de reconnaissance mutuelle.

Le dossier de demande fait partie intégrante de la présente autorisation.

L'autorisation porte le N° **95/19/L-000** (R4BP asset LU-0019770-0000) et couvre la mise sur le marché sous le nom commercial:

### **Rodi Bro Flocons Pro**

**Art.2** – Conformément à l'article 23 du règlement (UE) N° 528/2012, la période de validité de l'autorisation N° **95/19/L-000** prend fin le **26/04/2023**.

**Art.3** – La mise sur le marché et l'utilisation du produit sont soumises aux conditions et restrictions énoncées par le résumé des caractéristiques du produit annexé.

La classification, l'étiquetage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent répondre aux exigences de l'article 69 du règlement 528/2012<sup>1</sup>. Les langues officielles éligibles sont les langues allemande ou française. L'étiquetage, l'emballage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente autorisation.

**Art.4** – Le cas échéant, le dossier de demande doit être complété par la soumission d'études complémentaires, postérieures à l'autorisation, conformément aux conditions énoncées par l'Etat membre de référence.

Le détenteur de l'autorisation doit fournir la preuve que les susdites données, requises par l'Etat membre de référence, ont été introduites dans les délais prédéfinis et doit informer l'autorité compétente luxembourgeoise du résultat de l'évaluation de ces données.

**Art.5** – Les produits dont les conditions de mise sur le marché sont modifiées par la présente autorisation ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché six mois après la date de la présente autorisation.

Leur utilisation est interdite douze mois après la date de la présente autorisation.

**Art.6** – Une demande de renouvellement d'une autorisation doit être présentée auprès de l'autorité compétente au moins 550 jours avant l'expiration de l'autorisation.

**Art.7** – Le titulaire de l'autorisation effectue la déclaration des données pertinentes au Centre Antipoisons<sup>2</sup> préalablement à la mise à disposition du produit sur le marché et conformément aux instructions jointes en annexe.

Les appelants à partir du Luxembourg peuvent joindre le Centre Antipoisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le numéro de téléphone (+352) 8002 5500. Ce numéro doit normalement aussi apparaître sous la section 1.4 «Numéro de téléphone d'appel d'urgence» de la fiche de données de sécurité du produit.

**Art.8** – L'autorisation pourra être retirée en cas de non-respect des dispositions de la présente autorisation. Les conditions afférentes à la présente autorisation pourraient être changées suivant les conclusions relatives aux études requises.

#### Informations :

- Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2015, aucun produit biocide ne peut être mis à disposition sur le marché européen si le fabricant ou l'importateur de chaque substance active contenue dans le produit ou, le cas échéant, l'importateur du produit biocide, n'est inscrit sur la liste visée à l'article 95 du Règlement UE n° 528/2012.
- En vertu de la loi du 4 septembre 2015, une obligation d'enregistrement s'applique **aux vendeurs de produits biocides dont l'usage est réservé à l'utilisateur professionnel**. Cette obligation s'applique aussi bien aux vendeurs de produits biocides sis au Luxembourg, qu'aux vendeurs étrangers


<sup>1</sup> Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

<sup>2</sup> Selon l'article 73 du règlement (UE) N° 528/2012, l'article 45 du règlement (CE) N° 1272/2008<sup>2</sup> s'applique aux produits qui tombent sous l'égide du règlement (UE) N° 528/2012. Au Luxembourg, la mise en œuvre du susdit article 45 est une compétence du Ministère de la Santé. Ce dernier a confié l'exécution des tâches découlant de l'article 45 au Centre Antipoisons de Bruxelles par le biais d'une convention.

qui vendent de tels produits biocides directement à l'utilisateur final luxembourgeois à partir de l'étranger.

La déclaration peut être introduite moyennant un formulaire disponible sur simple demande à l'adresse : [biocides@aev.etat.lu](mailto:biocides@aev.etat.lu). Toutes questions peuvent également être adressées à cette adresse e-mail. Le titulaire d'autorisation est prié de diffuser la présente information en aval de sa chaîne de distribution.

**Pour la Ministre de l'Environnement, du  
Climat et du Développement durable**



**Joëlle Welfring**

directrice-adjointe de l'Administration de  
l'environnement

Annexe(s) :

- 1) résumé des caractéristiques d'un produit biocide
- 2) instructions pour la déclaration auprès du centre Antipoisons

Un recours contre la présente décision peut être introduit par ministère d'avocat auprès du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la présente.





**Annexe à l'autorisation N° 95/19/L-000**

**- VERSION DU 04/04/2019 -**

**RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UN PRODUIT BIOCIDÉ**

**Nom(s) : Rodi Bro Flocons Pro**

Type de produit(s) : 14

N° d'autorisation : 95/19/L-000

R4BP Asset number : LU-0019770-0000

1.	Informations administratives.....	3
1.1.	Nom commercial du produit .....	3
1.2.	Détenteur de l'autorisation .....	3
1.3.	Fabricant(s) du produit.....	3
1.4.	Fabricant(s) de la substance active .....	3
2.	Composition et formulation du produit .....	4
2.1.	Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit.....	4
2.2.	Type de formulation .....	4
3.	Mentions de danger et conseils de prudence.....	4
4.	Utilisation(s) autorisée(s).....	4
4.1.	Descriptions de l'utilisation N°1 .....	4
4.1.1.	Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	6
4.1.2.	Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 :.....	6
4.1.3.	Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement.....	6
4.1.4.	Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	6
4.1.5.	Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales.....	6
4.2.	Descriptions de l'utilisation N°2 .....	7
4.2.1.	Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	8
4.2.2.	Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 :.....	8
4.2.3.	Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement.....	9
4.2.4.	Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	9
4.2.5.	Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales.....	9
4.3.	Descriptions de l'utilisation N°3 .....	9
4.3.1.	Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3 .....	11
4.3.2.	Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3 :.....	11
4.3.3.	Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement.....	11
4.3.4.	Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du	

produit et de son emballage .....	11
4.3.5. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales.....	11
4.4. Descriptions de l'utilisation N°4 .....	12
4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 4 .....	14
4.4.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 4 :.....	14
4.4.3. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement.....	14
4.4.4. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	14
4.4.5. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales.....	15
4.5. Descriptions de l'utilisation N°5 .....	15
4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 5 .....	17
4.5.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 5 :.....	18
4.5.3. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement.....	18
4.5.4. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	18
4.5.5. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales.....	18
5. Instructions d'utilisation générales.....	18
5.1. Consignes d'utilisation .....	18
5.2. Mesures de gestion des risques .....	21
5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	23
5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage.....	23
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	23
6. Autres informations .....	24

## 1. Informations administratives

### 1.1. Nom commercial du produit

<b>Rodi Bro Flocons Pro</b>
-----------------------------

### 1.2. Détenteur de l'autorisation

Nom et adresse du détenteur	<b>Pelgar International Ltd Unit 13, Newman Lane Alton, Hampshire GU 34 2QR Grande-Bretagne</b>
Numéro d'autorisation	<b>95/19/L-000</b>
R4BP Asset number	<b>LU-0019770-0000</b>
Date de l'autorisation	<b>04/04/2019</b>
Date d'expiration l'autorisation	<b>26/04/2023</b>

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom(s) et adresse(s) du fabricant	<b>Pelgar International Ltd Unit 13, Newman Lane Alton, Hampshire GU 34 2QR Grande-Bretagne</b>
Adresse(s) du site de production	<b>Pelgar International Ltd Unit 13, Newman Lane Alton, Hampshire GU 34 2QR Grande-Bretagne</b>

### 1.4. Fabricant(s) de la substance active

Substance active	<b>Brodifacoum (CAS: 56073-10-0)</b>
Nom et adresse du fabricant	<b>Pelgar International Ltd Unit 13, Newman Lane Alton, Hampshire GU 34 2QR Grande-Bretagne</b>
Adresse(s) du site de production	<b>Pelgar International Ltd. Praszka 54 CZ-280 02 Kolin Czech Republic</b>

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EINECS	Teneur
Brodifacoum	4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	Substance active	56073-10-0	259-980-5	0.005 % m/m

### 2.2. Type de formulation

Appât en grains, prêt à l'emploi

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mentions de danger	H360D - Peut nuire au fœtus H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseils de prudence	P201 - Se procurer les instructions avant utilisation. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 - Ne pas respirer les poussières. P280 - Porter des gants de protection. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu dans un point de collecte de déchets dangereux/spéciaux conformément à la législation nationale (centre de recyclage).
Note	/

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1. Descriptions de l'utilisation N°1

Tableau 1: Souris domestiques – professionnels – intérieur

Type de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/

Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	Intérieur
Méthode d'application	Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Dose prescrite et fréquence d'application	5 à 20 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation: 5-20g d'appât dans des postes d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation: 5-20g d'appât dans des postes d'appâtage espacés de 5 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel</b>
Emballage et Conditionnements	Conditionnement minimum de 3 kg. Le conditionnement du produit <b>en vrac</b> est limité aux sacs emballés séparément avec une taille maximale de 10 kg.  <u>Sachets :</u>  15/20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g ou 200g papier / PE ou sachets AL / PE ou papier / Al / PE, en emballages PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE, dans des boîtes en carton / carton. Emballages: papier multicouche jusqu'à 20 kg avec barrière anti-humidité en PE ou papier multicouche avec sac intérieur en PE séparé ou PP tissé avec sac intérieur en PE séparé ou sac en PP tissé sans doublure. Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.  <u>Appât en vrac :</u>  En emballage PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE. Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg. Appâts en vrac de 20g maximum emballés dans des plateaux d'appâts avec un couvercle thermoscellé, emballé dans des emballages multiples, emballés dans des cartons. Tailles d'emballage: Multiples 10g - 250 15g - 250

	<p>20g - 120</p> <p>Appâts en vrac contenant des plateaux à appâts emballés avec couvercle scellé à chaud, emballés dans un poste d'appât en PEHD ou en PP inviolable à usage unique ou multiple, tous emballés en multiples de 1, 2 ou 4 dans un carton, un blister ou un carton manchon ou sachet thermoscellé ou poly extérieur scellé à chaud avec une fermeture en carton.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples</p> <p>10g -250</p> <p>15g - 250</p> <p>20g - 120</p> <p>25g - 120, 144</p> <p>30g - 96, 120, 144</p> <p>40g - 72, 96, 120, 144</p> <p>50g - 60, 72, 96, 120, 144</p> <p>60g - 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>80g - 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1

- Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 :

Voir point 5.2.

#### 4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir point 5.4.

#### 4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Voir point 5.5.

## 4.2. Descriptions de l'utilisation N°2

Tableau 2: Rats – professionnels - intérieur

Type de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Rat brun ( <i>Rattus norvegicus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	Intérieur
Méthode d'application	Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Dose prescrite et fréquence d'application	10 à 60 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des postes d'appâtage espacés de 5 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des postes d'appâtage espacés de 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel</b>
Emballage et Conditionnements	<p>Conditionnement minimum de 3 kg. Le conditionnement du produit <b>en vrac</b> est limité aux sacs emballés séparément avec une taille maximale de 10 kg.</p> <p><u>Sachets :</u></p> <p>15/20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g ou 200g papier / PE ou sachets AL / PE ou papier / Al / PE, en emballages PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE, dans des boîtes en carton / carton.</p> <p>Emballages: papier multicouche jusqu'à 20 kg avec barrière anti-humidité en PE ou papier multicouche avec sac intérieur en PE séparé ou PP tissé avec sac intérieur en PE séparé ou sac en PP tissé sans doublure.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p><u>Appât en vrac :</u></p> <p>En emballage PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg,</p>

	<p>18kg, 19kg, 20kg.</p> <p>Appâts en vrac de 60g maximum emballés dans des plateaux d'appâts avec un couvercle thermoscellé, emballé dans des emballages multiples, emballés dans des cartons.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples</p> <p>10g - 250</p> <p>15g - 250</p> <p>20g - 120</p> <p>Appâts en vrac contenant des plateaux à appâts emballés avec couvercle scellé à chaud, emballés dans un poste d'appât en PEHD ou en PP inviolable à usage unique ou multiple, tous emballés en multiples de 1, 2 ou 4 dans un carton, un blister ou un carton manchon ou sachet thermoscellé ou poly extérieur scellé à chaud avec une fermeture en carton.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples</p> <p>10g -250</p> <p>15g - 250</p> <p>20g - 120</p> <p>25g - 120, 144</p> <p>30g - 96, 120, 144</p> <p>40g - 72, 96, 120, 144</p> <p>50g - 60, 72, 96, 120, 144</p> <p>60g - 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>80g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>90g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>100g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>120g - 24, 32, 48, 60, 72</p> <p>200g - 16, 24, 32, 48, 60</p> <p>240g - 16, 24, 32, 48, 60</p>
--	---

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2

- Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 :

Voir point 5.2.

- 4.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

- 4.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir point 5.4.

- 4.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Voir point 5.5.

### 4.3. Descriptions de l'utilisation N°3

Tableau 3: Souris domestiques et/ou rats – professionnels – extérieur - autour des bâtiments

Type de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Rat brun ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	Extérieur - autour des bâtiments
Méthode d'application	Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Dose prescrite et fréquence d'application	<b>Souris:</b> 5 à 20 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.  <b>Rats:</b> 10 à 60 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel</b>

Emballage et Conditionnements	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Le conditionnement du produit <b>en vrac</b> est limité aux sacs emballés séparément avec une taille maximale de 10 kg.</p> <p><u>Sachets :</u></p> <p>15/20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g ou 200g papier / PE ou sachets AL / PE ou papier / Al / PE, en emballages PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE, dans des boîtes en carton / carton.</p> <p>Emballages: papier multicouche jusqu'à 20 kg avec barrière anti-humidité en PE ou papier multicouche avec sac intérieur en PE séparé ou PP tissé avec sac intérieur en PE séparé ou sac en PP tissé sans doublure.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p><u>Appât en vrac :</u></p> <p>En emballage PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), emballés dans des plateaux d'appâts avec un couvercle thermoscellé, emballé dans des emballages multiples, emballés dans des cartons.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples 10g - 250 15g - 250 20g - 120</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), contenant des plateaux à appâts emballés avec couvercle scellé à chaud, emballés dans un poste d'appât en PEHD ou en PP inviolable à usage unique ou multiple, tous emballés en multiples de 1, 2 ou 4 dans un carton, un blister ou un carton manchon ou sachet thermoscellé ou poly extérieur scellé à chaud avec une fermeture en carton.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples 10g -250 15g - 250 20g - 120</p>
-------------------------------	--

	25g - 120, 144
	30g - 96, 120, 144
	40g - 72, 96, 120, 144
	50g - 60, 72, 96, 120, 144
	60g - 48, 60, 72, 96, 120
	80g - 32, 48, 60, 72, 96
	90g - 32, 48, 60, 72, 96
	100g - 32, 48, 60, 72, 96
	120g - 24, 32, 48, 60, 72
	200g - 16, 24, 32, 48, 60
	240g - 16, 24, 32, 48, 60

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.3.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3 :

- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

#### 4.3.3. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.3.4. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir point 5.4.

#### 4.3.5. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Voir point 5.5.

#### 4.4. Descriptions de l'utilisation N°4

Tableau 4: Souris domestiques et/ou rats – professionnels formés – intérieur

Type de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Rat brun ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	Intérieur
Méthode d'application	- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés.
Dose prescrite et fréquence d'application	<p><b>Souris :</b> 5 à 20 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.</p> <p><b>Rats :</b> 10 à 60 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 10 mètres.</p> <p><b>Appâtage pulsé :</b></p> <p><u>Souris :</u> Forte infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.</p> <p><u>Rats :</u> Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.</p>

Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel qualifié
Emballage et Conditionnements	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Le conditionnement du produit <b>en vrac</b> est limité aux sacs emballés séparément avec une taille maximale de 10 kg.</p> <p><u>Sachets :</u></p> <p>15/20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g ou 200g papier / PE ou sachets AL / PE ou papier / Al / PE, en emballages PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE, dans des boîtes en carton / carton.</p> <p>Emballages: papier multicouche jusqu'à 20 kg avec barrière anti-humidité en PE ou papier multicouche avec sac intérieur en PE séparé ou PP tissé avec sac intérieur en PE séparé ou sac en PP tissé sans doublure.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p><u>Appât en vrac :</u></p> <p>En emballage PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), emballés dans des plateaux d'appâts avec un couvercle thermoscellé, emballés dans des emballages multiples, emballés dans des cartons.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples 10g - 250 15g - 250 20g - 120</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), contenant des plateaux à appâts emballés avec couvercle scellé à chaud, emballés dans un poste d'appât en PEHD ou en PP inviolable à usage unique ou multiple, tous emballés en multiples de 1, 2 ou 4 dans un carton, un blister ou un carton manchon ou sachet thermoscellé ou poly extérieur scellé à chaud avec une fermeture en carton.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples 10g -250 15g - 250</p>

20g - 120
25g - 120, 144
30g - 96, 120, 144
40g - 72, 96, 120, 144
50g - 60, 72, 96, 120, 144
60g - 48, 60, 72, 96, 120
80g - 32, 48, 60, 72, 96
90g - 32, 48, 60, 72, 96
100g - 32, 48, 60, 72, 96
120g - 24, 32, 48, 60, 72
200g - 16, 24, 32, 48, 60
240g - 16, 24, 32, 48, 60

#### 4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 4

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.
- Si utilisé pour l'appâtage pulsé : - Remplacer l'appât mangé après 3 jours uniquement, puis tous les 7 jours au maximum. Collecter l'appât dispersé et les cadavres de rongeurs. [Si disponible] Suivre les instructions spécifiques fournies par le code de bonne pratique applicable au niveau national.

#### 4.4.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 4 :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

#### 4.4.3. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.4.4. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir point 5.4.

4.4.5. Si spécifique à l'utilisation N° 4: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Voir point 5.5.

**4.5. Descriptions de l'utilisation N°5**

Tableau 5: Souris domestiques et/ou rats - professionnels formés - extérieur - autour des bâtiments

Type de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles (si pertinent, inclure le stade de développement)	Rat brun ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	Extérieur - autour des bâtiments
Méthode d'application	- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés. - Application directe de l'appât prêt à l'emploi dans le terrier.
Dose prescrite et fréquence d'application	<b>Souris :</b> 5 à 20 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.  <b>Rats :</b> 10 à 60 g d'appât par poste d'appâtage. Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 10 mètres.  <b>Appâtage dans les terriers :</b> 10-60g d'appât par terrier.  <b>Appâtage pulsé :</b>  <b>Souris :</b> Forte infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations

	<p>d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 5 à 20g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.</p> <p><u>Rats :</u> Forte infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 2 mètres. Faible infestation – 10 à 60g d'appât dans des stations d'appâtage espacés de 5 mètres.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel qualifié</b>
Emballage et Conditionnements	<p>Conditionnement minimum de 3 kg. Le conditionnement du produit <b>en vrac</b> est limité aux sacs emballés séparément avec une taille maximale de 10 kg.</p> <p><u>Sachets :</u></p> <p>15/20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g ou 200g papier / PE ou sachets AL / PE ou papier / Al / PE, en emballages PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE, dans des boîtes en carton / carton.</p> <p>Emballages: papier multicouche jusqu'à 20 kg avec barrière anti-humidité en PE ou papier multicouche avec sac intérieur en PE séparé ou PP tissé avec sac intérieur en PE séparé ou sac en PP tissé sans doublure.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p><u>Appât en vrac :</u></p> <p>En emballage PE / PP (bacs, seaux ou sachets), en carton doublé PE.</p> <p>Tailles d'emballage: 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), emballés dans des plateaux d'appâts avec un couvercle thermoscellé, emballé dans des emballages multiples, emballés dans des cartons.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples 10g - 250 15g - 250 20g - 120</p> <p>Appâts en vrac de 20g maximum (souris et rats) et de 60g maximum (seulement rats), contenant des plateaux à</p>

	<p>appâts emballés avec couvercle scellé à chaud, emballés dans un poste d'appât en PEHD ou en PP inviolable à usage unique ou multiple, tous emballés en multiples de 1, 2 ou 4 dans un carton, un blister ou un carton manchon ou sachet thermoscellé ou poly extérieur scellé à chaud avec une fermeture en carton.</p> <p>Tailles d'emballage:</p> <p>Multiples</p> <p>10g -250</p> <p>15g - 250</p> <p>20g - 120</p> <p>25g - 120, 144</p> <p>30g - 96, 120, 144</p> <p>40g - 72, 96, 120, 144</p> <p>50g - 60, 72, 96, 120, 144</p> <p>60g - 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>80g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>90g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>100g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>120g - 24, 32, 48, 60, 72</p> <p>200g - 16, 24, 32, 48, 60</p> <p>240g - 16, 24, 32, 48, 60</p>
--	--

#### 4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 5

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement [Non applicable si autorisé pour l'application directe dans le terrier].
- Si utilisé pour l'appâtage pulsé : - Remplacer l'appât mangé après 3 jours uniquement, puis tous les 7 jours au maximum. Collecter l'appât dispersé et les cadavres de rongeurs. [Si disponible] Suivre les instructions spécifiques fournies par le code de bonne pratique applicable au niveau national.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites stratégiques pour minimiser l'exposition aux espèces non cibles. [Le cas échéant] Observez toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.
- Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non cibles et des enfants. Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

#### 4.5.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 5 :

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

#### 4.5.3. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité d'eaux de surface (par exemple, de rivières, d'étangs, de cours d'eau, de digues ou de canaux d'irrigation) ou de systèmes d'évacuation des eaux, assurez-vous que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.5.4. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir point 5.4.

#### 4.5.5. Si spécifique à l'utilisation N° 5: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Voir point 5.5.

## 5. Instructions d'utilisation générales

### 5.1. Consignes d'utilisation

#### PROFESSIONNELS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, mener un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Envisagez la mise en oeuvre de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Les stations d'appât doivent être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixées au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.
- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Portez des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager

également l'utilisation de pièges à titre de mesure de lutte alternative.

- Retirer tout appât restant ou les postes d'appât au terme de la période de traitement.
- Appât en sachets: N'e pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Grains, granulés-pastilles en vrac: Placez l'appât dans la station d'appât à l'aide d'un dispositif de dosage. Indiquez comment réduire les émissions de poussière (par exemple, en essuyant à l'aide d'un chiffon humide).

## PROFESSIONNELS FORMÉS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- L'utilisateur détermine lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
- Appât en sachets: [pour les sachets ne pouvant être vidés - Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât].
- Grains, granulés-pastilles en vrac: Placez l'appât dans la station d'appât à l'aide d'un dispositif de dosage. Indiquez comment réduire les émissions de poussière (par exemple, en essuyant à l'aide d'un chiffon humide).

## 5.2. Mesures de gestion des risques

### PROFESSIONNELS

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas utiliser d'appâts contenant des substances actives anticoagulantes en guise

d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants:

le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, «à usage professionnel uniquement»).

le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, «à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement»).

les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, «étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit»).

- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la législation nationale.

## PROFESSIONNELS FORMÉS

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»).

- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage couverts et protégés, entre les applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la législation nationale.

### 5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

- En cas:

d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

Ne pas provoquer de vomissement.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison [Téléphone : +352 8002 5500]».

- Dangereux pour la faune.

### 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale. Le port de gants est conseillé.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- Durée de conservation: 2 ans.

## 6. Autres informations

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.