

**PT**

*ANEXO*

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)**

FANGA PATE MRA25

**Tipo(s) de produto**

PT14: Rodenticidas

**Número de autorização:** PT/DGS bbp-144/2019 e PT/DGS bbp-145/2019

**Número da decisão de autorização R4BP:** PT-0021161-0000

## Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	FANGA PATE MRA25
-----------------------------------	------------------

### 1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	TRIPLAN SA
	Endereço	BP 258 LA POSTE FRANCAISE AD500 ANDORRA LA VELLA França
Número de autorização		PT/DGS bbp-144/2019 e PT/DGS bbp-145/2019
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>		PT-0021161-0000
Data da autorização		05/02/2014
Data de caducidade da autorização		31/12/2026

### 1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	SOFAR FRANCE
Endereço do fabricante	ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN França
Localização das instalações de fabrico	ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN França

Nome do fabricante	AEDES PROTECTA
Endereço do fabricante	75 Rue d'Orgemont 95210 SAINT-GRATIEN França
Localização das instalações de fabrico	LIEU DIT DOUILLAC 81310 PARISOT França

Nome do fabricante	IRIS
Endereço do fabricante	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat 30340 SALINDRES França
Localização das instalações de fabrico	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat 30340 SALINDRES França

Nome do fabricante	HDA
Endereço do fabricante	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM França
Localização das instalações de fabrico	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM França

Nome do fabricante	NOXIMA
Endereço do fabricante	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE França
Localização das instalações de fabrico	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE França

Nome do fabricante	INDUSTRIALCHIMICA SRL
--------------------	-----------------------

Endereço do fabricante	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Itália
Localização das instalações de fabrico	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Itália

Nome do fabricante	RATOUCY SAS
Endereço do fabricante	29 Rue de la Forêt LOOZE - BP 145 89303 JOIGNY CEDEX França
Localização das instalações de fabrico	29 Rue de la Forêt 89300 LOOZE França

Nome do fabricante	FARMAVIT OOD
Endereço do fabricante	Bul Tsar Boris III, n°63, Office n°1 1612 SOFIA Bulgária
Localização das instalações de fabrico	Industrialna str 2. - Pleven District 5960 GULIANTSI Bulgária

Nome do fabricante	EDIALUX
Endereço do fabricante	ZA MACON EST 01750 REPLONGES França
Localização das instalações de fabrico	EDIALUX BRETAGNE - ZA DE KERAMPAOU 29140 MELGVEN França

Nome do fabricante	PROFARM SA
Endereço do fabricante	Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 SINDOS Grécia
Localização das instalações de fabrico	Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 SINDOS Grécia

Nome do fabricante	FARMACHEM
Endereço do fabricante	Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grécia
Localização das instalações de fabrico	Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grécia

Nome do fabricante	AGGRESS
Endereço do fabricante	EL. VENIZELOU 158 A 16341 ATHENS Grécia
Localização das instalações de fabrico	ARMA THEBES 32200 VOIOTIA Grécia

Nome do fabricante	AGROLOGY SA
Endereço do fabricante	P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grécia
Localização das instalações de fabrico	P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grécia

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Brodifacume
------------------	-------------

---

Nome do fabricante	Activa S.rl
Endereço do fabricante	Via Feltre 32 20132 Milano Itália
Localização das instalações de fabrico	Tezza S.r.l - Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Itália

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

### 2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substância ativa	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

---

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H373: Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida { 1:indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição: }.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças.  P301 + P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS  P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.  P501: Eliminar conteúdo em com os regulamentos nacionais..

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. Ratos domésticos – Profissionais – Interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: jovens  Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 20 g - 40 g de isco por estação de isco  Número e calendário da aplicação: Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco  Material de embalagem: PE/Alumínio/poliéster

#### 4.1.1. Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### 4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

#### 4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

#### 4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

#### 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. Ratazanas (ratos) – Profissionais – Interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens  Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 100 g - 200 g de isco por estação de isco  Número e calendário da aplicação: Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco  Material de embalagem: PE/Aluminium/Polyester

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

#### **4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

#### **4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

#### **4.3. Descrição de utilizações**

**Tabela 3. Ratos domésticos e/ou ratazanas (ratos) – Profissionais – Exterior em redor de edifícios**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas

Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: Mus musculus  Nome comum: house mouse  Estádio de desenvolvimento: jovens</p> <p>Nome científico: Mus musculus  Nome comum: house mouse  Estádio de desenvolvimento: adultos</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus  Nome comum: brown rat  Estádio de desenvolvimento: jovens</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus  Nome comum: brown rat  Estádio de desenvolvimento: adultos</p>
Campo(s) de utilização	<p>utilização no exterior  outro: Outro</p> <p>Exterior em redor de edifícios</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco</p> <p>Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis.</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: Ratos domésticos: 20 – 40 g de isco por estação de isco ; Ratos castanhos : 100 g - 200 g de isco por estação de isco</p> <p>Número e calendário da aplicação:  Ratos domésticos: 20 – 40 g de isco por estação de isco</p> <p>Ratos castanhos : 100 g - 200 g de isco por estação de isco  Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco</p> <p>Material de embalagem: PE/Alumínio/poliéster</p>

#### 4.3.1. Instruções específicas de utilização

- Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

- As estações de isco devem ser visitadas [no caso de ratos - pelo menos, 2 a 3 dias no] [no caso de ratazanas - apenas 5 a 7 dias após o] início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.
- Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

#### 4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

#### 4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

#### 4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

#### 4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

#### 4.4. Descrição de utilizações

**Tabela 4. Ratos domésticos – Público em geral – Interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: jovens  Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores

	Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em saquetas para utilização em estações de isco invioláveis.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 20 g - 40 g de isco por estação de isco  Número e calendário da aplicação: Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Peso de pacote máximo de 50g (ratos domésticos) e peso de pacote máximo de 150g (ratos domésticos e ratazanas (ratos))  Material de embalagem: PE/Alumínio/poliéster

#### **4.4.1. Instruções específicas de utilização**

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### **4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

#### **4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

#### **4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

#### **4.5. Descrição de utilizações**

**Tabela 5. Ratazanas (ratos) – Público em geral – Interior**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
-----------------	--------------------

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens  Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em saquetas para utilização em estações de isco invioláveis.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 100 g - 200 g de isco por estação de isco  Número e calendário da aplicação: Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Peso de pacote máximo de 150g  Material de embalagem: PE/Alumínio/poliéster

#### **4.5.1. Instruções específicas de utilização**

As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### 4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.5.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

4.5.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.5.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

#### 4.6. Descrição de utilizações

**Tabela 6. Ratazanas (ratos) – Público em geral – Exterior em redor de edifícios**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens  Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização no exterior  Exterior em redor de edifícios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em saquetas para utilização em estações de isco invioláveis.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 100 g - 200 g de isco por estação de isco.  Número e calendário da aplicação: Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Peso de pacote máximo de 150g  Material de embalagem: PE/Alumínio/poliéster

---

--	--

#### **4.6.1. Instruções específicas de utilização**

Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### **4.6.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

**4.6.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

**4.6.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

**4.6.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

---

## Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO<sup>1</sup>

### 5.1. Instruções de utilização

#### Profissionais :

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
- O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
- Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
- As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.)
- Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
- Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas.
- Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
- O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
- Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
- Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em mais locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.
- Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada.  
Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.
- Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

---

<sup>1</sup>As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

---

### **Público em geral** :

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Antes da utilização de produtos rodenticidas, deve ser tida em conta a utilização de métodos de controlo não químicos (por exemplo, ratoeiras)
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
- As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde foi observada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
- Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
- [Não abrir as saquetas que contêm o isco - quando relevante para a formulação do isco no produto].
  
- Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados.
  
- Colocar as estações de isco longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- Não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água.
- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

## **5.2. Medidas de redução do risco**

### **Profissionais** :

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos, duas vezes por semana).
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:
  - ° O produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»)
  - ° O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
  - ° Os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»)
  
- Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.  
As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
  
- Não lavar as estações de isco com água entre as aplicações.

- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

### **Público em geral** :

- 
- Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
  - Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenção de infestação ou para detetar atividade de roedores).
  - A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que :
    - ° o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
    - ° os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).
  - Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.

As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
  - Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos, com a mesma frequência das inspeções às estações de isco.
  - Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

### **5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

- Este produto contém uma substância anticoagulante.
  - Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.
  - Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.
  - Em caso de :
    - Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
    - Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.
    - Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água.
- Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto [...]. Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia [...]
- As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos [...]»
  - Perigoso para a vida selvagem.

### **5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais [...]. Recomenda-se a utilização de luvas.

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

- Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta.
- Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.
- Prazo de validade: 2 ano

---

---

---

## **Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.
- Este produto contém um agente amargo e um corante.