

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Udder dip

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

Numărul curent: EU-0020541-0000

Numărul curent R4BP 3: EU-0020541-0001

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	9
5.1. Instrucțiuni de utilizare	9
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	9
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	10
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	10
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	10
6. Alte informații	10

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Udder Dip
Udder Dip Max
Udder D Max
Udderdine Dip
Uddine Dip
Udderdine DP
Uddine DP
Udderdine DS

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Boumatic
	Adresa	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgia
Numărul curent	EU-0020541-0000 1-1	
Numărul curent R4BP 3	EU-0020541-0001	
Data autorizației	18/11/2019	
Data de expirare a autorizației	31/10/2029	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Christeyns n.v.
Adresa producătorului	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia
Adresa locurilor de producție	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	1319 - Iod
Numele producatorului	Christeyns n.v.
Adresa producătorului	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia
Adresa locurilor de producție	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Chile

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoxilat de alcool gras			69011-36-5	500-241-6	2,99

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.
Purtați echipament de protecție a ochilor.
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Dacă iritarea ochilor persistă:Consultați medicul.
Evitați dispersarea în mediu.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizarea nr. 1.1. – Dezinfectanți pentru dezinfectia manuala prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Dezinfectanți pentru dezinfectia manuala prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Metoda (metodele) de aplicare

Sistem deschis: dezinfectie prin imersie -

pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact
pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfectie - Produsul este gata de utilizare - de două ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere din HDPE, de 1 000 kg

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor, dezinfectie prin imersie, înainte sau după mulgere.
Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfectie prin imersie.

Umpleți cana de imersie cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. La fiecare dezinfectie trebuie să se acorde atenție cantității de produs din cana de imersie. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul) și protecție pentru ochi.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

--

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizarea nr. 1.2. – Dezinfectanți pentru dezinfectia manuala prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: levuri denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfectia manuala prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfectie prin pulverizare - pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact, pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfectie prin pulverizare - Produsul este gata de utilizare - de două ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produs pentru dezinfectarea prin pulverizare a mameloanelor vacilor, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfectie prin pulverizare.

Umpleți flaconul pulverizator cu cantitatea indicată de produs nediluat, direct din ambalajul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

--

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la agenți chimici (materialul mănușilor este specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul), îmbrăcăminte de protecție, cizme rezistente la agenți chimici și protecție pentru ochi.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Utilizarea nr. 1.3. – Dezinfectanți pentru dezinfectia automata prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: levuri denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectanți pentru dezinfectia automata prin imersie, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: dezinfectie prin imersie - pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact,

	<p>pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfectie prin imersie - Produsul este gata de utilizare - de trei ori pe zi</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg</p>

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Produs pentru dezinfectarea mameloanelor vacilor, dezinfectie prin imersie, înainte sau după mulgere.</p> <p>Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 10 ml pentru fiecare dezinfectie prin imersie.</p> <p>Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.</p>
--

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1</p>

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

<p>Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1</p>

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

<p>Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1</p>

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Utilizarea nr. 1.4. – Dezinfectanți pentru dezinfectia automata prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: levuri
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Dezinfectanți pentru dezinfectia automata prin pulverizare, pre- sau post-mulgere, a mameloanelor vacilor

Metoda (metodele) de aplicare

Sistem deschis: dezinfectie prin pulverizare -
pentru pre-mulgere: min. 1 minut timp de contact,
pentru post-mulgere: min. 5 minute timp de contact.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfectie prin pulverizare - Produsul este gata de utilizare - de trei ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

butoaie din HDPE de 20 kg, 60 kg, 200 kg și 210 kg, precum și containere IBC din HDPE, de 1 000 kg

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produs pentru dezinfectarea prin pulverizare a mameloanelor vacilor, înainte sau după mulgere.

Aplicați o cantitate suficientă de produs, astfel încât întregul mamelon al vacii să fie acoperit; maximum 15 ml pentru fiecare dezinfectie prin pulverizare.

Utilizați produsul nediluat, direct din recipientul original. În vederea reducerii expunerii pielii, se recomandă utilizarea unei pompe de dozare pentru transferul produsului în dispozitivul de aplicare.

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta RCP 1

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Produsele trebuie să aibă o temperatură de peste 20°C înainte de utilizare.

Pentru dezinfectia pre-mulgere: dezinfectați cu produsul întregul mamelon, lăsați să acționeze 60 de secunde, apoi uscați bine mameloanele, folosind prosoape de unică folosință, pentru a evita contaminarea laptelui.

Pentru dezinfectia post-mulgere: Mameloanele ar trebui dezinfectate cât mai curând posibil după mulgere, în așa fel încât să fie acoperite în întregime. Lăsați mameloanele să se usuce la aer. Vacile ar trebui să stea în picioare până când produsul se usucă complet (cel puțin 5 minute).

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare pre- și post-mulgere, trebuie să se ia în considerare folosirea altui produs biocid care nu conține iod, pentru dezinfectarea fie înainte, fie după mulgere.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Măsuri de prim ajutor: informații generale: îndepărtați imediat îmbrăcămintea care a intrat în contact cu produsul
În caz de inhalare: leșiți la aer curat; consultați medicul în cazul în care persoana prezintă simptome.
În caz de contact cu pielea: Spălați bine pielea afectată. În general, produsul nu irită pielea.

În caz de contact cu ochii: Separați pleoapele și clătiți timp de câteva minute, cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

În caz de înghițire: Clătiți bine gura, apoi beți apă. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Nu permiteți ca produsul să intre în sistemele de canalizare sau în cursurile de apă de suprafață sau de adâncime.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

După încheierea dezinfectiei, eliminați produsul nefolosit și ambalajul, în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi aruncat în sistemul public de canalizare sau eliminat la depozitul de gunoi, în funcție de reglementările locale. Evitați eliminarea la o stație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Feriți de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate: 2 ani

6. Alte informații