

**SK**

***PRÍLOHA***

**ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU**

Storm Ultra

**Typ(y) výrobku**

PT14: Rodenticídy

**Číslo autorizácie: SK19-MRP-010**

**Číslo položky v R4BP: SK-0017643-0000**

## Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

### 1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	Storm Ultra Storm Ultra Secure Storm Ultra Block Baits (BB) Veor Secuvia Veor Secure Secuvia Secure Floku-Rat Floku-Rat Secure
------------------------	--

### 1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	BASF Slovensko s r.o.
	Adresa	BASF Slovensko spol.s r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava Slovensko
Číslo autorizácie		SK19-MRP-010
Číslo položky v R4BP		SK-0017643-0000
Dátum autorizácie		08/04/2019
Dátum skončenia platnosti autorizácie		31/12/2026

### 1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 St. Michaels Industrial Estate WA8 8TJ Widnes Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 2 Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar- Ebenhausen Nemecko

### 1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Flokumafén
Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 Lower Road WA8 8 NS Halebank Widnes Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

---

## Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Flokumafén	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4- tetrahydro-3- [4-(4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1- naphthyl]coumarin	účinná látka	90035-08-8	421-960-0	0,0025

### 2.2. Typ(y) úpravy

RB Návnada (pripravená na použitie)

---

### Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P103: Pred použitím si prečítajte etiketu.

## Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

### 4.1. Opis použitia

**Tabuľka 1. Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory**

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: Dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1 - 2 metre.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 15 g - 100 g. Návnady (5 g / 25 g) balené v: - predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znovu-uzatvárateľnej nádobe alebo v znovu-uzatvárateľnej lepenkovej škatuli - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedierkach s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.1.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje v na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. “použité len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácii”);

- používatelia musia správne označiť návnadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3. SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčaní výrobcu).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používatel mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### 4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.2. Opis použitia

#### Tabuľka 2. Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Vnútorné priestory

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5 - 10 metrov.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 50 g - 300 g Návnady (5 g / 25 g) balené v: - predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znovu-uzatvárateľnej nádobe alebo v znovu-uzatvárateľnej lepenkovej škatuli - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedierkach s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách

#### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.2.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje v na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. “použite len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácii”);

- používatelia musia správne označiť návnadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3. SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčaní výrobku).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### 4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.2.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.3. Opis použitia

**Tabuľka 3. Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov**

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie  Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 - 10 metrov.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 50 g - 300 g Návnady (5 g / 25 g) balené v:



<ul style="list-style-type: none"><li>- predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znovu-uzatvárateľnej nádobe alebo v znovu-uzatvárateľnej lepenkovej škatuli</li><li>- PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedierkach s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</li><li>- PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</li></ul>
--

#### **4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie**

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky do blízkosti kanalizačných systémov alebo v blízkosti povrchových vôd (napr. riek, rybníkov, vodných kanálov, hrádz, zavlažovacích kanálov), kde môžu prísť do kontaktu s vodou.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### **4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie**

#### **4.3.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie**

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje v na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. “použite len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácii”);

- používatelia musia správne označiť návnadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3. SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčaní výrobku).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### **4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### **4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.3.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

## 4.4. Opis použitia

**Tabuľka 4. Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory**

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: mláďatá
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1 - 2 metre.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 3 kg – 10 kg Návnady (5 g / 25 g) balené v: - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedrách s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách

### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.4.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.5. Opis použitia

#### Tabuľka 5. Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 50 g – 75 g návnady na deratizačnú stanicu.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5 - 10 metrov.

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Veľkosť balenia: 3 kg – 10 kg</p> <p>Návnady (5 g / 25 g) balené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedrách s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</li> <li>- PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</li> </ul>

#### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.5.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.6. Opis použitia

#### Tabuľka 6. Myš domová a potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
-------------	-------------------

V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: dospelé /mladé</p> <p>Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé</p> <p>Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé</p>
Oblasť(-i) použitia	<p>vonkajšie použitie</p> <p>Vonku okolo budov</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: aplikácia návnady</p> <p>Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.</p>
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Myš: 15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku, potkany: 50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku.</p> <p>Riedenie (%): -</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1 - 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5 - 10 metrov.</p>
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Veľkosť balenia: 3 kg – 10 kg Návnady (5 g / 25 g) balené v: - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedrách s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</p>

#### 4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni (myši) a každých 5 až 7 dní (potkany) na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.6.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

#### 4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.6.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.7. Opis použitia

**Tabuľka 7. Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory**

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: dospelé /mladé  Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie

	Vnútorne priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto, potkany: 50 g - 70 g na každé návnadové miesto.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Pulzné umiestnenie návnady. Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto. Potkany: 50 g - 70 g na každé návnadové miesto.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 3 kg – 10 kg Návnady (5 g / 25 g) balené v: - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov) vedrách s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách

#### 4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nahraďte skonsumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7-dňových intervaloch.

Pozbierajte rozliatu/rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Vymeňte skonsumované návnady až po 3 dňoch, a potom najviac v 7-dňových intervaloch. Pozbierajte vysypanú návnadu a odstráňte uhynuté hlodavce.

Na konci aplikácie odstráňte zvyšky výrobku.

#### 4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.7.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

#### 4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.7.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.8. Opis použitia

**Tabuľka 8. Myš a potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov**

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: dospelé / mladé
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie  Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady  Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto, potkany: 50 g - 70 g na každé návnadové miesto.  Riedenie (%): -  Počet a časový rozvrh aplikácie: Pulzné umiestnenie návnady.



	<p>Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto.  Potkany: 50 g - 70 g na každé návnadové miesto, 50 g - 75 g návnady na brloh.</p>
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Veľkosť balenia: 3 kg – 10 kg  Návnady (5 g / 25 g) balené v:  - PP alebo HDPE alebo PET alebo PE (alebo kombinácia uvedených materiálov), vedrách s vrchnákom a znovu-uzatvárateľných nádobách alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách  - PP alebo PE alebo PET alebo HDPE (alebo kombinácia uvedených materiálov) lemovaných znovu-uzatvárateľných nádobách ako je téglik, plechovka alebo lepenkový kartón alebo v pružných a znovu-uzatvárateľných vreckách</p>

#### 4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Skonzumovanú návnadu nahradte až po 3 dňoch a potom v maximálne 7-dňových intervaloch. Zozbierajte všetku uniknutú návnadu a mŕtve hlodavce.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Pri vonkajšom použití musia byť návnadové miesta zakryté a umiestnené na strategických bodoch s cieľom minimalizovať expozíciu iných ako cieľových druhov.

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia iných ako cieľových druhov a detí.

Zakryte alebo zablokujte vstupy do nôr s návnadami, aby ste obmedzili riziko odmietnutia alebo vyplavenia návnady.

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminované nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

#### 4.8.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

#### 4.8.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

#### 4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

---

**4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

**4.8.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

---

## Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE<sup>1</sup>

### 5.1. Návod na použitie

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechý, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

#### Profesionáli a vyškolení profesionáli:

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### Profesionáli a vyškolení profesionáli:

---

<sup>1</sup>Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

---

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

#### Len profesionáli:

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne). [Ak je to náležité, uveďte ak sa vyžaduje častejšia alebo každodenná kontrola].

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“),
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3. SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

#### Len vyškolení profesionáli:

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom,
- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút,
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí.

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“; „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“; „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Nepoužite obaly na žiaden iný účel.

Odporúča sa používanie rukavíc.

---

### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajúce na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúce na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Doba použiteľnosti výrobku je 3 roky.

---

## **Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu **prenášať** choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.