

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** INSECTRAC SPTab

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** FR-2017-0002

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** FR-0014018-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	2
4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques	4
4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	4
4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	4
4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage	5
4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	5
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

INSECTRAC SPTab
-----------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	International Pheromone Systems Ltd.
	Adresse	Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road CH41 1FL Birkenhead Royaume-Uni
<b>Numéro de l'autorisation</b>	FR-2017-0002	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	FR-0014018-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	20/07/2016	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	20/07/2026	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	International Pheromone Systems Ltd.
<b>Adresse du fabricant</b>	Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road, Wallasey CH41 1FL Wirral Royaume-Uni
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road, Wallasey CH41 1FL Wirral Royaume-Uni

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1433 - Acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle
<b>Nom du fabricant</b>	Aeroxon GmbH
<b>Adresse du fabricant</b>	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Allemagne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Allemagne

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle		Substance active	30507-70-1		1

### 2.2. Type de formulation

CP - Poudre de contact
------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	
<b>Conseils de prudence</b>	

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

## 4.1 Description de l'utilisation

### Utilisation 1 - Professionnels

<b>Type de produit</b>	TP19 - Répulsifs et appâts
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Destiné à être utilisé uniquement par des opérateurs professionnels comme substance attractive / de confusion sexuelle.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Plodia interpunctella---Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs) Ephestia kuehniella---Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs) Ephestia elutella---Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs) Cadra cautella---Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs) Cadra figuliella---Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs)
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Intérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Application manuelle - On insère un comprimé dans un diffuseur en plastique. On fixe cet ustensile sur des murs, piliers, machines et autres surfaces appropriées (autrement dit, hors emplacements surplombant des tapis roulants ou des lieux de préparation de la nourriture sur lesquels la poudre pourrait tomber). Les diffuseurs sont installés à 1-2 mètres au-dessus du sol à raison de 1 comprimé par 25 m2 de superficie.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	10 mg (1 comprimé) par 25 m2 - 0 - 10 mg (1 comprimé) par 25 m2 Remplacer les comprimés tous les 60 jours
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Industriel  Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Sachet, Plastique composite: , 80 x 130 x 25 mm boîte papier, carton, 130 x 70 x 33 mm  Sachet DOY multicouche en PE/PET contenant 24 comprimés de 1 g, placé à l'intérieur d'une boîte externe  Sceau d'inviolabilité  Le produit INSECTRAC SPTab se compose de comprimés constitués de poudre Entostat contenant des phéromones de apillons nocturnes, ainsi que d'une trousse de mise en œuvre. Les comprimés INSECTRAC SPTab et la trousse de mise en œuvre sont emballés séparément. La trousse de mise en œuvre comprend : - une boîte contenant 24 diffuseurs en plastique munis d'un tampon adhésif ; - une boîte contenant 24 comprimés - une notice d'utilisation.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Après insertion du comprimé dans un diffuseur en plastique, on fixe cet ustensile sur des murs, piliers, machines et autres surfaces appropriées (autrement dit, hors emplacements surplombant des tapis roulants ou des lieux de préparation de la nourriture sur lesquels la poudre pourrait tomber). On installe les diffuseurs à 1-2 mètres au-dessus du sol.

Les instructions de mise en œuvre sont les suivantes :

- Poussez fermement le comprimé dans le support, en laissant environ 50% exposé.
- Retirez la protection plastique du collant de montage à l'arrière du support.
- Nettoyer la surface du substrat et appuyer le support sur le substrat, le comprimé tête en haut.

Application à raison de 1 comprimé (10,0 mg de substance active) pour 25,0 m<sup>2</sup> de superficie et pendant une période de 60 jours par comprimé. .

Conserver dans un endroit sans danger.

Conserver le produit non ouvert à 25 °C maximum.

Utiliser dans les 6 mois.

Une fois que le produit n'est plus conservé au froid, l'utiliser sous deux semaines.

Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Destiné à être utilisé uniquement par des opérateurs professionnels

DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL Concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les Risques associés aux agents chimiques sur le lieu de travail peuvent s'appliquer à l'utilisation de ce produit .

Ne pas utiliser dans des endroits où de l'eau, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux pourraient être contaminés. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

Pour usage intérieur uniquement.

Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après manipulation.

Conserver dans un endroit sans danger.

Conserver le produit non ouvert à 25 °C maximum.

Utiliser dans les 6 mois.

Une fois que le produit n'est plus conservé au froid, l'utiliser sous deux semaines.

Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

Ne pas appliquer directement sur le plant de tabac.

Tenir hors de portée des enfants

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Après inhalation: Transporter la personne à l'extérieur. S'il y a difficulté à respirer ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau: Laver la peau à l'eau et au savon.

Après contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Après ingestion: Se rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.

Mesures à prendre en cas de rejet accidentel:  
Les déversements accidentels peuvent rendre le sol glissant. Éviter la formation de poussières

Précautions pour la protection de l'environnement:  
En cas de déversement accidentel important, recueillir le matériel répandu et l'éliminer dans le respect des mesures de sécurité.

#### **4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

L'emballage doit être éliminé conformément à la réglementation locale.

Ne pas jeter à l'égout.

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver le produit non ouvert à 25 °C maximum.  
Utiliser dans les 6 mois.  
Une fois que le produit n'est plus conservé au froid, l'utiliser sous deux semaines.  
Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

Durée de stockage: 6 mois à 25°C.

## **5. Conditions générales d'utilisation**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les doses d'emploi du produit.
- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Poussez fermement le comprimé dans le support, en laissant environ 50% exposé.
- Retirez la protection de l'adhésif de fixation à l'arrière du support.
- Nettoyez la surface du support et appuyez sur le distributeur pour placer la tablette dans la bonne position : l'extrémité supérieure de la tablette vers le haut.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Ne pas utiliser dans des endroits où de l'eau, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux pourraient être contaminés.
- Éliminer le produit et son récipient conformément à la réglementation locale.
- Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après manipulation.
- Conserver dans un endroit sûr.
- Ne pas appliquer directement sur le plant de tabac.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du produit.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- Après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur. S'il y a difficulté à respirer ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Après contact avec la peau: Laver la peau à l'eau et au savon.
- Après contact avec les yeux: Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Après ingestion: Se rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- L'emballage doit être éliminé conformément à la réglementation locale.
- Les poussières peuvent rendre le sol glissant, éviter leur formation.
- Si de grande quantité de produit ont été répandue accidentellement, les recueillir et les éliminer conformément à la réglementation locale.
- Le nettoyage des résidus de poudre peut se faire en essuyant / épongeant la zone avec un détergent doux.
- Ne pas jeter dans les égouts.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de stockage: 6 mois à 25°C.
- Une fois que le produit n'est plus conservé au froid, l'utiliser sous deux semaines.
- Utiliser immédiatement après ouverture

#### **6. Autres informations**

-