

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: Teat disinfection biocidal product family

Τύπος(οι) προϊόντος: PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας: 1600-1610/4-4-2023

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0030904-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνοψη και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	3
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 1	3
2. Σύνοψη της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	4
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	4
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	6
6. Άλλες πληροφορίες	7
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	7
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 2	8
2. Σύνοψη της μετα-SPC	8
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	9
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	9
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	12
6. Άλλες πληροφορίες	13
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	13
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 3	14
2. Σύνοψη της μετα-SPC	14
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	15
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	15
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	17
6. Άλλες πληροφορίες	18
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	18
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 4	20
2. Σύνοψη της μετα-SPC	20
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	20

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	21
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	29
6. Άλλες πληροφορίες	30
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	31
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 5	32
2. Σύνοψη της μετα-SPC	32
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	33
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	33
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	36
6. Άλλες πληροφορίες	37
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	37
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 6a	39
2. Σύνοψη της μετα-SPC	39
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	40
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	40
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	48
6. Άλλες πληροφορίες	49
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	49
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 6b	50
2. Σύνοψη της μετα-SPC	50
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	51
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	51
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	59
6. Άλλες πληροφορίες	60
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	60
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 7	61
2. Σύνοψη της μετα-SPC	61
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	62
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	62
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	71

6. Άλλες πληροφορίες	72
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	72

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

Teat disinfection biocidal product family

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Evans Vanodine International PLC
Διεύθυνση	Brierley Road Walton Summit PR5 8AH Preston Ηνωμένο Βασίλειο
Αριθμός άδειας	1600-1610/4-4-2023

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0030904-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

04/04/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31/12/2033

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Evans Vanodine International

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Ηνωμένο Βασίλειο

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1319 - Ιώδιο
Όνομα του παρασκευαστή	ACF Minera S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	San Martin No. 499 - Iquique Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lagunas Mine - Pozo Almonte Χιλή
Δραστηκής ουσίας	1319 - Ιώδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Los Militares 4290, Piso 4 - Las Condes, Santiago Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nueva Victoria Plant, Pedro de Valdivia Plant - Northern Chile Χιλή
Δραστηκής ουσίας	1319 - Ιώδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Cosayach Nitratos S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Hnos Amunategui 178 - Santiago Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Χιλή
Δραστηκής ουσίας	1319 - Ιώδιο
Όνομα του παρασκευαστή	ISE CHemical Corporation
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Shirasato Plant - Ιαπωνία

2. Σύθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,112 - 2,346
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	0,38 - 19,993

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

SL - Πυκνό διάλυμα

AL - Κάθε άλλο υγρό

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 1

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,112 - 0,12

Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	0,71 - 1,19
----------------------	--	----------------------	-------------	-----------	-------------

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών
γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το
άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:

	<p>Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.</p> <p>1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός: α. Εμβάπτιση βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία</p> <p>β. Αφρισμός βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία</p> <p>Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).</p> <p>Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.</p> <p>2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα: βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία αυτού του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα $\frac{2}{3}$ με προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε χρόνο επαφής τουλάχιστον 60 δευτερολέπτων, στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερολέπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.

Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων:

Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μπορείτε να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στον υπόνομο ή σε χώρο συγκέντρωσης κοπριάς, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την αποδέσμευση σε ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Pre-Dip

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0001 1-1

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,112
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	0,953

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 2

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειάς

1-2

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,33
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	0,38 - 0,63

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).

Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).

Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).

Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).

Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L
IBC (HDPE) 1000L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά). Χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση. Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβάψτε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται. Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

3. Αυτόματη εμφύσηση

Οι θηλές επικαλύπτονται με το προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός

Οι θηλές υποβάλλονται σε ρομποτικό καθαρισμό με αυτόματες βούρτσες. Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.

Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μπορείτε να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στον υπόνομο ή σε χώρο συγκέντρωσης κοπριάς, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφεύγετε την αποδέσμευση σε ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 18 μήνες.

Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

PV-Pro

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0002 1-2

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,291
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	0,5

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC**1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC**

Meta SPC 3

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-3

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,269 - 0,5245
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	2,304 - 4,4702

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μετά το άρμεγμα - μη αυτόματη εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι</p> <p>επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Μη αυτόματη εμφύσηση Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή μετά το άρμεγμα</p> <p>Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.</p> <p>Μη αυτόματη εμφύσηση βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά). Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.
Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:
Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μπορείτε να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στον υπόνομο ή σε χώρο συγκέντρωσης κοπριάς, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφεύγετε την αποδέσμευση σε ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Masofilm

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0003 1-3

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,269
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	2,304

Εμπορική ονομασία

Visqodip

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0004 1-3

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,5245
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	4,4702

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 4

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-4

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,272 - 0,273
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	2,31 - 2,31

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

	<p>Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.</p> <p>2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα: βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Αφήστε χρόνο επαφής τουλάχιστον 60 δευτερολέπτων, στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

• βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία

• πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

• αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

• βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

• πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

• αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).

Αυτόματη εμβάπτιση:

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

	<p>αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία</p> <p>Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή μετά το άρμεγμα Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός: βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.</p> <p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά). Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.
Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.
Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

3. Αυτόματη εμβάπτιση
Οι θηλές επικαλύπτονται με το προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός
Οι θηλές υποβάλλονται σε ρομποτικό καθαρισμό με αυτόματες βούρτσες. Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Πριν και μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν και μετά το άρμεγμα.

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (2-6 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

- βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
- πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
- αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

- βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
- πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
- αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (2-6 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

- βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
- πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
- αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Μετά το άρμεγμα: Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβάψτε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Αφήστε χρόνο επαφής τουλάχιστον 60 δευτερολέπτων, στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Εμβάψτε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Για μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμό:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.
Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:
Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μπορείτε να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στον υπόνομο ή σε χώρο συγκέντρωσης κοπριάς, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφεύγετε την αποδέσμευση σε ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Allantocare	περιοχή της αγοράς: GR
	Pre-Post Gold	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	GR-0030904-0005 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,272
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	2,31

Εμπορική ονομασία	Contact	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	GR-0030904-0006 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,273
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	2,31

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 5

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-5

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,526 - 0,527
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	4,479 - 4,492

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

	<p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-


4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση



5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά). Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός
Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται. Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.
2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήριο
Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.
3. Αυτόματη εμφύσηση
Οι θηλές επικαλύπτονται με το προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος
Οι θηλές υποβάλλονται σε ρομποτικό καθαρισμό με αυτόματες βούρτσες. Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήριο:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:
· Ερεθισμός των ματιών.
Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:
Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.
ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Μπορείτε να απορρίψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στον υπόνομο ή σε χώρο συγκέντρωσης κοπριάς, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφεύγετε την αποδέσμευση σε ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.
Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Masocare Extra

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0007 1-5

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,526
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	4,479

Εμπορική ονομασία

Masocare RTU

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0008 1-5

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,526
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	4,479

Εμπορική ονομασία

Masodine RTU

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0009 1-5

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,527
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	4,492

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 6a

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-6

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,881 - 1,191
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	7,448 - 10,076

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

SL - Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερόλεπτων.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια

σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L

Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L

IBC (HDPE) 1000L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.
Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση. Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 3 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.
1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν.
Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης. Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.
Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.
2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός
βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

	<p>Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός: βοοειδή και βουβαλοί: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.</p> <p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: βλ. παραπάνω</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.
 Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.
 Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 3 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.
 Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.
 Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.
 Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.
 Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.
 Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).
 1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
 Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.
 Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.
2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν.
Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.
3. Αυτόματη εμβάπτιση
Οι θηλές καλύπτονται με το αραιωμένο προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος
Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το αραιωμένο προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Πριν και μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν και μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια

σταδίου ανάπτυξης)

στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι
επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός:
α. Εμφύσηση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.</p> <p>Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.</p> <p>Μετά το άρμεγμα: Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).</p> <p>Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.</p> <p>Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.</p> <p>Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.</p> <p>Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.</p> <p>Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 3 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.</p> <p>1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται. Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.</p> <p>2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης. Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.</p>
--

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:
· Ερεθισμός των ματιών.
Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:
Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.
ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
Μην απορρίπτετε σε συστήματα αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.
Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

Σημειώστε ότι εάν γίνουν οποιοσδήποτε προσθήκες σε αυτή τη σειρά Meta-SPC, οι συγκεντρώσεις κατά τη χρήση πρέπει να εμπίπτουν εντός του εύρους που καλύπτεται από τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων.

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Pro-Tec 1:3	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας	GR-0030904-0010 1-6	
<small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>		

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,036
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	8,762

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 6b

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-7

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,646 - 2,228
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	14,034 - 16,51

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

SL - Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L

Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L

IBC (HDPE) 1000L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής. Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.
Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση. Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 7 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.
1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν.
Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης. Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.
Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.
2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήριο
Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήριο:
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση

Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L
IBC (HDPE) 1000L

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.
Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.
Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 3 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.
Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.
Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.
Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.
Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).
1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.
Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.
2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν.
Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.
3. Αυτόματη εμβάπτιση
Οι θηλές καλύπτονται με το αραιωμένο προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος
Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το αραιωμένο προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.
Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Πριν και μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν και μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια

σταδίου ανάπτυξης)

στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός:

α. Εμφύσηση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγάλη συσκευασία και υλικό συσκευασίας

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L
IBC (HDPE) 1000L

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Μετά το άρμεγμα: Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

Οι αραιώσεις είναι διαφορετικές για πριν και μετά το άρμεγμα, συνεπώς απαιτούνται ξεχωριστά κύπελλα θηλής. Βλ. ειδικές οδηγίες. Πριν από το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 7 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά. Μετά το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 3 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης. Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

- Ερεθισμός των ματιών.

Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

--

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
Μην απορρίπτετε σε συστήματα αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.
Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

Σημειώστε ότι εάν γίνουν οποιεσδήποτε προσθήκες σε αυτή τη σειρά Meta-SPC, οι συγκεντρώσεις κατά τη χρήση πρέπει να εμπίπτουν εντός του εύρους που καλύπτεται από τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων.

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Masodine 1:3

περιοχή της αγοράς: GR

Αριθμός άδειας

GR-0030904-0011 1-7

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP
3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,937
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	16,51

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 7

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-8

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	2 - 2,346
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	18 - 19,993

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

SL - Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:
α. Εμβάπτιση
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός
βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L
IBC (HDPE) 1000L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 9 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβυθίστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.

Για μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμό:

Η χρήση μέσω ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Η χρήση μέσω ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: βακτήρια Κοινή ονομασία: βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή μετά το άρμεγμα Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά. 1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός α. Εμβάπτιση βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία β. Αφρισμός βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 4 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβάπτιστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

3. Αυτόματη εμβάπτιση

Οι θηλές καλύπτονται με το αραιωμένο προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκάσμος

Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το αραιωμένο προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Για μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμό, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση και αυτόματο ρομποτικό ψεκάσμο:

Η χρήση μέσω ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Πριν και μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν και μετά το άρμεγμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/Ι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το

	<p>άρμεγμα.</p> <p>1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός: α. Εμβάπτιση βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία</p> <p>β. Αφρισμός βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία</p> <p>Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή</p> <p>Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.</p> <p>2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα: βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω</p> <p>Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L</p>

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Μετά το άρμεγμα: Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Οι αραιώσεις είναι διαφορετικές για πριν και μετά το άρμεγμα, συνεπώς απαιτούνται ξεχωριστά κύπελλα θηλής. Βλ. ειδικές οδηγίες.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραιώση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

Πριν από το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 9 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Μετά το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 4 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

1. Μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκάσμος με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Για μη αυτόματη εμφύσηση/αφρισμό:

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκάσμο με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.

Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων:

Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
Μην απορρίπτετε σε συστήματα αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.
Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

Σημειώστε ότι εάν γίνουν οποιεσδήποτε προσθήκες σε αυτή τη σειρά Meta-SPC, οι συγκεντρώσεις κατά τη χρήση πρέπει να εμπίπτουν εντός του εύρους που καλύπτεται από τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων.

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Masocare 1:4	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	GR-0030904-0012 1-8	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	2,346
Αλκοολαιθοξυλεστέρας	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	19,993

