

EN

ANNEX

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A BIOCIDAL PRODUCT

Rodex Oktablok

Product type(s)

PT14: Rodenticides

Authorisation number: 1548-1, 1548-5

R4BP asset number: BG-0009953-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s)	Rodex Oktablok
---------------	----------------

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	PelGar International Limited
	Address	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon France
Authorisation number	1548-1, 1548-5	
<i>R4BP asset number</i>	BG-0009953-0000	
Date of the authorisation	17/10/2012	
Expiry date of the authorisation	31/12/2026	

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer	PelGar International Limited
Address of manufacturer	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Location of manufacturing sites	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	Bromadiolone
Name of manufacturer	PelGar International Limited
Address of manufacturer	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Location of manufacturing sites	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

2. PRODUCT COMPOSITION AND FORMULATION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Bromadiolone		active substance	28772-56-7	249-205-9	98 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation

RB Bait (ready for use)

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazard statements	
Precautionary statements	P102: Keep out of reach of children.

4. AUTHORISED USE(S)

4.1. Use description

Table 1. rodenticides

Product type	PT14: Rodenticides
Where relevant, an exact description of the authorised use	Родентицид за контрол на числеността на <i>Rattus norvegicus</i> (сив плъх) и <i>Mus musculus</i> (домашна мишка). За употреба на закрито и открито (само около сгради) (професионална и масова употреба) и в канализационната мрежа (само за професионална употреба).
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: <i>Mus musculus</i> Common name: house rat Development stage: adults
Field(s) of use	indoor use outdoor use Родентицид за контрол на числеността на <i>Rattus norvegicus</i> (сив плъх) и <i>Mus musculus</i> (домашна мишка). За употреба на закрито и открито (само около сгради) (професионална и масова употреба) и в канализационната мрежа (само за професионална употреба).
Application method(s)	Method: bait application Detailed description: Родентицид за контрол на числеността на <i>Rattus norvegicus</i> (сив плъх) и <i>Mus musculus</i> (домашна мишка). За употреба на закрито и открито (само около сгради) (професионална и масова употреба) и в канализационната мрежа (само за професионална употреба).
Application rate(s) and frequency	Application rate: 40 - 200 g Dilution (%): 98 Number and timing of application: Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните

кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелевите видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който да ограничава достъпът на нецелев организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелев организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове: при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелев животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелев животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелев животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол

	<p>в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К</p>
Category(ies) of users	professional ; general public (non-professional)
Pack sizes and packaging material	<p>Paper, cardboard, Baitbox, 160 g - 20 kg 1 или 2 x 20 g блокчета в защитени срещу отваряне дератизационни кутии от HDPE или PP за мишки (за еднократна употреба или презареждащи се). Дератизационните кутии са опаковани по 1, 2, 3 или 4 във външна картонена кутия. - 160 g 1 или 2 x 15 g блокчета в защитени срещу отваряне дератизационни кутии от HDPE или PP за мишки (за еднократна употреба или презареждащи се). Дератизационните кутии са опаковани по 1, 2, 3 или 4 в картонена кутия. - 120 g 10, 11 или 12 x 15 g блокчета в защитени срещу отваряне дератизационни кутии от HDPE или PP за плъхове (за еднократна употреба или презареждащи се). Дератизационните кутии са опаковани по 1, 2, 3 или 4 в картонена кутия. - 720 g 8, 9 или 10 x 20 g блокчета в защитени срещу отваряне дератизационни кутии от HDPE или PP за плъхове (за еднократна употреба или презареждащи се). Дератизационните кутии са опаковани по 1, 2, 3 или 4 в картонена кутия. - 800 g 1 или 2 x 100 g блокчета в защитени срещу отваряне дератизационни кутии от HDPE или PP за плъхове (за еднократна употреба или презареждащи се). Дератизационните кутии са опаковани по 1, 2, 3 или 4 в картонена кутия. - 800 g</p>

	Насипни блокчета от 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 28 g или 100 g в полиетиленова или полипропиленова туба или кофа. 1.5 - 20 kg
--	--

4.1.1. Use-specific instructions

Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелевите видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който да ограничава достъпът на нецелев организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелев организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове: при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелев животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелев животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелев животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени

в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третиранията трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелевите видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който да ограничава достъпът на нецелевите организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелевите организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове: при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелевите животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелевите животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелевите животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време

на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелевите видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който да ограничава достъпът на нецелев организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелев организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове: при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелев животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелев животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени

и безопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелесъобразните видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде безопасна и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг начин, който да ограничава достъпът на нецелесъобразни организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелесъобразни организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове: при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или

покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка. Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употреба: Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелесъобразни животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици). Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство. Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Антидот – витамин К

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Готова за употреба примамка (парафинови блокчета). Масова употреба – в и около сгради. Срещу мишки: само в дератизационни кутии, (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа, или като покрити отровни точки с примамка. Срещу плъхове: само в защитени срещу отваряне дератизационни кутии (предварително заредени или презареждащи се), които се предлагат в търговската мрежа. За плъхове и мишки търговската опаковка на биоцида трябва да съдържа по-малки опаковки или разфасовки, като количеството от примамката във всяка от тях е по-малко или равно на количеството за една отровна точка (за плъхове или за мишки). Цялата търговска опаковка трябва да съдържа максимум 1.5 kg примамка. Дератизационните кутии и примамките в отровните точки се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Препоръчва се дератизационните кутии да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Разходна норма:- мишки: при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m.- плъхове: при висока заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 5 m; при ниска заселеност до 200 g в дератизационни кутии през 10 m. Професионална употреба – в и около сгради и в канализационната мрежа. Примамките се поставят ръчно в засегнатите от гризачи райони. Методът на разполагане зависи от конкретните обстоятелства, като приоритетът е винаги да се изключи експозицията на нецелесъобразните видове, доколкото това е възможно. Начините за разполагане на примамки от професионални потребители включват защитени срещу отваряне дератизационни кутии или отровни точки с примамки, при които се използват подходящи места и/или подръчни материали, за да се ограничи достъпът до примамката. Дератизационните кутии могат да бъдат фиксирани към мястото, където са поставени. Примамката в дератизационните кутии може да бъде обезопасена и фиксирана на място, за да се сведе до минимум преместването и разпиляването ѝ от гризачите. Примамките в отровните точки могат да бъдат поставени на поставки под плочи или разположени по друг

начин, който да ограничава достъпът на нецелеливи организми. При взимане на решение за метода на приложение се прави оценка на достъпа на нецелеливи организми за съответния обект. Разходна норма:- мишки:при висока заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 2 m; при ниска заселеност - до 40 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m;- плъхове:при висока заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 5 m; при ниска заселеност - до 200 g в дератизационни кутии или покрити отровни точки през 10 m.- плъхове в канализационната мрежа – до 200 g на отровна точка.Инструкции за безопасна употреба – за професионална и масова употребаРъцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене и след употреба на биоцида.Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелеливи животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други нецелеливи животни (особено за кучета, котки, прасета, домашни птици).Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум рискът от консумация от деца или нецелеливи животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени.Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице. В повечето случаи антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни.Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с което примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното законодателство.Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне.При използване на дератизационни кутии, защитени срещу отваряне, те трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.Антидот – витамин К

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE¹

5.1. Instructions for use

5.2. Risk mitigation measures

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

¹Instructions for use, risk mitigation measures and other directions for use under this section are valid for any authorised uses.

6. OTHER INFORMATION