

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: ZZ FAMILY

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0022123-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0022123-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

ZZ FAMILY
ZZ EXTREME

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	ZELNOVA ZELTIA S.A.
	Adresa	Poligono Torneiros s/n 36400 O Porriño Španělsko
Číslo povolení	CZ-0022123-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0022123-0000	
Datum udělení povolení	17/01/2020	
Datum skončení platnosti povolení	16/05/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	ZELNOVA ZELTIA S.A.
Adresa výrobce	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Španělsko
Umístění výrobních závodů	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Španělsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck S.L.U.
Adresa výrobce	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španělsko
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Španělsko
Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck KGaA
Adresa výrobce	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Německo
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španělsko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Etanol 96%	Ethanol		64-17-5	200-578-6	35

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obal a nepotřebovaný přípravek jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů..

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Sprej, který odpuzuje komáry a klíšťata od lidské kůže (široká veřejnost)

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Repellent

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Culicidae:
Obecný název: Mosquitoes
Vývojové stadium: Dospělci|Hmyz, savci (například hlodavci)

Latinský název: Ixodidae:
Obecný název: Ticks
Vývojové stadium: other:všechny

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Používejte jen v dobře větraných místnostech a ve venkovních prostorách. ZZ FAMILY je přípravek k okamžitému použití, který v mírném podnebí odpuzuje hmyz a chrání tak lidi před komáry a klíšťaty. Tento přípravek není určený k použití v tropických oblastech. Repellent aplikujte na kůži, výhradně na nechráněné části těla (jen na tvář, ruce, paže, nohy a chodidla).

Metoda(y) aplikace

Stříkání -

Stříkejte přímo na obnaženou kůži a rukou rozetřete.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

dospělí: 3 g nebo asi 26 stříků; děti: 1,6 g nebo asi 14 stříků; batolata: 0,83 g nebo asi 7 stříků - Připraven k použití (není třeba ředit) -

Aplikujte velmi tenkou rovnoměrnou vrstvu na nechráněné části těla (jen na tvář, ruce, paže, nohy a chodidla).
Dávka na použití:

- dospělí: 3 g nebo asi 26 stříků
- Děti: 1,6 g nebo asi 14 stříků
- batole: 0,83 g nebo asi 7 stříků

ZZ FAMILY je určen k použití v létě, kdy je hmyzu nejvíce. Obvykle se aplikuje jednou denně, v závislosti na venkovních aktivitách, počasí a přítomnosti hmyzu. Aplikaci lze opakovat v případě potřeby (výrazné snížení ochrany), pokud je to povoleno (viz pokyny na štítku). Sprej s pumpičkou lze aplikovat až 3krát denně u dospělých, až 2krát denně u dětí nad 2 roky a jednou denně u dětí mezi 1 a 2 roky. Tento přípravek lze používat jen u dětí starších 1 roku.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Láhev, plastová: HDPE, ≥ 25,0 - ≤ 750,0 mL

Láhev je uzavřená pumpičkou, která je chráněna krytkou.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Stříkejte přípravek přímo na obnaženou kůži a nanesenou kapalinu rukou rozetřete. Přípravek nanášejte POUZE na obnažené části těla a to výhradně na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář.

Přípravek nestříkejte přímo na tvář. Pokud chcete přípravek nanést na tvář, nastříkejte roztok repelentu do dlaně a rozetřete roztok po pleti, dávejte při tom pozor, abyste nezasáhli oči. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí.

U dětí pod 11 let by měli přípravek aplikovat dospělí.

Neaplikujte na dětské ruce.

Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Jen pro vnější použití.

Repelent je nutné v případě silného pocení nebo po plavání aplikovat znovu. Přípravek použijte znovu, pokud si všimnete výrazného snížení ochrany, nejpozději však po osmi hodinách po první aplikaci.

Při opakované aplikaci dodržujte maximální denní povolený počet aplikací: třikrát denně u dospělých, dvakrát denně u dětí nad 2 roky a jednou denně u dětí mezi 1 a 2 roky.

Tento přípravek lze používat u dětí starších 1 roku.

Při používání těchto přípravků u dětí je nutné být na pozoru. Používejte tyto přípravky s rozvahou.

Mechanická ochrana (oblečení, sítě proti komárům) je vždy lepší volbou.

Vyhnete se kontaktu se syntetickými materiály. Syntetické materiály by se měly při aplikaci chránit.

Aplikací přípravků se sluneční ochranou nebo kosmetiky po použití repelentu se účinnost repelentu značně sníží.

Tento přípravek není určen k použití u zvířat/domácích mazlíčků.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o přípravku.

Vhodné k použití jen u dětí starších 1 roku.

Udržujte mimo dosah dětí.

Zabraňte vdechnutí přípravku. Přípravek nestříkejte přímo na tvář.

Používejte jen venku nebo v dobře odvětrávaných prostorách.

Přípravek nanášejte POUZE na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář.

Neaplikujte pod oblečení.

Mechanická ochrana (oblečení, sítě proti komárům) je vždy lepší volbou. Jen pro vnější použití. Používejte pouze podle pokynů. Pokud je ošetření neúčinné, pak by uživatelé měli informovat přímo držitele registrace.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Způsobuje vážné podráždění očí.

Po vdechnutí: čerstvý vzduch.

V případě zasažení očí: vypláchněte velkým množstvím vody. Zavolejte očnímu lékaři.

V případě spolknutí: okamžitě dejte postiženému napít vodu (nanejvýš dvě sklenice). Konzultujte s lékařem.

Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a zpožděné: dráždivé účinky

Indikace nutného okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Žádné informace nejsou k dispozici

Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy

Informace pro nepohotovostní personál: Zabraňte vdechnutí výparů a aerosolů. Zabraňte kontaktu s látkou. Zajistěte dostatečnou ventilaci. Vyklidte nebezpečnou oblast, dodržujte nouzové postupy a poraďte se s odborníkem.

Opatření na ochranu životního prostředí: Nevypouštějte nadbytečné kapaliny do odtoku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

Se znečištěným obalem zacházejte obdobně jako se samotným přípravkem

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Přípravek, jeho obaly a materiály kontaminované přípravkem musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Chemikálie ponechte v původních obalech. Nevyhazujte společně s dalším odpadem.

Nevypouštějte nadbytečné kapaliny do kanalizace.

S nevyčištěnými nádobami zacházejte stejně jako s přípravkem samotným.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podmínky skladování:

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách >40 °C.

Skladovatelnost: 18 měsíců

Pokyny pro bezpečné zacházení: Dodržujte pokyny na štítku. Uchovávejte mimo dosah ohně, horkých povrchů a zdrojů vznícení. Provedte preventivní opatření proti statickému výboji.

Správa vystavení životnímu prostředí: Nedovolte, aby přípravek vnikl do kanalizace.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

viz kapitola 4. Povolená použití

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz kapitola 4. Povolená použití

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz kapitola 4. Povolená použití

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

viz kapitola 4. Povolená použití

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

viz kapitola 4. Povolená použití

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.