

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** BRODITEC WB-17F

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

**Číslo autorizácie:** SK23-008

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** SK-0030118-0000

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	2
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	3
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	22
5.1. Pokyny na používanie	22
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	23
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	24
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	25
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	25
6. Ďalšie informácie	25

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

BRODITEC WB-17F  
Broditop Strike WBF  
Broditop Matrix WBF  
Broditop LC WBF  
Zed Strike WBF  
Zed Matrix WBF  
Zed LC WBF  
Rodibrod Strike WBF  
Rodibrod Matrix WBF  
Rodibrod LC WBF  
Protemax Strike WBF  
Protemax Matrix WBF  
Protemax LC WBF  
Deviltop Strike WBF  
Deviltop Matrix WBF  
Deviltop LC WBF  
ZAPI-TOP Strike WBF  
ZAPI-TOP Matrix WBF  
ZAPI-TOP LC WBF  
ZAPI-RAT Strike WBF  
ZAPI-RAT Matrix WBF  
ZAPI-RAT LC WBF  
Muskil BR  
Deviltop BR  
Broditop BR  
Rodibrod BR

### 1.2. Držiteľ autorizácie

**Názov a adresa držiteľa autorizácie**

Názov/Meno	ZAPI S.p.A.
Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko
Číslo autorizácie	SK23-008
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0030118-0000
Dátum autorizácie	05/05/2023
Dátum skončenia platnosti autorizácie	16/02/2028

**1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov****Meno/Názov výrobcu**

Zapi S.p.A.

**Adresa výrobcu**

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko

**Miesto výrobných priestorov**

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Taliansko

**1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)****Účinná látka**

11 - Brodifakum

**Meno/Názov výrobcu**

P.M. Tezza S.r.l. (Art. 95 list: ACTIVA S.r.l.)

**Adresa výrobcu**

Via del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Taliansko

**Miesto výrobných priestorov**

Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio (VR) Taliansko

**2. Zloženie a úprava výrobku**

## 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Účinná látka	56073-10-0	259-980-5	0,0017

## 2.2. Typ úpravy

RB - Návnada na okamžité použitie: voskový blok

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Neuplatňuje sa na rodenticídy.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Mus musculus  
Bežný názov: Myš domová  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Oblasti použitia

Vnútorné

Vnútorné priestory.

**Spôsob(y) aplikácie**

Spôsob: aplikácia návnady  
Detailný opis:  
Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

**Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie**

Aplikačná dávka: 30-50 g  
Riedenie (%): 0  
Počet a časový rozvrh aplikácie:  
Návnadové výrobky:  
30-50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2-5 m od seba.

**Kategória(ie) používateľov**

Široká verejnosť (neprofesionálne)

**Veľkosti balenia a obalový materiál**

Maximálne množstvo návnady v predanej jednotke (výrobok na použitie pre myši a potkany): 300g v jednotlivých blokoch po 5 - 100g.

Jednotlivé bloky, individuálne zabalené v LDPE o BOPP vreckách, sú balené v:  
- blister (PVC alebo PVC + lepenka) s vnútorným plastovým vrecom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) - od 30g do 300g,  
- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- plechovka z elektrolyticky pocínovaného plechu bez povrchovej úpravy s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- lepenková škatuľa s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g.

Deratizačné staničky s jednotlivými blokmi bez vreciek sú balené v:  
- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii\* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g,  
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii\* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,  
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalené v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g.

\* deratizačná stanička môže byť zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii

**4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie**

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu..

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.2 Opis použitia

##### Použitie 2 - Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince
<b>Oblasti použitia</b>	Vnútorné  Vnútorné priestory.
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 75-100 g Riedenie (%): 0

	<p>Počet a časový rozvrh aplikácie:  Návnadové výrobky:  75-100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5-10 m od seba.</p>
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	<p>Široká verejnosť (neprofesionálne)</p>
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Maximálne množstvo návnady v predanej jednotke (výrobok na použitie pre myši a potkany): 300g v jednotlivých blokoch po 5 -100g.</p> <p>Jednotlivé bloky, individuálne zabalené v LDPE o BOPP vreckách, sú balené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blister (PVC alebo PVC + lepenka) s vnútorným plastovým vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) - od 30g do 300g,</li> <li>- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- plechovka z elektrolyticky pocínovaného plechu bez povrchovej úpravy s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- lepenková škatuľa s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g.</li> </ul> <p>Deratizačné staničky s jednotlivými blokmi bez vreciek sú balené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g,</li> <li>- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,</li> <li>- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalené v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g.</li> </ul> <p>* deratizačná stanička môže byť zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii</p>

#### 4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-



**4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

-

**4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

-

**4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

-

**4.3 Opis použitia**

**Použitie 3 - Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov**

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince
<b>Oblasti použitia</b>	Vonkajšie  Vonku okolo budov.
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 75-100 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: 75-100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5-10 m od seba.

**Kategória(ie) používateľ'ov**

## Veľkosti balenia a obalový materiál

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Maximálne množstvo návnady v predanej jednotke (výrobok na použitie pre myši a potkany): 300g v jednotlivých blokoch po 5 - 100g.

Jednotlivé bloky, individuálne zabalené v LDPE o BOPP vreckách, sú balené v:

- blister (PVC alebo PVC + lepenka) s vnútorným plastovým vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) - od 30g do 300g,
- vedro alebo nádoba (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- plechovka z elektrolyticky pocínovaného plechu bez povrchovej úpravy s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- lepenková škatuľa s vnútorným vreckom alebo bez neho (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g.

Deratizačné staničky s jednotlivými blokmi bez vreciek sú balené v:

- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii\* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g,
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii\* (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným vreckom (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) - od 30g do 300g,
- vrece (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalené v ochrannej polyolefínovej fólii - od 30g do 300g.

\* deratizačná stanička môže byť zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii

### 4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.  
Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.  
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

### 4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte výrobok blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály).

### 4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

### 4.4 Opis použitia

#### Použitie 4 - Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince
<b>Oblasti použitia</b>	Vnútorné  Vnútorné priestory.
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 30-50 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: 30-50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2-5 m od seba.
<b>Kategória(ie) používateľ'ov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	Minimálna veľkosť balenia: 3 kg  Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú stanicu: 5-10-15-20-25-50-75-100g).  Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,
- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,
- vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,
- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,
- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,
- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

#### 4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

## 4.5 Opis použitia

### Použitie 5 - Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince</p> <p>Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútorné</p> <p>Vnútorné priestory.</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: 75-100 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: 75-100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5-10 m od seba.</p>
<b>Kategória(ie) používateľ'ov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Minimálna veľkosť balenia: 3 kg</p> <p>Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú staničku: 5-10-15-20-25-50-75-100g).</p> <p>Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,</li><li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,</li><li>- vrece (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.</li></ul> <p>Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,</li><li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,</li><li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.</li></ul> <p>Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy</li></ul>

(LDPE) - od 3 kg do 25 kg,  
- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vrecom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrečko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

#### 4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.6 Opis použitia

##### Použitie 6 - Myš domová a potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Neuplatňuje sa na rodenticídy.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: *Mus musculus*  
Bežný názov: Myš domová

Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: Rattus norvegicus  
Bežný názov: Potkan hnedý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: Rattus rattus  
Bežný názov: Potkan tmavý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

## Oblasti použitia

Vonkajšie

Vonku okolo budov.

## Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: aplikácia návnady

Detailný opis:

Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

## Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: Myši: 30-50 g, potkany: 75-100 g

Riedenie (%): 0

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Návnadové výrobky:

Myši: 30-50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2-5 m od seba.

Potkany: 75-100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5-10 m od seba.

## Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

## Veľkosti balenia a obalový materiál

Minimálna veľkosť balenia: 3 kg

Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú staničku: 5-10-15-20-25-50-75-100g).

Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,

- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,

- vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

#### 4.6.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Pre myši: Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pre potkany: Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

#### 4.6.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

Nepoužívajte výrobok blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály).

#### 4.6.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.6.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.6.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.7 Opis použitia

##### Použitie 7 - Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince  Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince  Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: Potkan tmavý



Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

#### Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne priestory.

#### Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: aplikácia návnady

Detailný opis:

Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.

#### Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: Myši: 30-50 g, potkany: 75-100 g

Riedenie (%): 0

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Návnadové výrobky:

Myši: 30-50 g návnady na miesto s návnadou.

Potkany: 75-100 g návnady na miesto s návnadou.

#### Kategória(ie) používateľov

Vyškolený profesionál

#### Veľkosti balenia a obalový materiál

Minimálna veľkosť balenia: 3 kg.

Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú staničku: 5-10-15-20-25-50-75-100g).

Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,

- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,

- vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,

- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.

#### 4.7.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci doby ošetrovania odstráňte zvyšný výrobok.

#### 4.7.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.  
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.  
Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.  
Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.  
Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

#### 4.7.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.7.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.7.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

### 4.8 Opis použitia

#### Použitie 8 - Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Neuplatňuje sa na rodenticídy.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: *Mus musculus*  
Bežný názov: Myš domová  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: *Rattus norvegicus*  
Bežný názov: Potkan hnedý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: *Rattus rattus*  
Bežný názov: Potkan tmavý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Oblasti použitia

	<p>Vonkajšie</p> <p>Vonku okolo budov.</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: Myši: 30-50 g, potkany: 75-100 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: Myši: 30-50 g návnady na miesto s návnadou. Potkany: 75-100 g návnady na miesto s návnadou.</p>
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	<p>Vyškolенý profesionál</p>
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Minimálna veľkosť balenia: 3 kg</p> <p>Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú stanicu: 5-10-15-20-25-50-75-100g).</p> <p>Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.</li> </ul> <p>Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými stanicami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.</li> </ul> <p>Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.</li> </ul>

#### 4.8.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (okrem priamej aplikácie do brlohu). Miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

Priama aplikácia do brlohu :  
Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí.  
Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

#### 4.8.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.  
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.  
Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.  
Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.  
Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.  
Nepoužívajte výrobok blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály).

#### 4.8.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.8.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.8.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

### 4.9 Opis použitia

#### Použitie 9 - Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – Vonkajšie otvorené oblasti

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Neuplatňuje sa na rodenticídy.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: *Mus musculus*  
Bežný názov: Myš domová  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: *Rattus norvegicus*  
Bežný názov: Potkan hnedý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

Vedecký názov: *Rattus rattus*  
Bežný názov: Potkan tmavý  
Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince

<b>Oblasti použitia</b>	Vonkajšie  Vonkajšie otvorené oblasti.
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priame použitie návnady na okamžité použitie do brlohu.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: Myši: 30-50 g, potkany: 75-100 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: Myši: 30-50 g návnady na miesto s návnadou. Potkany: 75-100 g návnady na miesto s návnadou.
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Vyškoľený profesionál
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	Minimálna veľkosť balenia: 3 kg  Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú staničku: 5-10-15-20-25-50-75-100g).  Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v: - vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg, - vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg, - vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.  Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v: - lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg, - lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg, - lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg, škatuľa od 3 kg do 25 kg.  Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v: - lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE) - od 3 kg do 25 kg, - lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg, škatuľa od 3 kg do 25 kg.

#### 4.9.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.  
Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.  
Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (okrem priamej aplikácie do brlohu).  
Miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových

druhov.

Priama aplikácia do brlohu:

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí.

Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

#### 4.9.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Nepoužívajte výrobok blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály).

#### 4.9.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.9.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.9.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.10 Opis použitia

##### Použitie 10 - Potkany hnedý – vyškolení profesionáli – Vonkajšie skládky odpadu

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: dospelé a mladé jedince
Oblasti použitia	Vonkajšie  Vonkajšie skládky odpadu.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

	Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priame použitie návnady na okamžité použitie do brlohu.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 75-100 g Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Návnadové výrobky: 75-100 g návnady na miesto s návnadou.
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Vyškolený profesionál
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Minimálna veľkosť balenia: 3 kg.</p> <p>Jednotlivé bloky 20-25-50-75-100g (voľné alebo v jednodávkových plastových vreckách z LDPE alebo z koextrudovaného BOPP) (na vopred naplnenú deratizačnú staničku: 5-10-15-20-25-50-75-100g).</p> <p>Jednotlivé bloky (voľné alebo v jednodávkových vreckách z LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútornou vrstvou alebo bez nej (LDPE) – od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- vedro (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; vedro od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- vreca (LDPE alebo LDPE/papier) - od 3 kg do 25 kg.</li> </ul> <p>Jednotlivé bloky (voľné) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornými vopred naplnenými deratizačnými staničkami odolnými voči manipulácii (PP alebo PET alebo PVC alebo HDPE) zabalená v ochrannej polyolefínovej fólii - od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou (LDPE) - od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.</li> </ul> <p>Jednotlivé bloky (vo vreckách LDPE alebo BOPP) zabalené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútornou vrstvou/bez vnútornej vrstvy (LDPE)- od 3 kg do 25 kg,</li> <li>- lepenková škatuľa alebo škatuľa (lepenková) s vnútorným(i) vreckom(ami)/bez vnútorného(ých) vreca(vriec) (LDPE alebo LDPE/OPA alebo LDPE/PET alebo LDPE/OPA/PET) každé vrecko do 1 kg; škatuľa od 3 kg do 25 kg.</li> </ul>

#### 4.10.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (okrem priamej aplikácie do brlohu). Miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

Priama aplikácia do brlohu:  
Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí.  
Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

#### 4.10.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.  
Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.  
Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.  
Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

#### **4.10.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Keď umiestňujete návnady blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### **4.10.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

-

#### **4.10.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

-

## **5. Všeobecné pokyny pre použitie**

### **5.1. Pokyny na používanie**



#### PROFESIONÁLI A VYŠKOLENÍ PROFESIONÁLI:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Keď to je možné, musia byť deratizačné stanice pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné stanice musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddeľ 5.3. pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej stanice.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných ne cieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvažte presun deratizačných staníc/miest s návnadou na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvažte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulačného rodenticídu. Zvažte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

#### LEN VYŠKOLENÍ PROFESIONÁLI:

Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

#### LEN PROFESIONÁLI:

Zvažte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné stanice.

Deratizačné stanice by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

#### ŠIROKÁ VEREJNOSŤ:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvažiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné stanice by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné stanice pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

[Neotvárajte vrecúška s návnadou – keď to je relevantné pre formuláciu návnady vo výrobku].

Umiestnite deratizačné stanice mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných ne cieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné stanice mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné stanice blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné stanice.

## 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

#### PROFESIONALI A VÝŠKOLENÍ PROFESIONÁLI:

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami [Spôsob likvidácie musí byť v národnom SPC konkrétne opísaný a vyjadrený na obale výrobku].

#### LEN VÝŠKOLENÍ PROFESIONÁLI:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov. V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulačného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou deratizačné staničky ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrýtych a chránených miestach s návnadou.

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

#### LEN PROFESIONÁLI:

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“)
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“).
- Používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

#### ŠIROKÁ VEREJNOSŤ:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- Výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“).
- Používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulačnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ťasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky obráťte sa na TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI KONTAKTE S OČAMI: Ak sa objavia príznaky opláchnite ich vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ak je ich odstránenie jednoduché. Obráťte sa na TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa.

V prípade výskytu symptómov: Zavolajte na linku 112/záchraná zdravotná služba pre lekársku pomoc.

Bez symptómov: Zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: V prípade potreby okamžite poskytnite prvú pomoc a potom zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA.

Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Ak je potrebná lekárská pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum [telefón: +421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

## 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Nevypúšťajte nepoužitý výrobok do pôdy, vodných tokov, kanalizácie (drezu, záchodu...) či do odtokov.

## 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúce na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajúce na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Doba použiteľnosti: 2 roky. Chráňte pred svetlom. Výrobok skladujte pri teplotách pod 35°C. Neuchovávajúce v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

## 6. Ďalšie informácie

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulačné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.