

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Vertox 25 Oktablok (red)

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0196

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0026648-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Vertox 25 Oktablok
-------------------	--------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας		KY-0196
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0026648-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		18/07/2013
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Unichem d.o.o, Sinja Corica 2 1360 Vrhnika Σλοβενία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Τσεχία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..</p> <p>EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Ερασιτέχνες – Εσωτερική χρήση (Οικιακό ποντίκι)

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα .
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακό ποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικά
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντίκια μέχρι 20g σε δολωματικούς σταθμούς Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ποντίκια: 5 to 20 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή μόλυνση - 5 έως 20g δολώματος σε σταθμούς δολώματος κάθε 2 μέτρα Χαμηλή μόλυνση - 5 έως 20g δολώματος σε σταθμούς δολωμάτων κάθε 5 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 100g Συμπληρωματικές συσκευασίες πολλαπλών μπλοκ (μέγιστη συσκευασία 100g): Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE μέσα σε μπανιέρα PE ή PP ή κάδο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE, συσκευασμένα σε πακέτα από χαρτόνι με επένδυση από PE ή σε σάκους από PE σε χαρτόκουτο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE συσκευασμένα σε χάρτινα / PE / PE / AL, PP, PET / PE ή πολυστρωματικά σακουλάκια PP - πωλούμενα ως έχουν ή σε εξωτερικό χαρτόνι

2, 3 ή 4 x 5g συσκευασμένα σε ένα μονό ή σε πολλαπλές χρήσεις ποντίκι σταθμό HDPE ή PP δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένα τσάντα ή πολύ εξωτερική θερμικά σφραγισμένη με ένα χαρτόνι torper - Μέχρι 100g

1 ή 2 x 10g μπλοκ συσκευασμένα σε ένα μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε ένα εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή κυψέλη από χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό - Μέχρι 100g

1 x 20 g μπλοκ συσκευασμένα σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε εξωτερικό χαρτόνι ή συσκευασία με κυψέλες ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένο σάκο ή πολυ-εξωτερική θερμοσυγκολλημένη με ένα χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό - Μέχρι 100g

1 - 5 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC ή HIPS με ανοιγόμενη συσκευασία σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης τρωκτικού PE, PP, PET, HIPS, PVC. - Μέχρι 100g. Συσκευασία μπλίστερ - Συσκευασία με μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / Al / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC).

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για τα ποντίκια χρησιμοποιήστε μέχρι 20 γραμμάρια σε σταθμούς δόλωμα.

Ασφαλίστε 5-20 γραμμάρια μπλοκ σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβιάσεις σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ τους (σε απόσταση 2 μέτρων σε περιοχές με υψηλή μόλυνση) σε περιοχές όπου οι ποντικοί είναι ενεργοί. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση δολωμάτων και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας μόλυνσης (π.χ. φρέσκα κομμάτια ή περιπτώματα). Τα ποντίκια είναι πολύ περίεργα και μπορεί να βοηθήσουν το πρόγραμμα ελέγχου να μεταφέρει δολώματα κάθε 2-3 ημέρες κατά τη στιγμή που τα σημεία δολώματος ελέγχονται ή συμπληρώνονται. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωμα κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που καταναλώνεται από τα τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωμα. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελέγξουν εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα στέλεχος τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ελέγχου

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν υπάρχουν.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Αρouraίοι – Ευρύ κοινό - Εσωτερικά

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα .

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: All
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικά
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: ## Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ##
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους μέχρι 60g σε δολωματικούς σταθμούς. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 10 to 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή μόλυνση - 10 έως 60g δολώματος σε σταθμούς δολώματος κάθε 5 μέτρα Χαμηλή μόλυνση - 10 έως 60g δολώματος σε σταθμούς δολωμάτων κάθε 10 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 300g Συμπληρωματικές συσκευασίες πολλαπλών τεμαχίων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300g): Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE μέσα σε σωληνάριο PE ή PP ή κάδο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE, συσκευασμένα σε πακέτα από χαρτόνι με επένδυση από PE ή σε σάκους από PE σε χαρτόκουτο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE συσκευασμένα σε χάρτινα / PE / PE / AL, PP, PET / PE ή πολυστρωματικά σακουλάκια PP - πωλούμενα ως έχουν ή σε εξωτερικό χαρτόνι 1, 2 ή 3 x 20g μπλοκ συσκευασμένα σε μονόφυλλο ή πολλαπλών χρήσεων, με μανδύα PET, HIPS, PVC, PE, HDPE

	<p>ή PP δολώματος αουραίων, τα οποία είναι συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερικό χαρτόνι ή κυψέλη πακέτο ή χαρτόνι ή θερμοσυγκολλημένο σάκο ή πολύ εξωτερικό θερμικά σφραγισμένο με ένα χαρτόνι torper. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 300g</p> <p>50g μπλοκ που συσκευάζονται σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων σταθμό δόλωσης αουραίων HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή σε χιτώνιο από χαρτόνι ή σάκο θερμοσυγκολλημένο ή πολυ- σφραγισμένο με χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 300g</p> <p>1 -15 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC, ή HIPS / blister συσκευασμένο σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης τρωκτικού PE, PP, PET, HIPS, PVC.</p> <p>Συσκευασία μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / Al / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) σε εξωτερικό χαρτόνι (μπλοκ 10g ή 20g)</p>
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για τους αουραίους χρησιμοποιήστε μέχρι και 60 g στους σταθμούς δόλωμα.

Εξασφαλίστε 10-60 g μπλοκ σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβιάσεις σε απόσταση 10m μεταξύ τους (σε απόσταση 5m σε περιοχές με υψηλή μόλυνση) σε περιοχές όπου οι αουραίοι είναι ενεργοί.

Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση δολωμάτων και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας μόλυνσης (π.χ. φρέσκα κομμάτια ή περιπτώματα). Μην μετακινείτε ή να ενοχλείτε τα σημεία δόλωμα για αρκετές ημέρες μετά το δόλωμα.

Εάν δεν παρατηρηθούν σημάδια δραστηριότητας αουραίου κοντά στο δόλωμα μετά από 7-10 ημέρες, μετακινήστε το δόλωμα σε περιοχή με υψηλότερη δραστηριότητα αουραίων. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωμα. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα στέλεχος τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ελέγχου.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν υπάρχουν

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό - Εξωτερικά και γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα .
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Άλλο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικά γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: ## ## Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους μέχρι 60g σε δολωματικούς σταθμούς. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 10 to 60 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή μόλυνση - 10 έως 60g δολώματος σε σταθμούς δολώματος κάθε 5 μέτρα Χαμηλή μόλυνση - 10 έως 60g δολώματος σε σταθμούς δολωμάτων κάθε 10 μέτρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολώματος ανά συσκευασία 300g Συμπληρωματικές συσκευασίες πολλαπλών τεμαχίων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300g): Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE μέσα σε σωληνάριο PE ή PP ή κάδο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE, συσκευασμένα σε πακέτα από χαρτόνι με επένδυση από PE ή σε σάκους από PE σε χαρτόκουτο Τα τεμάχια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g είναι χαλαρά ή τυλιγμένα σε PP ή PE συσκευασμένα σε χάρτινα / PE / PE / AL, PP, PET / PE ή πολυστρωματικά σακουλάκια PP - πωλούμενα ως έχουν ή σε εξωτερικό χαρτόνι. 1, 2 ή 3 x 20g μπλοκ συσκευασμένα σε μονόφυλλο ή πολλαπλών χρήσεων, με μανδύα PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολώματος αρουραίων, τα οποία είναι συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερικό χαρτόνι ή κυψέλη πακέτο ή χαρτόνι ή θερμοσυγκολλημένο σάκο ή πολύ εξωτερικό θερμικά σφραγισμένο με ένα χαρτόνι torper. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό - Μέχρι 300g 50g μπλοκ που συσκευάζονται σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων σταθμό δόλωσης αρουραίων HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή σε χιτώνιο από χαρτόνι ή σάκο θερμοσυγκολλημένο ή πολυ- σφραγισμένο με χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό - Μέχρι 300g

1 -15 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC, ή HIPS / blister συσκευασμένο σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης τρωκτικού PE, PP, PET, HIPS, PVC. Συσκευασία μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / Al / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) σε εξωτερικό χαρτόνι (μπλοκ 10g ή 20g)
--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για τους αρουραίους χρησιμοποιήστε μέχρι και 60 g στους σταθμούς δόλωμα.

Εξασφαλίστε 10-60 g μπλοκ σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικών σε παραβιάσεις σε απόσταση 10m μεταξύ τους (σε απόσταση 5m σε περιοχές με υψηλή μόλυνση) σε περιοχές όπου οι αρουραίοι είναι ενεργοί.

Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση δολωμάτων και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας μόλυνσης (π.χ. φρέσκα κομμάτια ή περιπτώματα). Μην μετακινείτε ή να ενοχλείτε τα σημεία δόλωμα για αρκετές ημέρες μετά το δόλωμα.

Εάν δεν παρατηρηθούν σημάδια δραστηριότητας αρουραίου κοντά στο δόλωμα μετά από 7-10 ημέρες, μετακινήστε το δόλωμα σε περιοχή με υψηλότερη δραστηριότητα αρουραίων. Αν όλα τα δολώματα έχουν καταναλωθεί από ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος με την τοποθέτηση περισσότερων σημείων δόλωμα. Μην αυξάνετε το μέγεθος του σημείου δόλωσης. Αντικαταστήστε κάθε δόλωμα που τρώγεται από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα στέλεχος τρωκτικών. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ελέγχου.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν υπάρχουν

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Οικιακά ποντίκια ή/και αρουραίοι – επαγγελματίες – εσωτερικά

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακά ποντίκια ή/και καφέ αρουραίοι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: All
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικά
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: ## Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για τους ποντικούς χρησιμοποιήστε έως και 20 γραμμάρια σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικούς σε παραβιάσεις ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για αρουραίους έως 60 γραμμάρια σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικούς σε παραβιάσεις ή σε σημεία με δόλωμα. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

	<p>Ποντίκια: 5 έως 20 γραμμάρια δόλωμα ανά σταθμό δόλωμα.</p> <p>Υψηλή μόλυνση - 5 έως 20g δολώματα σε σταθμούς δολώματος κάθε 2 μέτρα</p> <p>Χαμηλή μόλυνση - δόλωμα 5 έως 20g σε σταθμούς δολωμάτων κάθε 5 μέτρα</p> <p>Αρουρα: 10 έως 60 g δόλωμα ανά σταθμό δόλωμα.</p> <p>Υψηλή μόλυνση - 10 έως 60g δόλωμα σε σταθμούς δολώματος κάθε 5 μέτρα</p> <p>Χαμηλή μόλυνση - 10 έως 60g δόλωμα σε σταθμούς δολώματος κάθε 10 μέτρα</p> <p>Δόλωμα σε αυλάκια - 10 έως 60 g δόλωμα ανά αυλάκι</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 kg.</p> <p>5g, 10g, 20g, 28g, 50g και 60g μπλοκ χύμα μέσα σε σωληνάριο PE ή PP ή κάδο - Μέχρι 20kg</p> <p>Τα μπλοκ 5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g χύμα είτε δεν είναι στριμωγμένα είτε μέσα σε PP ή συρμάτινη τσάντα PE μέσα σε χαρτοκιβώτιο διπλού τοιχώματος ή ινοσανίδας - Μέχρι 20kg</p> <p>5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g χύμα σε χαρτοκιβώτια χαρτοκιβωτίων (δίσκοι τύπου στυρόλιο με μπλοκ) - Μέχρι 12 kg</p> <p>2, 3 ή 4 x 5g συσκευασμένα σε ένα μονό ή σε πολλαπλές χρήσεις ποντίκι σταθμό HDPE ή PP δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένα τσάντα ή πολύ εξωτερική θερμικά σφραγισμένη με χαρτόνι - Μέχρι 80g</p>

1 ή 2 x 10g μπλοκ συσκευασμένα σε ένα μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε ένα εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή κυψέλη από χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορεί να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 120g (συν ένα μέγιστο 10 επιπλέον μπλοκ)

1 x 20 g μπλοκ συσκευασμένα σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε εξωτερικό χαρτόνι ή συσκευασία με κυψέλες ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένο σάκο ή πολυ-εξωτερική θερμοσυγκολλημένη με ένα χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 120g (συν ένα μέγιστο 10 επιπλέον μπλοκ)

1, 2 ή 3 x 20g μπλοκ συσκευασμένα σε μονόφυλλο ή πολλαπλών χρήσεων, με μανδύα PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολώματος αρουραίων, τα οποία είναι συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερικό χαρτόνι ή κυψέλη πακέτο ή χαρτόνι ή θερμοσυγκολλημένο σάκο ή πολύ εξωτερικό θερμικά σφραγισμένο με ένα χαρτόνι torper. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 240 γραμ. (Συν μέγιστο 10 επιπλέον τεμάχια)

50g μπλοκ που συσκευάζονται σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων σταθμό δόλωσης αρουραίων HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή σε χιτώνιο από χαρτόνι ή σάκο θερμοσυγκολλημένο ή πολυ-σφραγισμένο με χαρτόνι - Μέχρι 200g

Τα πακέτα σταθμών δόλωσης που περιγράφονται παραπάνω πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

10g - 250

20g - 96, 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60 g - 48, 60, 72, 96

80g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

240 g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC, ή HIPS clamshell / blister συσκευασμένο σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης τρωκτικών PE, PP, PET, HIPS, PVC. Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:

80g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / AI / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) σε εξωτερικό χαρτόνι (μπλοκ 10g ή 20g) Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:

80g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

[Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Διεξάγετε μια έρευνα πριν από τη δόνηση της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

[Εάν το απαιτεί η εθνική πολιτική ή νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία θα πρέπει να σημειώνονται κατά την περίοδο θεραπείας και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και την ένδειξη της πρώτης τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμο δόλωμα.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία, ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της θεραπευόμενης περιοχής και του περιβάλλοντός τους) σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Οικιακά ποντίκια ή/και αρουραίοι – επαγγελματίες – εξωτερικά γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακά ποντίκια ή/και καφέ αρουραίοι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: All
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικά γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: ## Δόλωμα έτοιμο προς χρήση για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για τους ποντικούς χρησιμοποιήστε έως και 20 γραμμάρια σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικούς σε παραβιάσεις ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για

	<p>αρουραίους έως 60 γραμμάρια σε σταθμούς δόλωσης ανθεκτικούς σε παραβιάσεις ή σε σημεία με δόλωμα.</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ποντίκια: 5 έως 20 γραμμάρια δόλωμα ανά σταθμό δόλωμα. Υψηλή μόλυνση - 5 έως 20g δολώματα σε σταθμούς δολώματος κάθε 2 μέτρα Χαμηλή μόλυνση - δόλωμα 5 έως 20g σε σταθμούς δολωμάτων κάθε 5 μέτρα</p> <p>Αρουραίοι: 10 έως 60 g δόλωμα ανά σταθμό δόλωμα. Υψηλή μόλυνση - 10 έως 60g δόλωμα σε σταθμούς δολώματος κάθε 5 μέτρα Χαμηλή μόλυνση - 10 έως 60g δόλωμα σε σταθμούς δολώματος κάθε 10 μέτρα Δόλωμα σε αυλάκια - 10 έως 60 g δόλωμα ανά αυλάκι</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 kg.</p> <p>Ελεύθερα μπλοκ 5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g μέσα σε σωληνάριο PE ή PP ή κάδο - Μέχρι 20kg</p> <p>Τα ελεύθερα μπλοκ 5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g είτε είναι στριμωγμένα είτε μέσα σε PP ή συρμάτινη τσάντα PE μέσα σε χαρτοκιβώτιο διπλού τοιχώματος ή ινοσανίδας - Μέχρι 20kg</p> <p>Ελεύθερα κομμάτια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g σε χαρτοκιβώτια χαρτοκιβωτίων (δίσκοι τύπου στυρόλιο με μπλοκ) - Μέχρι 12 kg</p> <p>2, 3 ή 4 x 5g συσκευασμένα σε ένα μονό ή σε πολλαπλές χρήσεις ποντίκι σταθμό HDPE ή PP δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένα τσάντα ή πολύ εξωτερική θερμικά σφραγισμένη με χαρτόνι - Μέχρι 80g</p> <p>1 ή 2 x 10g μπλοκ συσκευασμένα σε ένα μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε ένα εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή κυψέλη από χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 120g (συν ένα μέγιστο 10 επιπλέον μπλοκ)</p>

1 x 20 g μπλοκ συσκευασμένα σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων ποντίκι PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP σταθμό δολώματος, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 σε εξωτερικό χαρτόνι ή συσκευασία με κυψέλες ή χαρτόνι ή θερμικά σφραγισμένο σάκο ή πολυ-εξωτερική θερμοσυγκολλημένη με ένα χαρτόνι. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 120g (συν ένα μέγιστο 10 επιπλέον μπλοκ)

1, 2 ή 3 x 20g μπλοκ συσκευασμένα σε μονόφυλλο ή πολλαπλών χρήσεων, με μανδύα PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολώματος αρουραίων, τα οποία είναι συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερικό χαρτόνι ή κυψέλη πακέτο ή χαρτόνι ή θερμοσυγκολλημένο σάκο ή πολύ εξωτερικό θερμικά σφραγισμένο με ένα χαρτόνι torper. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 240 γραμ. (Συν μέγιστο 10 επιπλέον τεμάχια)

50g μπλοκ που συσκευάζονται σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων σταθμό δόλωσης αρουραίων HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή σε χιτώνιο από χαρτόνι ή σάκο θερμοσυγκολλημένο ή πολυ-σφραγισμένο με χαρτόνι - Μέχρι 200g

Τα πακέτα σταθμών δόλωσης που περιγράφονται παραπάνω πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

10g - 250

20g - 96, 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60 g - 48, 60, 72, 96

80g - 32, 48, 60, 72, 96

	100g - 32, 48, 60, 72, 96
	120g - 32, 48, 60, 72, 96
	200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	240 g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	1 -20 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC, ή HIPS clamshell / blister συσκευασμένο σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης τρωκτικών PE, PP, PET, HIPS, PVC. Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:
	80g - 32, 48, 60, 72, 96
	100g - 32, 48, 60, 72, 96
	200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96
	Συσκευασία μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / Al / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) σε εξωτερικό χαρτόνι (μπλοκ 10g ή 20g) Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:
	80g - 32, 48, 60, 72, 96
	100g - 32, 48, 60, 72, 96
	200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα στα σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας [Δεν ισχύει όταν υπάρχει ρητή άδεια σύμφωνα με τις προσθήκες 4].

[Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Εάν χρησιμοποιείται για παλμικά δολώματα: - Αντικαταστήστε το τρωκτικό δόλωμα μόνο μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ' ανώτατο όριο. Συλλέξτε οποιοδήποτε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά. [Όταν είναι διαθέσιμο] Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο

[Για υπαίθρια χρήση, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικούς χώρους για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο]. [Όταν υπάρχει] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Όταν χρησιμοποιείται σε ορνίθια: Πρέπει να τοποθετούνται δολώματα για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη και σε παιδιά. Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των δολωμένων αυγών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

Διεξάγετε μια έρευνα πριν από τη δόνηση της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

[Εάν το απαιτεί η εθνική πολιτική ή η νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε αγωγή πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβλήθηκε σε θεραπεία και το περιβάλλον τους) σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Όταν χρησιμοποιείται σε ορνίθια: Πρέπει να τοποθετούνται δολώματα για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη και σε παιδιά. Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των δολωμένων αυγών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

Φορέστε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση σημείων δόλωσης κοντά στα επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Αρουραίοι – εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – υπονόμοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: All
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Other Υπονόμοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το έτοιμο προς χρήση δόλωμα πρέπει να αγκυρωθεί ή να εφαρμοστεί σε σταθμούς δολωμάτων που εμποδίζουν το δόλωμα να έλθει σε επαφή με τα λύματα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Σε αποχετεύσεις, τοποθετήστε 200 g έως 300 g μπλοκ κάθε 30-50 m (ποτέ πάνω από 300 g σε κάθε φρεάτιο). Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

	<p>Σε αποχετεύσεις, τοποθετήστε 200 g έως 300 g μπλοκ κάθε 30-50 m (ποτέ πάνω από 300 g σε κάθε φρεάτιο).</p> <p>Ασφαλίστε τα μπλοκ με τις διαθέσιμες δομές για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπλένονται. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση δολωμάτων και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας μόλυνσης.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 kg.</p> <p>Ελεύθερα μπλοκ 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g και 200g μέσα σε σωληνάριο PE ή PP ή κάδο - Μέχρι 20kg</p> <p>Ελεύθερα μπλοκ 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g ή 200g είτε χωρίς τοίχωμα είτε μέσα σε PP ή συρμάτινη τσάντα PE μέσα σε χαρτοκιβώτιο διπλού τοιχώματος ή με ινοσανίδες - Μέχρι 20kg</p> <p>Χαλαρά κομμάτια 5g, 10g, 20g, 28g, 50g ή 60g σε χαρτοκιβώτια χαρτοκιβωτίων (δίσκοι τύπου στυρόλιο με μπλοκ) - Μέχρι 12 kg</p> <p>1, 2 ή 3 x 20g μπλοκ συσκευασμένα σε μονόφυλλο ή πολλαπλών χρήσεων, με μανδύα PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολώματος αρουραίων, τα οποία είναι συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερικό χαρτόνι ή κυψέλη πακέτο ή χαρτόνι ή θερμοσυγκολλημένο σάκο ή πολύ εξωτερικό θερμικά σφραγισμένο με ένα χαρτόνι torper. Πρόσθετα μπλοκ μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξαναγέμισμα στο εξωτερικό. - Μέχρι 240 γραμ. (Συν μέγιστο 10 επιπλέον τεμάχια)</p> <p>50g μπλοκ που συσκευάζονται σε μονό ή πολλαπλών χρήσεων σταθμό δόλωσης αρουραίων HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή μπλίστερ ή σε χιτώνιο από χαρτόνι ή σάκο θερμοσυγκολλημένο ή πολυ- σφραγισμένο με χαρτόνι - Μέχρι 200g</p>

Τα πακέτα σταθμών δόλωσης που περιγράφονται παραπάνω πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

20g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60 g - 48, 60, 72, 96

80g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

240 g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 x 20g σε σακουλάκι PE ή PE / PVC ή HIPS, συσκευασμένο σε εξωτερικό μέρος με πολυπροπυλένιο σταθμό δόλωσης αρουραίων PE, PP, PET, HIPS, PVC. Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:

80g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία μπλίστερ, σακούλα ή σακουλάκι (χαρτί / PE, AL / PE, χαρτί / AI / PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) σε εξωτερικό χαρτόνι (μπλοκ 10g ή 20g) Πολλαπλές μονάδες μέσα σε ένα πακέτο:

80g - 32, 48, 60, 72, 96

	100g - 32, 48, 60, 72, 96
	200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Σε αποχετεύσεις, τοποθετήστε 200 g έως 300 g μπλοκ κάθε 30-50 m (ποτέ πάνω από 300 g σε κάθε φρεάτιο).

Ασφαλίστε τα μπλοκ με τις διαθέσιμες δομές για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπλένονται. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση δολωμάτων και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη θεραπεία σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας μόλυνσης.

Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Διεξάγετε μια έρευνα πριν από τη δόνηση της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Η κατάσταση αντίστασης του πληθυσμού-στόχου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της επιλογής του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί. Σε εκείνους τους τομείς όπου υπάρχουν υπόνοιες για αντοχή σε συγκεκριμένα δραστικά συστατικά, αποφύγετε τη χρήση τους. Μην περιστρέφετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη ισχύ για σκοπούς διαχείρισης της αντίστασης. Για περιστροφική χρήση, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.

[Εάν το απαιτεί η εθνική πολιτική ή η νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε αγωγή πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

[Εάν το απαιτεί η εθνική πολιτική ή η νομοθεσία] Τοποθετήστε τα δολώματα μόνο στα συστήματα αποχέτευσης που είναι συνδεδεμένα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Φορέστε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε παλμικές θεραπείες δολώματος.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση σημείων δόλωσης κοντά στα επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, σχάρες άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δεν υπάρχουν

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. τρύπες βύσματος, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και πόσιμο όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.

Πριν από τη χρήση προϊόντων τρωκτικοκτόνου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).

Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό διαταράσσει μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα (μόνο για ατομικά τυλιγμένα τεμάχια που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό).

Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση όπου παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών.

Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.

Μην τοποθετείτε σταθμούς δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

Τοποθετήστε τους σταθμούς δολωμάτων μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.

Τοποθετήστε τους σταθμούς δόλωμα μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκμετάλλευσης και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

Επαγγελματίες & εκπαιδευμένοι επαγγελματίες: Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε θεωρήστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν brodifacoum ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος διάθεσης θα περιγράφεται συγκεκριμένα στην εθνική ΠΧΠ και θα απεικονίζεται στην ετικέτα του προϊόντος].

Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμη

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ελέγχου.

[Για προϊόντα που επιτρέπονται για επαγγελματίες και εκπαιδευμένους επαγγελματίες] Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία, ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.

[Για τα προϊόντα που επιτρέπονται για επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Ετικέτα ή / και φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν δεν πρέπει να παραδίδεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για επαγγελματίες"). Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

Για τα προϊόντα που πρέπει να εγκρίνονται για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης μόνο εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ").

[Για προϊόντα που επιτρέπονται για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Μην περιστρέφετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη δραστηριότητα για σκοπούς διαχείρισης αντοχής. Για περιστροφική χρήση, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού. Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολωμάτων με νερό μεταξύ εφαρμογών.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση: Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

Έκθεση με τα μάτια, ξεβγάλτε τα μάτια με το υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή το νερό, κρατήστε τα μάτια ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.

Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο"? "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε το Κέντρο δηλητηριάσεων: 1401".

Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της επεξεργασίας, απορρίψτε το άχρηστο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.

Διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να διαρκέσουν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την αποτελεσματική κατανάλωση του δολώματος.

Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.

Αυτό το προϊόν περιέχει έναν παράγοντα πικρίματος και μια βαφή.