

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Jungle Formula Maximum Original

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/16-12/44

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0015636-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Jungle Formula Maximum Original
--------------------	---------------------------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/16-12/44	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0015636-0000	
Datum autorizacije	01/08/2014	
Datum isteka autorizacije	31/01/2025	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Omega Pharma manufacturing GmbH
Adresa proizvođača	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Njemačka

Naziv proizvođača	Medgenix Benelux n.v
Adresa proizvođača	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	N,N-dietill-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Clariant Corporation
Adresa proizvođača	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države

Aktivna tvar	N,N-dietill-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus
Adresa proizvođača	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	48,5 % (w/w)
etanol denaturirani	etilni alkohol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	37,77 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H225: Lako zapaljiva tekućina i para.</p> <p>H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p> <p>EUH208: Sadrži linalol, linalil acetat. Može izazvati a lergijsku reakciju.</p>
Oznake obavijesti	<p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, is kri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pu šiti.</p> <p>P260: Ne udisati aerosol.</p> <p>P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti puši ti.</p> <p>P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračen om prostoru.</p> <p>P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIM A:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaj u. Nastaviti ispiranje.</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. repelent za opću uporabu

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repelent za uporabu kod ljudi.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: ostalo: culex Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: Anopheles mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: Aedes mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ostalo: Krpelji Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ostalo: Krpelji Stadij razvoja: nimfe
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama.
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Jednakomjerno prskati i nanijeti na sva izložena područja kože. Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom te upaljenom ili oštećenom kožom. Upotrijebite cca 1 ml na 600 cm ² kože (što odgovara 1 ml na veličinu ruke odraslog muškarca).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1 ml na 600 cm ² kože; 1 x dnevno Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: 1 x dnevno
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Plastična boca od 15- 250 ml s otvorom od 13mm, sa čepom i sprej pumpom.

Boca je od polietilena visoke gustoće (HDPE) ili polipropilena (PP), sa čepom izrađenim od polipropilena, i sprej pumpom od PP/PE/čelika/aluminija.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opće upute za uporabu (5.1.).

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opće upute za uporabu (5.2.).

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute za uporabu (5.3.).

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute za uporabu (vidjeti 5.4.).

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute za uporabu (Vidjeti 5.5.).

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Ovaj se proizvod može koristiti samo za odbijanje komaraca i krpelja kako bi se zaštitili ljudi od uboda. Proizvod je namijenjen za opću, neprofesionalnu uporabu.

Proizvod pruža prosječno zaštitu od 9 sati kod najčešće vrste komaraca u Europi. Za neke vrste tropskih komaraca vrijeme zaštite može biti kraće: u prosjeku 4 sata kod Aedes vrste koji prenose žutu groznicu i 8 sata kod Anopheles vrste koji prenose malariju. Proizvod pruža 8,5 sati zaštite od krpelja.

Faktori kao što su visoka temperatura, vlaga i transpiracija mogu utjecati na trajanje zaštite.

Nanesite štedljivo i jednakomjerno samo na izložena područja kože.
Za primjenu na lice, prvo raspršite proizvod na dlanove i potom nanesite na lice,

Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom i oštećenom kožom. Izbjegavati kontakt s hranom, plastikom i lakiranim površinama.

Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama. Ne udisati aerosol.

Ne koristiti više od jedan put dnevno.
Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 18 godina.
Oprati ruke nakon uporabe.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom i oštećenom kožom. Izbjegavati kontakt s hranom, plastikom i lakiranim površinama.

Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama. Ne udisati aerosol.
Ne koristiti više od jedan put dnevno. Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 18 godina.
Nanijeti štedljivo i ograničeno samo na izloženu površinu kože.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Praznu ambalažu ponovo ne upotrebljavati. Ne odlagati ambalažu u prirodu.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati na suhom mjestu, dalje od izravnog sunčevog svjetla. Bocu dobro zatvoriti. Rok valjanosti 5 godina.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

-