

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Javel 9.6 pro Oxena

Type(s) de produit: TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Numéro de l'autorisation: FR-2022-0008

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0027862-0003

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	26
5.1. Consignes d'utilisation	26
5.2. Mesures de gestion des risques	26
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	27
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	27
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	28
6. Autres informations	28

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Javel 9.6 pro Oxena
SODICLEAN
EXTRAIT DE JAVEL LE GLOBE
JAVEL 9,6% DISTRICONCEPT
Javel Gros Travaux Starco

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	LABORATOIRE OXENA
	Adresse	rue Marc Seguin Zi la Motte Sud 26800 Portes les Valence France
Numéro de l'autorisation	FR-2022-0008 1-2	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0027862-0003	
Date de l'autorisation	17/02/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	16/02/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Laboratoire OXENA
Adresse du fabricant	ZI LA MOTTE SUD Rue Marc Seguin 26800 PORTES LES VALENCE France
Emplacement des sites de fabrication	ZI LA MOTTE SUD Rue Marc Seguin 26800 PORTES LES VALENCE France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1391 - Chlore actif libéré à partir d'hypochlorite de sodium
Nom du fabricant	ARKEMA
Adresse du fabricant	420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France
Emplacement des sites de fabrication	USINE DE JARRIE - Route Nationale 85 38560 Jarrie France
Substance active	1391 - Chlore actif libéré à partir d'hypochlorite de sodium
Nom du fabricant	INOVYN Trade Services SA (pour le compte de INOVYN Chlorvinyls Limited (RU))
Adresse du fabricant	South Parade, Runcorn WA7 4JE Cheshire Royaume-Uni
Emplacement des sites de fabrication	INOVYN FRANCE SAS - 2 avenue de la république - CS 10001 39501 Tavaux Cedex France
Substance active	1391 - Chlore actif libéré à partir d'hypochlorite de sodium
Nom du fabricant	Kem One
Adresse du fabricant	19 rue Jacqueline Auriol - Bât A - Le Quadrille 69008 Lyon France
Emplacement des sites de fabrication	Usine de Lavéra Écopolis Lavéra-Sud - BP 3 13117 Lavéra France Usine de Saint Fons 1 quai Louis Aulagne 69191 SAINT-FONS France

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Chlore actif libéré à partir d'hypochlorite de sodium		Substance active			9,6
Hypochlorite de sodium (solution technique à la pureté minimum de 9.6 à 14.5% p/p en chlore actif)	Hypochlorite de sodium	Substance non active	7681-52-9	231-668-3	66,2
Hydroxide de sodium	Hydroxide de sodium	Substance non active	1310-73-2	215-185-5	0

Oxyde de C12-C14 Alkyldiméthylamine	Oxyde de C12-C14 Alkyldiméthylamine	Substance non active	308062-28-4	931-292-6	0
--	--	-------------------------	-------------	-----------	---

2.2. Type de formulation

SL – Concentré soluble, liquide, à base d'eau

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.
 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
 Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence

Ne pas respirer les .
 Se laver soigneusement après manipulation.
 Éviter le rejet dans l'environnement.
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 EN CAS D'INGESTION:Rincer la bouche.NE PAS faire vomir.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés..
 EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 Recueillir le produit répandu.
 Garder sous clef.
 Éliminer le dans

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Désinfection des installations sanitaires

Type de produit	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Médical et non médical
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Versement Description détaillée: -
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Domaine non médical: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, Domaine médical: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Domaine non médical: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

Domaine médical:

En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*,

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD (250 mL, 2L)

Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)

Fûts en PEHD (30, 60, 200 L)

IBC en PEHD (1000 L)

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.
- Pour le domaine médical, en raison du temps de contact de 15 minutes, ne pas utiliser ce produit pour les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou le personnel médical et les surfaces qui sont fréquemment touchées par différentes personnes entraînant la transmission de micro-organismes au patient.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Eviter tout contact direct ou indirect avec l'alimentation.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Désinfection des surfaces dures (secteur non médical)

Type de produit	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Non médical

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

Sans action mécanique

Méthode d'application: Essuyage (avec une serpillère)

Description détaillée:

Sans action mécanique

Méthode d'application: Epongeage

Description détaillée:

Sans action mécanique

Méthode d'application: Brossage

Description détaillée:

Sans action mécanique

Méthode d'application: Versement

Description détaillée:

Sans action mécanique

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

En condition de propreté:

Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min

En condition de saleté:

Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:
Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min
Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min
Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min

En condition de saleté:
Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min
Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min
Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:

Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min

En condition de saleté:

Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:

Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min

En condition de saleté:

Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*,
Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons
(optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*,
Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons
(optionnel): 6053 mg/L*

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

En condition de propreté:

Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min

En condition de saleté:

Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

*Dose exprimée en chlore actif

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD (250 mL, 2 L)

Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)

Fûts en PEHD (30, 60, 200 L)

IBC en PEHD (1000 L)

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Appliquer sans action mécanique sur les surfaces à traiter et recouvrir toute la surface.
- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.
- Laisser agir pendant au moins 5 ou 15 minutes (selon l'organisme cible), puis frotter / essuyer / brosser si nécessaire.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pendant l'application avec un pulvérisateur à compression, porter un équipement de protection respiratoire anti aérosol avec un facteur de protection assigné de minimum 4.
- Pour le travailleur (professionnel) accompagnant l'opérateur, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression. Si la présence est nécessaire, porter les mêmes ERP que l'opérateur.
- Pour le grand public, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression
- Les animaux de compagnie ne doivent pas être présents dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression.
- Eviter tout contact direct ou indirect avec l'alimentation.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Désinfection des surfaces dures (secteur médical)

Type de produit	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Médical
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Sans action mécanique Méthode d'application: Essuyage (avec une serpillère) Description détaillée: Sans action mécanique

Méthode d'application: Epongeage
Description détaillée:
Sans action mécanique

Méthode d'application: Brossage
Description détaillée:
Sans action mécanique

Méthode d'application: Versement
Description détaillée:
Sans action mécanique

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:
Temps de contact: 15 min
Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*
Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD (250 mL, 2L)

Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)

Fûts en PEHD (30, 60, 200 L)

IBC en PEHD (1000 L)

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit.
- Appliquer sans action mécanique sur les surfaces à traiter et recouvrir toute la surface.
- Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis frotter / essuyer / broser si nécessaire.
- Pour le domaine médical, en raison du temps de contact de 15 minutes, ne pas utiliser ce produit pour les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou le personnel médical et les surfaces qui sont fréquemment touchées par différentes personnes entraînant la transmission de micro-organismes au patient.

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pendant l'application avec un pulvérisateur à compression, porter un équipement de protection respiratoire anti aérosol avec un facteur de protection assigné de minimum 4.
- Pour le travailleur (professionnel) accompagnant l'applicateur, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression. Si la présence est nécessaire, porter les mêmes ERP que l'opérateur.
- Pour le grand public, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression
- Les animaux de compagnie ne doivent pas être présents dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression.
- Eviter tout contact direct ou indirect avec l'alimentation.

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.4 Description de l'utilisation

Utilisation 4 - Désinfection des surfaces dures en contact avec l'alimentation

Type de produit	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur -
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Sans action mécanique Méthode d'application: Essuyage (avec une serpillère) Description détaillée: Sans action mécanique Méthode d'application: Epongeage Description détaillée: Sans action mécanique Méthode d'application: Brossage Description détaillée: Sans action mécanique

Taux et fréquences d'application

Méthode d'application: Versement
Description détaillée:
Sans action mécanique

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Temps de contact: 15 min

En condition de propreté:

Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Temps de contact: 15 min

En condition de propreté:

Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Temps de contact: 15 min

En condition de propreté:

Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Temps de contact: 15 min

En condition de propreté:

Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Temps de contact: 15 min

En condition de propreté:

Bactéries/ levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté: Bactéries / levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD (250 mL, 2 L)

Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)

Fûts en PEHD (30, 60, 200 L)

IBC en PEHD (1000 L)

4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Appliquer sans action mécanique sur les surfaces à traiter et recouvrir toute la surface.
- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.
- Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis frotter / essuyer/ broser si nécessaire.

4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pendant l'application et le rinçage avec un pulvérisateur à compression, porter un équipement de protection respiratoire anti aérosol avec un facteur de protection assigné de minimum 4.
- Pour le travailleur (professionnel) accompagnant l'opérateur, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression. Si la présence est nécessaire, porter les mêmes ERP que l'opérateur.
- Pour le grand public, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression
- Les animaux de compagnie ne doivent pas être présents dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation avec un pulvérisateur à compression.
- Rincer les surfaces après traitement.

4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.5 Description de l'utilisation

Utilisation 5 - Désinfection des équipements et instruments par immersion/trempage

Type de produit	<p>TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux</p> <p>TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux</p>
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Domaine non médical (TP2) Domaine alimentaire (TP4)</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Immersion / trempage Description détaillée: -</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: Domaine non médical (TP2) En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L* Domaine alimentaire (TP4) En condition de propreté: Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté: Temps de contact: 15 min Bactéries / Levures (obligatoire): 4540 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L* Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Domaine non médical (TP2)</p> <p>En condition de propreté:</p> <p>Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min</p> <p>Bactéries + levures (optionnel): 1513 mg/L*, temps de contact: 15 min</p> <p>Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min</p> <p>En condition de saleté:</p> <p>Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min</p>

Bactéries + levures (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*, temps de contact: 15 min

Domaine alimentaire (TP4)

En condition de propreté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 1513 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*

En condition de saleté:

Temps de contact: 15 min

Bactéries / Levures (obligatoire): 4540 mg/L*

Bactéries + levures + champignons (optionnel): 6053 mg/L*

*Dose exprimée en chlore actif

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD (250 mL, 2 L)

Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)

Fûts en PEHD (30, 60, 200 L)

IBC en PEHD (1000 L)

4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.

4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Rincer les surfaces après traitement.

4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.6 Description de l'utilisation

Utilisation 6 - Désinfection des surfaces dures dans le domaine agroalimentaire par circulation

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Désinfection des surfaces dures (e.g. pipelines, tuyaux, membranes séparatrices/échangeurs d'ions et réservoirs des machines de remplissage ou similaires) dans le domaine agroalimentaire (e.g. production de boisson, de lait, de produits laitiers, système d'irrigation de serre, etc.) par circulation

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Bactéries
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Levures
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Champignons
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation	Intérieur Domaine alimentaire
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Nettoyage en place par circulation Description détaillée: -
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1059 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté (hors industries laitières): Bactéries/ levures (obligatoire): 3027 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 4540 mg/L* Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 15 min En condition de propreté: Bactéries/ levures (obligatoire): 1059 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L* En condition de saleté (hors industries laitières): Bactéries/ levures (obligatoire): 3027 mg/L* Bactéries + levures + champignons (optionnel): 4540 mg/L* *Dose exprimée en chlore actif
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles en PEHD (250 mL, 2 L) Bidons en PEHD (5, 10, 20 L) Fûts en PEHD (30, 60, 200 L) IBC en PEHD (1000 L)

4.6.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.

4.6.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Rincer les surfaces après traitement.

- Pendant la maintenance des pompes doseuses, porter des gants (le type de gants doit être précisé par le titulaire de l'autorisation), une protection corporelle (le type de protection doit être précisé par le titulaire de l'autorisation), des lunettes chimiques et un équipement de protection respiratoire (le type de masque doit être précisé par le titulaire de l'autorisation)

4.6.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.6.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.6.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.7 Description de l'utilisation

Utilisation 7 - Désinfection des surfaces dures dans les systèmes d'eaux vétérinaires par versement

Type de produit	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>-</p> <p>Méthode d'application: Versement</p>

Méthode(s) d'application	Description détaillée: -
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: En condition de propreté: Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, Bactéries + levures (optionnel): 1059 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, En condition de saleté: Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, Bactéries + levures + champignons (optionnel): 4540 mg/L*</p> <p>Dilution (%): 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: En condition de propreté:</p> <p>Bactéries (obligatoire): 562 mg/L*, temps de contact: 5 min</p> <p>Bactéries + levures (optionnel): 1059 mg/L*, temps de contact: 15 min</p> <p>Bactéries + levures + champignons (optionnel): 2270 mg/L*, temps de contact: 15 min</p> <p>En condition de saleté:</p> <p>Bactéries (obligatoire): 4540 mg/L*, temps de contact: 5 min</p> <p>Bactéries + levures + champignons (optionnel): 4540 mg/L*, temps de contact: 15 min</p> <p>*Dose exprimée en chlore actif</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bidons en PEHD (5, 10, 20 L)</p> <p>Fûts en PEHD (25, 30, 60, 200 L)</p> <p>IBC en PEHD (1000 L)</p>

4.7.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit pour les applications en conditions de propreté.

4.7.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Rincer les surfaces après traitement.
- Pendant la maintenance des pompes doseuses, porter des gants (le type de gants doit être précisé par le titulaire de l'autorisation), une protection corporelle (le type de protection doit être précisé par le titulaire de l'autorisation), des lunettes chimiques et un équipement de protection respiratoire (le type de masque doit être précisé par le titulaire de l'autorisation)

4.7.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.7.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.7.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Ne pas utiliser conjointement avec des acides ou de l'ammoniaque.
- Respecter les instructions d'utilisation.
- Appliquer uniquement sur surfaces non poreuses.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Pour l'étape de mélange et chargement, porter des gants (le type de gants doit être précisé par le titulaire de l'autorisation), une protection corporelle (le type de protection doit être précisé par le titulaire de l'autorisation) et des lunettes chimiques.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale

En l'absence de symptômes: Appeler un centre antipoison/un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

Enlever tous les vêtements contaminés.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min.

Appeler un centre antipoison/un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes.

Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale.

Informations au personnel de santé / au médecin: Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins ($\text{pH} > 11$), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche.

Donner quelque chose à boire si la personne exposée est capable d'avaler.

NE PAS faire vomir.

Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Protéger du gel.

- Ne pas stocker à une température supérieure à 30°C.

- Stocker à l'abri de la lumière.

- Durée de stockage : 5 mois.

6. Autres informations

- Afin de garantir l'efficacité du produit lors de son application, les modalités de dilution du produit et les doses d'emploi du produit dilué, devront figurer sur l'étiquette.

- Le pétitionnaire doit informer les utilisateurs du produit de l'existence de LMR pour les chlorates. Leur responsabilité pourra être engagée en cas de dépassement de ces LMR lors de contrôles effectués sur des denrées ayant été en contact avec des surfaces traitées avec un produit de la famille OXENA FAMILY.