

**ES**

***ANEXO***

**RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO BIOCIDA**

**CUCAL TRAMPA CUCARACHAS**

**Tipo(s) de producto**

PT18: Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

**Número de autorización:** ES/MR(NA)-2018-18-00486

**Número de referencia R4BP:** ES-0018779-0000

## Capítulo 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nombre comercial del producto

Nombre(s) comercial(es)	CUCAL TRAMPA CUCARACHAS
-------------------------	-------------------------

### 1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Nombre	Henkel Global Supply Chain B.V.
	Dirección	Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam otros: Netherlands
Número de autorización	ES/MR(NA)-2018-18-00486	
<i>Número de referencia R4BP</i>	ES-0018779-0000	
Fecha de la autorización	17/04/2018	
Fecha de vencimiento de la autorización	30/09/2024	

### 1.3. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Henkel Global Supply Chain B.V.
Dirección del fabricante	Gustav Mahlerlaan 2970 , 1081 LA Amsterdam Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Godrej Consumer Products Ltd , 131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) , Pondicherry - 607402 , INDIA RH1 1DL Pondicherry India  Consultoria Tecnica e Representações, Lda. (CTR), Loteamento Industrial da Murteira, Lotes 23/24, 2135-301 Samora Correia, Portugal  IGO srl, Via Palazzo, 46, 24061 Albano Sant' Alessandro (Bergamo) Italia  HENKEL HOMECARE KOREA, 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu, Danwon-gu Ansan city, Gyeonggi-do Corea del Sur

### 1.4. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	Imidacloprid
Nombre del fabricante	BAYER S.A.S. Enviromental Science.
Dirección del fabricante	Alfred Nobel-Strasse 50. D-40789 Monheim am Rhein . Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Dormagen. D-41538 Dormagen. Alemania

Sustancia activa	Piriproxifeno
Nombre del fabricante	SUMITOMO CHEMICAL Co.Ltd.
Dirección del fabricante	27-1, Shinkawa, 2-Chome, - Chuo-ku 104-8260 Tokio . 8260 Tokio. Japón
Ubicación de las plantas de fabricación	Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa. - Misawa 033-0022. Aomori. 0022 Aomori. Japón

---

---

---

## Capítulo 2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	sustancia activa	138261-41-3	428-040-8	1 % (m/m)
Piriproxifeno	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	sustancia activa	95737-68-1	429-800-1	0,052 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulación

XX Otros: Cebo en trampa (listo para su uso, RB)

---

### Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Indicaciones de peligro	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Eliminar el contenido en y/ o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales..

## Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S)

### 4.1. Descripción de uso

**Tabla 1. Uso 1 – Interior - Gel en trampa - Uso por el público en general (no profesional).**

Tipo de producto	PT18: Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	--
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Blattidae: Blattidae: Nombre común: German cockroach Etapa de desarrollo: adultos  Nombre científico: Blattidae: Blattidae: Nombre común: German cockroach Etapa de desarrollo: ninfas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores  Interior
Método(s) de aplicación	Método: En portacebos / trampas  Descripción detallada: En trampa (estaciones cebo).
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: El producto se aplica en una trampa con 2 gramos de producto./Dosis: 1-4 trampas por habitación dependiendo del tamaño de la habitación  Dilución (%): 0  Número y frecuencia de aplicación: El producto se aplica en una trampa con 2 gramos de producto. Dosis: 1-4 trampas por habitación dependiendo del tamaño de la habitación o del grado de infestación. (Se recomiendan 4 trampas para la cocina, 2 para los baños y 1 para las habitaciones).
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Tamaño standard de la trampa: 7cm x 7 cm x 1.4 cm. Peso total de la trampa: 9.9 gramos ( $\pm 10\%$ ) Envasado primario: Embalaje en poliestireno (en contacto con el producto) Envasado secundario: Papel / cartón (no en contacto con el producto).

#### 4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Ver esta sección en Instrucciones generales de uso

---

#### **4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico**

Ver esta sección en Instrucciones generales de uso

#### **4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Ver esta sección en Instrucciones generales de uso

#### **4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver esta sección en Instrucciones generales de uso

#### **4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver esta sección en Instrucciones generales de uso

---

## Capítulo 5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucciones de uso

Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.

Alterne productos con sustancias activas con diferente modo de acción.

No exponer las gotas de cebo a la luz del sol ni al calor (por ejemplo, un radiador).

No tirar el producto en el suelo, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe

Localización:

Colocar las trampas en lugares donde se muevan habitualmente las cucarachas tales como:

- En zonas húmedas y oscuras debajo del frigorífico, detrás del inodoro o cerca de desagües.
- Lugares donde la temperatura suele ser alta, como cerca de electrodomésticos, radiadores o tuberías de calefacción.
- Donde pueda haber restos de comida o materia orgánica, como alrededor de recipientes o en la parte inferior de la cocina.
- En otros lugares donde se hayan visto cucarachas como cerca de respiraderos, grietas o falsos techos.

Cantidad:

Colocar al menos 4 trampas en los lugares más comunes de las cucarachas, como en las cocinas.

Colocar 2 trampas alrededor del baño o del lavabo.

Para otros lugares donde se vean ocasionalmente las cucarachas, colocar 1 o 2 trampas.

Colocación:

Limpie la superficie donde vaya a colocar la trampa. Retire el papel protector de la tira adhesiva y presione firmemente la estación hacia abajo.

El producto es solo frente a cucarachas pequeñas (*Blattella germanica*)

### 5.2. Medidas de mitigación de riesgos

No usar directamente o cerca de alimentos, piensos, bebidas ni en superficies o utensilios que vayan a usarse para comida, bebida, piensos o animales.

LAVESE LAS MANOS Y LA PIEL EXPUESTA antes de las comidas y después de su uso.

MANTENERLO EN LUGAR SEGURO.

Usar solo en interiores.

No usar sobre el suelo desnudo ni sin pavimentar.

Usar solamente en lugares inaccesibles para niños y animales.

### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos: siempre verifique y retire las lentes de contacto. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos, abriendo completamente los párpados. Si se produce irritación y esta persiste y / o empeora, busque atención médica.

- En contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave la piel con agua abundante y jabón. Si se produce irritación o reacción alérgica, busque atención médica.

- En caso de inhalación: Traslade al intoxicado a una zona al aire libre. Si aparecen dificultades para respirar o empeoramiento, busque atención médica inmediata.

---

<sup>1</sup>Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado.



---

- En caso de ingestión: busque atención y/o consejo médico. Inducir el vómito SOLO si así lo indica un Centro de Toxicología o un profesional de la salud. NO administre líquidos ni induzca el vómito en caso de personas inconscientes o con deterioro cognitivo; coloque al individuo en la posición lateral izquierdo (de medio lado) con las rodillas dobladas.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

#### **5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

P501: Elimínese el contenido y/ o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

#### **5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

El producto tiene una vida media de 36 meses

Almacenar solo en su recipiente original.

Almacenar el producto con el envase cerrado en un lugar bien ventilado y protegido de la luz directa del sol.

---

## **Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

Se considera:

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.

El solicitante debe asegurarse de que el público en general puede identificar la especie de cucaracha (*Blattella germanica*) o cualquier otra frase de significado parecido.

El propietario de la autorización deberá informar sobre cualquier incidencia de resistencia a las Autoridades Competentes (CA) o cualquier otra situación que afecte a la gestión de la resistencia insecticida.