

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Rodex Whole Wheat Bait

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/20-12/56

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0023477-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Rodex žitni mamac Pro
--------------------	-----------------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Francuska
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/20-12/56	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0023477-0000	
Datum autorizacije	19/11/2012	
Datum isteka autorizacije	31/12/2026	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske Doa Rat Bait Production Center, Mesokeleos street Palouriotissa, Nicosia Cipar Promedivet SRL, str. Lunga nr. 46/G 545500 SOVATA Rumunjska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 54 280 02 Kolin Češka

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H360D: Može naškoditi nerođenom djetetu.</p> <p>H372: Uzrokuje oštećenje organa (krvi) tijekom produžene ili ponavljane izloženosti {1:navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost: }.</p> <p>EUH208: Sadrži 1,2-benzizotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.</p>
Oznake obavijesti	<p>P201: Prije uporabe pribaviti posebne upute.</p> <p>P202: Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.</p> <p>P260: Ne udisati prašinu.</p> <p>P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati {0:...}</p> <p>P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.</p> <p>P280: Nositi zaštitne rukavice.</p> <p>P308 + P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:: zatražiti savjet.</p> <p>P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet .</p> <p>P405: Skladištiti pod ključem.</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na skladi s važećim propisima o opasnom otpadu.</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Osposobljeni profesionalni korisnici– u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: - Mamac spreman za primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce, osigurane od neovlaštenog otvaranja - Primjena na prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Štakori: do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Miševi: do 40 g mamca po mjestu izlaganja. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: - Jaka infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Miševi: - Jaka infestacija: do 40 g mamca po mjestu izlaganja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 40 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg):

Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg

Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg

Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg.

Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg

Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg

Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg

Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg

Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg

2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu
Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg

Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg

Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg.

Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg

	<p>Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg. Kartonska kutija 5 kg do 10 kg</p> <p>3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.</p>
--	---

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju tretiranja ukloniti ostatke proizvoda.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije sa mamacem postavljaju u blizini sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom uokolo zgrada
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: - Mamac spreman za primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce. - Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja - Izravna primjena mamca u jazbine glodavaca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Štakori: do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Miševi: do 40 g mamca po mjestu izlaganja. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: - Jaka infestacija: do 200g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Miševi: - Jaka infestacija: do 40g mamca po mjestu izlaganja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 40g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Postavljanje mamca u jazbine glodavaca: 20-200 g mamca po jazbini.

Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg):</p> <p>Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg. Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg</p> <p>2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg. Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg. Kartonska kutija 5 kg do 10 kg</p> <p>3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku</p>

	kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.
--	--

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
- Mamci se moraju postaviti na način da je izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanjena na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba pokriti ili na drugi način zatvoriti kako bi se smanjio rizik od odbacivanja i prosipanja mamaca.
- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje..

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenim područjima i odlagalištima otpada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom - otvorena područja Na otvorenom - odlagališta otpada
Način(i) primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: - Mamac za izravnu primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce. - Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja. - Izravna primjena mamca u jazbine glodavaca.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Izravna primjena u jazbine: 20-200 g mamca po jazbini. Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: - Jaka infestacija: do 200bg mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. - Postavljanje mamca u jazbine glodavaca: 20-200 g mamca po jazbini.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg): Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg

Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg
Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg.
Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg
Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg
Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg
Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji izuntra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg
Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji izuntra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg

2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu
Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:
Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg
Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg
Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg.
Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg
Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg.
Kartonska kutija 5 kg do 10 kg

3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:
Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg
Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].

- Mamci se moraju postaviti na način da je izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanjena na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba pokriti ili na drugi način zatvoriti kako bi se smanjio rizik od odbacivanja i prosipanja mamaca.
- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Gdje je to moguće, prije tretiranja obavijestiti stanare i korisnike prostora koji će se tretirati i okolice o akciji suzbijanja glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Osposobljeni profesionalni korisnici – kanalizacija

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	ostalo: Other Kanalizacija

Način(i) primjene	<p>Metoda: primjena mamaca</p> <p>Detaljan opis: - Mamac za izravnu primjenu u kanalizaciji pričvršćivanjem ili postavljanjem u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama.- Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja</p>
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: do 200 g mamca po kanalizacijskom oknu</p> <p>Razrjeđenje (%): -</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: do 200 g mamca po kanalizacijskom oknu</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg):</p> <p>Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg</p> <p>Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg</p> <p>Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg.</p> <p>Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg</p> <p>Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg</p> <p>Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg</p> <p>Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg</p> <p>Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom</p>

pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg

2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu

Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg

Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg

Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg.

Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg

Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg.

Kartonska kutija 5 kg do 10 kg

3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg

Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamce treba postaviti na način da ne dođu u dodir s vodom i da ih voda ne može odnijeti.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Proizvod ne koristiti u tretmanima s pulsним postavljanjem mamca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
 - Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
 - Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
 - Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
 - Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
 - Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
 - Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
 - Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
 - Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
 - Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
 - Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi rukavice otporne na kemikalije.
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu. Nakon primjene pripravka treba oprati ruke ili izravno izloženu kožu.
 - Učestalost kontrole tretiranog područja treba odrediti nadležni operater, u skladu s provedenom inicijalnom procjenom infestacije. Ta bi učestalost trebala biti u skladu s preporukama iz relevantnog kodeksa najbolje prakse.
 - Jazbine u koje su postavljeni mamci treba posjećivati češće od onih mjesta na kojima se koriste zaštitne kutija za mamce.
 - Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
 - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticidai ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca
-
- Mamac u vrećicama: Ne otvarati vrećice koje sadrže mamac.
 - Rasuti mamac: Mamac postaviti koristeći pribor za doziranje. Specificirati metode smanjenja stvaranja prašine (npr. brisanje mokrom krpom/ubrusom).

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Ne upotrebljavati u područjima gdje postoji sumnja na otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Antikoagulantne rodenticide iste ili slabije jačine ne upotrebljavati naizmjenično tijekom provođenja tretmana, zbog sprječavanja razvoja rezistencije. Za naizmjeničnu uporabu treba koristiti ne-antikoagulantne rodenticide, ako su dostupni, ili jače antikoagulantne rodenticide.
- Kutije za mamce ili pribor korišten za prekrivanje mamaca ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.3. Pojedivosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i uključuju krvarenje iz nosa i desni. U težim slučajevima otrovanja, moguća je pojava modrica i prisustvo krvi u stolici i mokraći.
- Antidot: Vitamin K1 koje primjenjuje samo medicinsko/veterinasko osoblje.
- U slučaju:
 - Dodira s kožom: oprati izloženu kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
 - Dodira s očima: držeći prstima otvorene očne kapke, isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, ispirati najmanje 10 minuta.
 - Gutanja: oprezno usta isprati vodom. Osobi bez svijesti nikada ništa davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili etiketu.
 - Ako je kućni ljubimac progutao proizvod, potražiti savjet veterinara.
 - Kutije za izlaganje mamaca moraju imati istaknute sljedeće informacije: "ne micati i ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "ime proizvoda i broj odobrenja"; "aktivna tvar(i)" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja [01/2348-342]".
- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Po završetku tretiranja, zbrinuti ostatke mamca i pakiranje u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračnom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

- Rok valjanosti: 2 godine.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

- Zbog odgođenog početka djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave simptoma otrovanja.
- Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.
- Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.