

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: BOUMATIC biocidinių produktų su jodu grupė

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0020541-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** EU-0020541-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	2
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 1	2
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	3
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	11
6. Kita informacija	12
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	13
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 2	14
2. Meta SPC sudėtis	14
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	15
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	15
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	22
6. Kita informacija	23
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	24
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta PCS 3	25
2. Meta SPC sudėtis	26
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	26
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	27
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	33
6. Kita informacija	35
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	35

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

BOUMATIC biocidinių produktų su jodu grupė

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Boumatic
	Adresas	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0020541-0000	
Autorizacijos liudijimo data	18/11/2019	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/10/2029	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Christeyns n.v.
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija
Gamybos vieta	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija

1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Christeyns n.v.
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija
Gamybos vieta	„Cosayach Nitratos S.AO“, Oficina Cala Cala S/N Poso Almonté Ikiké Čilė

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 1

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,44 - 0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimas # 1.1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas - prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai - 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Užpildyti mirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Kiekvieną kartą apdorojant, būtina atkreipti dėmesį į apdorojimo produkto tūrį mirkymo puodelyje. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimas # 1.2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu prieš arba po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas - prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis, po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvu flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje), apsauginius drabužius, chemikalams atsparius batus ir akių apsaugos priemones.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimas # 1.3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

<p>Naudojimo metodas (-ai)</p>	<p>vidaus</p> <p>Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu prieš arba po melžimo</p> <p>atvira sistema: mirkymas - prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis, po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 3 kartus per dieną</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, prieš melžimą arba po jo.</p> <p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.</p> <p>Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.</p>
--

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimas # 1.4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu prieš arba po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrasis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu prieš arba po melžimo

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: apipurškimas -
prieš melžimą: mažiausiai 1 minutės trukmės sąlytis,
po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, prieš melžimą arba po jo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam purškimui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 1 naudojimo instrukcijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Prieš melžimą: apdoroti visą spenį produktu, leisti produktui veikti 60 sekundžių ir nušluostyti spenius vienkartiniais rankšluosčiais, kad būtų išvengta bet kokio pieno užteršimo.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš arba po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją / paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 2 metai

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

Prekinis pavadinimas	Udder Dip	Rinka: EU
	Udder Dip Max	Rinka: EU
	Udder D Max	Rinka: EU
	Udderdine Dip	Rinka: EU
	Uddine Dip	Rinka: EU
	Udderdine DP	Rinka: EU
	Uddine DP	Rinka: EU
	Udderdine DS	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0020541-0001 1-1	
<small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>		

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 2

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,38
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimas # 2.1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekcija, mirkant rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Užpildyti mirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Kiekvieną kartą apdorojant, būtina atkreipti dėmesį į apdorojimo produkto tūrį mirkymo puodelyje. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti akių apsaugos priemonės.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimas # 2.2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekcija, purškiant rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvu flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimas # 2.3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatiškai būdu po melžimo

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -
Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam
kartui - Produktas paruoštas naudoti. -
3 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno
vidutinės talpos) konteineris

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Naudoti neskystą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą
rekomenduojama naudoti dozavimo siurbli.

--

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimas # 2.4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo

Naudojimo metodas (-ai)	<p>atvira sistema: apipurškimas -</p> <p>Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris</p>

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.</p> <p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui.</p> <p>Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.</p>

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

<p>Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas</p>

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją / paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 1 metai

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtiniai

Prekinis pavadinimas	Gladiator RTU	Rinka: EU
	Udder Max Barrier	Rinka: EU
	Gladiator Max Barrier	Rinka: EU
	Udderdine BARRIER	Rinka: EU
	Uddine BARRIER	Rinka: EU
	Udderdine RTU	Rinka: EU
	Uddine RTU	Rinka: EU
	Udderdine BR	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0020541-0002 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,26
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1,2

Prekinis pavadinimas

Udder Star Spray	Rinka: EU
Udder Spray Max	Rinka: EU
Udderdine Spray	Rinka: EU
Uddine Spray	Rinka: EU
Udderdine SP	Rinka: EU
Uddine SP	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0020541-0003 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,29
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

Meta PCS 3

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,43 - 0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimas # 3.1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.
Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui.

Užpildytimirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimas # 3.2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Karvių spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>atvira sistema: apipurškimas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis .</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.</p> <p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.</p> <p>Užpildyti purkštuvu flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.</p>

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje), apsauginius drabužius, chemikalams atsparius batus ir akių apsaugos priemones.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimas # 3.3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti. - 3 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimas # 3.4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: apipurškimas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	15 ml vienam apdorojimui - Produktas paruoštas naudoti - 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam purškimui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 3 naudojimo instrukcijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją / paviršinį ar požeminį vandenį.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 2 metai

--

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Udder Star	Rinka: EU
	Udder Star Max	Rinka: EU
	Udder S Max	Rinka: EU
	Udderdine Star	Rinka: EU
	Uddine Star	Rinka: EU
	Udderdine ST	Rinka: EU
	Uddine ST	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0020541-0004 1-3	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	2,5
