

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Tablete s mirisom eukaliptusa

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** KLASA:UP/I-543-04/21-12/02

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0026526-0002

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	7
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	8

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Raid® tablete protiv komaraca s mirisom eukaliptusa

### 1.2. Nositelj odobrenja

**Naziv i adresa nositelja odobrenja**

Naziv	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa	Z.A. la Pièce 8 1180 Rolle Švicarska

**Broj odobrenja**

KLASA:UP/I-543-04/21-12/02 1-2
--------------------------------

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)**

HR-0026526-0002
-----------------

**Datum odobrenja**

19/08/2021
------------

**Datum isteka odobrenja**

14/06/2031
------------

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

**Naziv proizvođača**

SC Johnson Europe Sàrl

**Adresa proizvođača**

Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švicarska

**Lokacija proizvodnih pogona**

Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italija

ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bugarska

## 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	1404 - Transflutrin
<b>Naziv proizvođača</b>	Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95 supplier)
<b>Adresa proizvođača</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Francuska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indija
<b>Aktivna tvar</b>	1404 - Transflutrin
<b>Naziv proizvođača</b>	Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG)
<b>Adresa proizvođača</b>	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Njemačka
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija
<b>Aktivna tvar</b>	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil butoksid/PBO)
<b>Naziv proizvođača</b>	Endura S.p.A
<b>Adresa proizvođača</b>	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italija
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Italija

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		Aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil)		Aktivna tvar	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucaliptol		Neaktivna tvar			0,9

## 2.2. Vrsta formulacije

MV - isparavajuće tablete

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

### Oznaka upozorenja

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Može nadražiti dišni sustav.  
Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.  
Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože

### Oznake obavijesti

Izbjegavati udisanje dima.  
Nakon uporabe temeljito oprati ruke  
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.  
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna.  
U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet liječnika.  
U slučaju nadražaja kože: Zatražiti pomoć liječnika.  
AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.  
U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.  
U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika.  
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.  
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti pomoć liječnika.  
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.  
Sakupiti proliveno/rasuto.  
Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.  
Skladištiti pod ključem.  
Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.  
Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.

## 4. Odobrena uporaba

## 4.1 Opis uporabe

### Uporaba 1 - Insekticid protiv komaraca za kućnu uporabu u zatvorenom.

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
<b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>	Insekticid protiv komaraca. Za zaštitu do 10 sati.
<b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b>	Znanstveno ime: family Culicidae Uobičajeno ime: komarci Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Anopheles stephensi Uobičajeno ime: Anopheles komarci Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus Uobičajeno ime: Južni kućni komarac Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Aedes albopictus Uobičajeno ime: azijski tigrasti komarac Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Aedes aegypti Uobičajeno ime: komarac prenosioac žute groznice Stadij razvoja: odrasli
<b>Područje primjene</b>	u zatvorenom prostoru  U zatvorenom prostoru, u domaćinstvu/kućanstvu.
<b>Načini primjene</b>	Metoda: Primjena tablete u električnom uređaju za grijanje Detaljan opis: Staviti jednu tabletu u električni uređaj za grijanje.
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	Stopa primjene: 1 tableta na 30m3 Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Svaka tableta pruža do 10 sati zaštite.
<b>Kategorije korisnika</b>	široka javnost (amaterska uporaba)
<b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>	Kutija sadrži 10 ili 30 ili 60 tableta, sa ili bez električnog uređaja za grijanje. Svaka tableta zatvorena je u PET fleksibilnu vrećicu. Vrećice su poredane u trake. Primarno / komercijalno pakiranje također uključuje kartonske kutije.

Karton: papirnata kutija  
Fleksibilna vrećica: PET (polietilen tereftalat)

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

1. Izvaditi tabletu iz omota. 2. Umetnuti Raid® tabletu u aparat i držeci tabletu za najtanji rub/stranu te centrirati unutar rešetke. Nakon toga oprati i osušiti ruke.
3. Uključiti aparat u struju. Tableta počinje djelovati nakon 30 minuta.
4. Nakon 10 sati uporabe, isključiti aparat iz struje, izvaditi potrošenu tabletu i zamijeniti ju novom.
5. Čuvati proizvod na suhom mjestu, daleko od visokih temperatura i direktnog sunčevog svjetla.

Strategije za upravljanje u slučaju otpornosti:

- Gdje je moguće, treba preporučiti primjenu u kombinaciji s nekemijskim mjerama.
- Proizvode treba uvijek koristiti u skladu s preporukama i uputama koje su navedene na etiketi proizvoda.
- Tamo gdje je potrebno dulje razdoblje kontrole, potrebno je naizmjenično primijeniti proizvode drugačijeg načina djelovanja.
- Potrebno je pratiti razine učinkovitosti i istražiti slučajeve smanjene učinkovitosti radi moguće pojave rezistentnosti, napominjući da sanitarni uvjeti i blizina zaklonjenih mjesta koja nisu tretirana mogu doprinijeti riziku od ponovne pojave insekata.
- U slučajevima kada preporučena količina primjene proizvoda ne daje očekivanu razinu kontrole i djelotvornosti, uporaba bilo kojeg proizvoda koji sadrži aktivne tvari s istim načinom djelovanja trebala bi prestati.
- Korisnici bi trebali obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita. Nositelj odobrenja treba obavijestiti nadležne institucije o primijećenoj rezistentnosti.

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Sačuvati vanjski karton/kutiju s uputama za uporabu i sigurnosnim uputama.

Ne dopustiti da bilo koji materijali prekrivaju uređaj dok se koristi.

Ne dirati proizvod kada je u upotrebi, mokrim rukama ili metalnim predmetima.

Oprati ruke odmah nakon postavljanja i uklanjanja tablete.

Držati mačke podalje od tretiranih površina zbog velike osjetljivosti na piretroide.

Prije uporabe pokriti ili maknuti terarije, akvarije i kaveze sa životinjama.

Tijekom uporabe isključiti filter za akvarij.

Čuvati daleko od hrane, pića i hrane za kućne ljubimce.

Ne koristiti u blizini hrane, pribora za jelo ili mjesta za pripremu hrane.

#### **4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

##### Vjerojatni izravni ili neizravni učinci:

Ne očekuju se štetni učinci kada se koristi prema uputama.

Piretroidi i piretrini mogu izazvati paresteziju (peckanje i bockanje kože bez iritacije). Ako simptomi potraju: Potražiti liječnički savjet.

##### Mjere prve pomoći:

**AKO SE UDIŠE:** premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

**U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:** oprati velikom količinom vode. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:** oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Gutanje: Nema posebnih zahtjeva.

#### **4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati izvan dohvata djece.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

#### **4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja je 4 godine na sobnoj temperaturi u svom primarnom / komercijalnom pakiranju.

Ne čuvati na temperaturi višoj od 40 ° C

## **5. Opće upute za uporabu**

### **5.1. Upute za uporabu**



Pogledati prethodni odjeljak

## **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Pogledati prethodni odjeljak

## **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledati prethodni odjeljak

## **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati prethodni odjeljak

## **5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Pogledati prethodni odjeljak

## 6. Ostale informacije

Sadrži piperonil butoksid, eukaliptol i d-limonen.