



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**  
**NR. RO/2020/0266/MRA/ TP18-0346**

În conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 27.02.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;*

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: GRECIA
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: TP18-0346

**II. Data emiterii autorizatiei:** 27.03.2020, rescris in data de 23.07.2020.

**III. Data expirării autorizatiei:** 04.06.2029

**IV.**

**DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID:** FENDONA 6 SC  
**Alte denumiri comerciale:** PAMOVA 6 SC

**V.**

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România:** BASF SRL.,  
Floreasca Park, Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1,01425, Bucuresti

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:** BASF Hellas A.B.E.E., Paradeisou  
2 & Kifisia, 15125 Marousi, Grecia

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:** BASF Agro B.V- Arnhem (NL) – Freienbach  
Branch  
Adresa producatorului: Huobstrasse 3, 8808 , Pfaffikon SZ, Elveția  
Adresa loc productie: BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord 69727 Genay  
Cedex Franta

**NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA:** BASF Agro B.V- Arnhem (NL) –  
Freienbach Branch  
Adresa producatorului : Huobstrasse 3, 8808 , Pfaffikon SZ, Elveția  
Adresa fabricii producatoare 1: Tagros Chemicals India Ltd.- Sipcot Industrial Complex  
Pachayankuppam, Cuddalore-607 005,India  
Adresa fabricii producatoare 2: Bayer Vapi Private Ltd. (fosta Bilag Industries Private Ltd.)  
Plot Nr. 306/3; II Phase, GIDC, Vapi-396195, Gujarat, India

**VI.**

**TIPUL DE PRODUS:** Grupa Principala 3: TP 18.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**VII.**

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesionali , populatie.


**VIII.**

TIPUL PREPARATULUI: suspensie concentrata

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1)Substanta activă***a) substante chimice*

Denumirea IUPAC	<i>Alfa-cipermetrin</i>
Numar CAS	67375-30-8
Numar CE	-
Continut de substantă activă	6.27% (tehnice pură 5,83%)

**2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata****X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice***

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 <b>GHS09</b> Atentie! Produsul contine alfa-cipermetrin.
Fraze de risc H	<b>H410</b> - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung <b>EUH 208</b> - Poate provoca o reacție alergică. Conține <i>1.2- benzotiazolona-3(2H)</i> si <i>alfa-cipermetrin</i> . Poate provoca parestezie.
Fraze de prudență P	<b>P101</b> - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului <b>P102</b> - A nu se lăsa la îndemâna copiilor <b>P103</b> - Citiți eticheta înainte de utilizare <b>P273</b> - Evitați dispersarea în mediu. <b>P391</b> - Colectați scurgerile de produs. <b>P501</b> - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deeurilor periculoase.

**XI. AMBALAREA****Utilizatori: Profesionali:**

- Flacon / recipient bettix / bidon polietilenă de înaltă densitate / canistra Jerry.
- 500 ml, 1 litru, 5 litri produsul este un concentrat lichid și se aplică prin pulverizare cu pulverizator de presiune mică, pe suprafețe.

**Utilizatori: Populatie:**

- Flacon/ recipient bettix / bidon polietilenă de înaltă densitate: 50 ml, 100 ml / canistra Jerry.
- Ambalajul produsului include dozimetru.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



## XII. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

### **Utilizatori profesionali- igienă rurală (cotete animale, adăposturi)**

Este recomandat pentru combaterea gândacului roșu de bucătărie (*Blatella germanica*) - nimfe și adulți, a furnicilor (*Lasius niger*)-adulți, a țânțarilor (*Culex spp.*) -adulți și a viespilor (*Vespula spp*)-adulți.

Produsul se aplică la interior, în următoarele subcategorii de adăposturi de animale: cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare, cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare, cuști de baterii compacte, găină ouătoare, la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare, părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseală tip grătar, părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar. Produsul este un lichid concentrat și se aplică prin pulverizare pentru tratamentul suprafețelor. Atenție specială trebuie acordată pentru crăpături, fisuri și orice loc unde se pot ascunde insecte și pe suprafețele pe care se pot țiri sau așeza.

### **Dozele de aplicare și frecvența :**

<b>Fendona 6 SC (ml) DOZĂ MICĂ</b>	<b>Fendona 6 SC (ml) DOZĂ MARE</b>	<b>Volumul de apă pentru diluție (L)</b>	<b>Suprafața tratată (m2)</b>
25	50	5	100
12.5	25	2.5	50
5	10	1	20
2.5	5	0.5	10
1.25	2.5	0.25	5

Exp: Pentru tratamentul unei suprafețe de 20 m<sup>2</sup>, se recomanda:

la doza mică: se diluează 5 ml produs în 1 litru de apă (1: 200, concentrația de pulverizare: 0,5% v/v); iar pentru doza mare: 10 ml produs este diluat în 1 litru apă (1:100; concentrația de pulverizare: 1% v/v).

Pentru gândaci, este stabilită o doză de aplicare de 15 mg s.a./m<sup>2</sup> pentru adăposturi cu igienă crescută, în alte condiții, trebuie să se utilizeze o doză de 30 mg s.a. /m<sup>2</sup>. Utilizați doza mică atunci când este un nivel de infestare redus și condiții crescute de igienă. Utilizați doza mare atunci când este un nivel de infestare puternic și/sau condiții de igienă reduse.

### **Frecvența: 4 aplicări pe an**

- cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare,
- cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare,
- cuști de baterii compacte, găină ouătoare,
- la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare
- părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseală tip grătar,
- părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

### **Manipulare:**

Utilizatori profesionali: În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

Obligativ salopetă de protecție (cel puțin de tip 6, EN 13034).

### **Populație - Igienă rurală (cotete animale, adăposturi)**

Este recomandat pentru combaterea gândacului roșu de bucătărie (*Blatella germanica*) - nimfe și adulți, a furnicilor (*Lasius niger*)-adulți, a țânțarilor (*Culex spp.*) -adulți și a viespilor (*Vespula spp*)-adulți.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Produsul se aplică la interior, în următoarele subcategorii de adăposturi de animale: cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare, cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare, cuști de baterii compacte, găină ouătoare, la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare, părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseala tip grătar, părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar. Produsul este un lichid concentrat și se aplică prin pulverizare pentru tratamentul suprafețelor. Atenție specială trebuie acordată pentru crăpături, fisuri și orice loc unde se pot ascunde insecte și pe suprafețele pe care se pot țiri sau așeza.

**Dozele de aplicare și frecvența:**

<i>Fendona 6 SC (ml)</i> <b>DOZĂ MICĂ</b>	<i>Fendona 6 SC (ml)</i> <b>DOZĂ MARE</b>	<i>Volumul de apă</i> <i>pentru diluție (L)</i>	<i>Suprafața</i> <i>tratată (m2)</i>
25	50	5	100
12.5	25	2.5	50
5	10	1	20
2.5	5	0.5	10
1.25	2.5	0.25	5

Exp: Pentru tratamentul unei suprafețe de 20 m<sup>2</sup>, se recomanda:

la doza mică: se diluează 5 ml produs în 1 litru de apă (1: 200, concentrația de pulverizare: 0,5% v/v); iar pentru doza mare: 10 ml produs este diluat în 1 litru apă (1:100; concentrația de pulverizare: 1% v/v).

Pentru gândaci, este stabilită o doză de aplicare de 15 mg s.a./m<sup>2</sup> pentru adăposturi cu igienă crescută, în alte condiții, trebuie să se utilizeze o doză de 30 mg s.a. /m<sup>2</sup>. Utilizați doza mică atunci când este un nivel de infestare redus și condiții crescute de igienă. Utilizați doza mare atunci când este un nivel de infestare puternic și/sau condiții de igienă reduse.

**Frecvența: 4 aplicări pe an**

- cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare,
- cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare,
- cuști de baterii compacte, găină ouătoare,
- la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare
- părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseală tip grătar,
- părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

Nu se va consuma alimente sau băuturi și nu se fumează în timpul utilizării produsului.

Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, recipientele goale, produsul care eventual a rămas nefolosit și alte deșeuri care au rezultat după aplicare, sunt considerate deșeuri periculoase. Acestea se vor îndepărta în conformitate cu reglementările naționale.

**XII. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:**

Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Produsul este păstrat în ambalajul original, închis și ferit de lumină directă a soarelui.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDALE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE  
ALTE INFORMATII: 3 ani

Restricții pentru utilizarea produsului biocid: „-”



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

