

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: PROPASTA

Tipo(s) do produto: TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

Número da autorização: PT/DGS mrs 82/2021 to PT/DGS mrs 84/2021

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0027392-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	3
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	17
5.1. Instruções de utilização	17
5.2. Medidas de redução do risco	19
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	20
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	21
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	21
6. Outras informações	21

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

PROPASTA
STRONG PASTA
Ratigen +

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	ARMOSA TECH SA
	Endereço	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Bélgica
Número da autorização	PT/DGS mrs 82/2021 to PT/DGS mrs 84/2021	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0027392-0000	
Data da autorização	30/07/2013	
Data de caducidade da autorização	01/07/2024	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Compagnie Générale des Biocides
Endereço do fabricante	Parc d'activités des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY França
Localização das instalações de fabrico	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray França
	Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers 35390 Grand Fougeray França

Nome do fabricante	ARMOSA SA
Endereço do fabricante	1, rue des Tuilliers 4480 Engis Bélgica
Localização das instalações de fabrico	1, rue des Tuilliers 4480 Engis Bélgica

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	11 - Brodifacume
Nome do fabricante	PelGar International Limited
Endereço do fabricante	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire Reino Unido
Localização das instalações de fabrico	Prazska 280 02 Kolin República Checa

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substância ativa	56073-10-0	259-980-5	0,004

2.2. Tipo de formulação

Isco pronto a utilizar: Pasta

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

"Pode afectar os órgãos sangue após exposição prolongada ou repetida ."
Pode afectar o nascituro.

Recomendações de prudência

Pedir instruções específicas antes da utilização.
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
Usar luvas de proteção.
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:Consulte um médico.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação local..

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Rato doméstico - Profissional - Interior

Tipo de produto

TP 14 - Rodenticidas

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Não relevante para rodenticidas

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Mus musculus
Nome comum: House mouse
Estadio de desenvolvimento: Adultos

Nome científico: Mus musculus
Nome comum: House mouse
Estadio de desenvolvimento: Juvenis

Campos de utilização

Interior

Interior

Método(s) de aplicação

Método: Aplicação de isco
Descrição detalhada:
Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis

Frequência de aplicação e dosagem

Taxa de aplicação: 10 g de isco por ponto de isco
Diluição (%): 0

	<p>Número e calendário da aplicação: Ratos domésticos Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros</p>
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Peso de pacote mínimo de 2,5 kg Gramas de isco em saquetas individuais: 10 Material da embalagem e tamanho: Balde: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Caixa de cartão com revestimento interior de PE 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g. Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg</p>

4.1.1 Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser inspeccionadas , pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Nenhuns

--

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.
--

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - Ratazanas - Profissionais - Interior

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Juvenis
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 60 g de isco por ponto de isco Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco em pontos de isco a cada 10 metros Nível de infestação elevado – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Peso de pacote mínimo de 2,5 kg
Gramas de isco em saquetas individuais: 10
Material da embalagem e tamanho:
Balde: (PP,PE)
10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10),
6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)
Caixa de cartão com revestimento interior de PE
10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)
Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g
Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g.
Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg

4.2.1 Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser inspeccionadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.
[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Nenhuns

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

4.3 Descrição do uso

Utilização 3 - Ratos domésticos e ratazanas (ratos) - Profissional - Exterior em redor de edifícios

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Juvenis Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Adultos Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Juvenis
Campos de utilização	Exterior Exterior em redor de edificios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: 60 g de isco por ponto de isco / para ratos: 10 g de isco por ponto de isco Diluição (%): 0

	<p>Número e calendário da aplicação:</p> <p>Ratos domesticos Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p>
<p>Categoria(s) de utilizadores</p>	<p>Profissional</p>
<p>Capacidade e material da embalagem</p>	<p>Peso de pacote mínimo de 2,5 kg Gramas de isco em saquetas individuais: 10 Material da embalagem e tamanho: Balde: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Caixa de cartão com revestimento interior de PE 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g. Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg</p>

4.3.1 Instruções específicas de utilização

Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

As estações de isco devem ser inspeccionadas [para ratos - pelo menos a cada 2 a 3 dias no] [para ratazanas - apenas 5 a 7 dias após o] início do tratamento e posteriormente, pelo menos uma vez por semana, do modo a verificar se o isco está a ser aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover os roedores mortos. Recarregar o isco quando necessário.

Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

4.4 Descrição do uso

Utilização 4 - Ratos domésticos e ratazanas (ratos) - Profissionais especializados - Interior

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Juvenis Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Adultos Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Juvenis
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada:

	<p>Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis ou em pontos de engodo cobertos e protegidos.</p>
<p>Frequência de aplicação e dosagem</p>	<p>Taxa de aplicação: Ratazanas: 60 g de isco por ponto de isco / para ratos: 10 g de isco por ponto de isco Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Ratos domesticos Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p> <p>Sistema pulsed baiting – Ratos domesticos Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p>
<p>Categoria(s) de utilizadores</p>	<p>Profissional treinado</p>
<p>Capacidade e material da embalagem</p>	<p>Peso de pacote mínimo de 2,5 kg Gramas de isco em saquetas individuais: 10 Material da embalagem e tamanho: Balde: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Caixa de cartão com revestimento interior de PE 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g. Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg</p>

4.4.1 Instruções específicas de utilização

Remover o produto remanescente no final do período de tratamento.
[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.
Se utilizado em colocações periódicas de isco (pulsed baiting): Substituir o isco consumido apenas após 3 dias e, depois, com intervalos máximos de 7 dias. Recolher o isco solto e os roedores mortos. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].

Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Não utilizar o produto como isco permanente para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

4.5 Descrição do uso

Utilização 5 - Ratos e ratazanas - Profissionais especializados - Exterior em redor de edifícios

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Adultos</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Juvenis</p> <p>Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Adultos</p> <p>Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Juvenis</p>
Campos de utilização	<p>Exterior</p> <p>Exterior em redor de edifícios</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis ou em pontos de engodo cobertos e protegidos, ou Em aplicação directa nas tocas de isco pronto a usar.</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: Ratazanas: 60 g de isco por ponto de isco / para ratos: 10 g de isco por ponto de isco Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação:</p> <p>Ratos domesticos</p> <p>Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p> <p>Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros</p> <p>Ratazanas</p> <p>Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros</p> <p>Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p> <p>- Em tocas: 60-100 g de isco por toca.</p> <p>Sistema pulsed baiting –</p> <p>Ratos domesticos</p>

Infestação reduzida – 10 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros
Infestação elevada – 10 g de isco por ponto de isco a cada 3 metros
Ratazanas
Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros
Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros

Categoria(s) de utilizadores

Profissional treinado

Capacidade e material da embalagem

<p>Peso de pacote mínimo de 2,5 kg Gramas de isco em saquetas individuais: 10 Material da embalagem e tamanho: Balde: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Caixa de cartão com revestimento interior de PE 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g. Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg</p>

4.5.1 Instruções específicas de utilização

<p>Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações. - Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade. Remover o produto remanescente no final do período de tratamento. Se utilizado em colocações periódicas de isco (pulsed baiting): Substituir o isco consumido apenas após 3 dias e, depois, com intervalos máximos de 7 dias. Recolher o isco solto e os roedores mortos. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente. [Quando utilizados no exterior, os pontos de isco devem ser cobertos e posicionados em locais estratégicos, de modo a minimizar a</p>
--

sua exposição a espécies não visadas]. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.
Quando utilizado em tocas: O isco deve ser colocado de modo a minimizar a exposição a espécies não visadas e crianças. Cubra ou bloqueie as entradas das tocas armadilhadas para reduzir o risco de rejeição e derrame do isco. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir]. Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.
Não utilizar o produto como isco permanente para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.

4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

4.6 Descrição do uso

Utilização 6 - Ratazanas – profissionais especializados – Áreas abertas exteriores e aterros sanitários

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Adultos</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: Brown rat Estadio de desenvolvimento: Juvenis</p>
Campos de utilização	<p>Exterior</p> <p>Outro</p> <p>Áreas abertas exteriores e aterros sanitários</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis ou em pontos de engodo cobertos e protegidos, ou Em aplicação directa de isco pronto a usar colocados em tocas.</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: 60 g de isco por ponto de isco Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação:</p> <p>Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p> <p>- Em tocas: 60-100 g de isco por toca.</p> <p>Sistema pulsed baiting – Ratazanas Infestação reduzida – 60 g de isco por ponto de isco a cada 10 metros Infestação elevada – 60 g de isco por ponto de isco a cada 5 metros</p>
Categoria(s) de utilizadores	Profissional treinado
Capacidade e material da embalagem	<p>Peso de pacote mínimo de 2,5 kg Gramas de isco em saquetas individuais: 10 Material da embalagem e tamanho: Balde: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Caixa de cartão com revestimento interior de PE 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p>

Cartucho em PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g , 270 g, 280 g, 310 g, 500 g
Embalagem exterior - caixa de cartão com embalagens nos tamanhos: 50 cartuchos de 50g, 25 cartuchos de 100g, 20 cartuchos de 150g, 15 cartuchos de 200g, 10 cartuchos de 250g, 12 cartuchos de 250g, 18 cartuchos de 250g, 10 cartuchos de 260g, 12 cartuchos de 260g, 18 cartuchos de 260g, 10 cartuchos de 270g, 12 cartuchos de 270g, 18 cartuchos de 270g, 10 cartuchos de 280g, 12 cartuchos de 280g, 18 cartuchos de 280g, 10 cartuchos de 310g, 12 cartuchos de 310g, 18 cartuchos de 310g ou 5 cartuchos de 500g.
Estação de isco previamente carregada (PP,PS,PVC): 2*10 g ou 3*10 g em caixa de cartão de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg e 5 kg

4.6.1 Instruções específicas de utilização

Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

- Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

Remover o produto remanescente no final do período de tratamento.

[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Se utilizado em colocações periódicas de isco (pulsed baiting): Substituir o isco consumido apenas após 3 dias e, depois, com intervalos máximos de 7 dias. Recolher o isco solto e os roedores mortos. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

[Quando utilizados no exterior, os pontos de isco devem ser cobertos e posicionados em locais estratégicos, de modo a minimizar a sua exposição a espécies não visadas]. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Quando utilizado em tocas: O isco deve ser colocado de modo a minimizar a exposição a espécies não visadas e crianças. Cubra ou bloqueie as entradas das tocas armadilhadas para reduzir o risco de rejeição e derrame do isco. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.6.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Não utilizar o produto como isco permanente para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.

4.6.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.6.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Nenhuns

4.6.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Nenhuns

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Instruções de utilização - Profissionais

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
- O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
- Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
- As estações/pontos de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
- Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
- Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas (para as informações que devem constar no rótulo, ver a secção 2.5.3).
- [Caso a legislação nacional o exija] Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
- O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
- Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
- Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto).
- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em mais locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.
- Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada. Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.
- Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.
- Isco em saquetas: Não abrir as saquetas que contêm o isco.
- Pasta: a) [Se relevante] Colocar o isco em pasta com um aplicador suficientemente alongado (espátula) para reduzir a exposição das mãos - evitar tocar no interior do balde. b) [Se relevante] Especificar como proceder à limpeza do equipamento (por exemplo, espátula) e como pode ser evitado o contacto com resíduos do isco.
- [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Instruções de utilização - Profissionais especializados

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
- O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
- O produto deve ser colocado na proximidade imediata de locais onde foi detetada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
- Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
- Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas (para as informações que devem constar no rótulo, ver a secção 2.5.3).
- [Caso a legislação nacional o exija] Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
- O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
- Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
- Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto).
- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- A frequência das visitas às zonas tratadas deve estar ao critério do operador, consoante o levantamento realizado no início do tratamento. Essa frequência deve respeitar as recomendações formuladas pelo código de boas práticas aplicável.
- Se o consumo de isco for reduzido relativamente à dimensão aparente da infestação, considere a deslocação dos pontos de isco para outros locais e a possibilidade de utilizar outra formulação de isco.
- Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada. Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é

provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.

- Isco em saquetas: [Para saquetas não esvaziáveis - Não abrir as saquetas que contêm o isco].
- Pasta: a) [Se relevante] Colocar o isco em pasta com um aplicador suficientemente alongado (espátula) para reduzir a exposição das mãos - evitar tocar no interior do balde. b) [Se relevante] Especificar como proceder à limpeza do equipamento (por exemplo, espátula) e como pode ser evitado o contacto com resíduos do isco.

Na escolha do rodenticida a ser utilizado, deve ser tido em conta o nível de resistência da população de ratos visada. Nas áreas onde há evidência de resistência a uma substância ativa específica, deve ser evitada a sua utilização. Para controlar a propagação de resistências, aconselha-se alternar os iscos contendo substâncias ativas anticoagulantes distintas.

5.2. Medidas de redução do risco

Medidas de redução dos riscos - Profissionais

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir]".
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes (por exemplo, pelo menos duas vezes por semana). [Sempre que relevante, designadamente quando for mais frequente ou exigir inspecções diárias]
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:
 - -O produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, "apenas para profissionais").
 - - o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
 - - os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).
- Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
- Não lavar com água, entre as aplicações, as estações de isco.
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais. [O método de eliminação deve ser descrito especificamente no RCP nacional e constar no rótulo do produto]

Medidas de redução dos riscos - Profissionais especializados

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir]".
- A informação relativa ao produto (por exemplo, rótulo e/ou folheto) deve indicar claramente que o produto deve ser fornecido apenas a utilizadores profissionais qualificados que possam comprovar através de certificação que cumprem os requisitos de formação aplicáveis (por exemplo, "apenas para profissionais qualificados").
- Não usar em locais onde a resistência à substância ativa pode ser suspeita.
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não alternar a utilização de anticoagulantes diferentes, de potência comparável ou mais fraca, para efeitos de gestão da resistência. Para utilização alternada recorra-se antes a um rodenticida não-anticoagulante, caso esteja disponível, ou a um anticoagulante mais potente.
- Não lavar com água, entre as aplicações, as estações de isco ou utensílios usados em pontos de engodo cobertos e protegidos.
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais. [O método de eliminação deve ser descrito especificamente no RCP nacional e constar no rótulo do produto]

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de: Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.

Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.

Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto.

Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos [CIAV: 800 250 250]».

Perigoso para a vida selvagem.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais. Recomenda-se a utilização de luvas

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Prazo de validade: 24 meses

Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

Conservar unicamente no recipiente de origem.

6. Outras informações

Dado o seu modo de acção retardado, os raticidas anticoagulantes podem levar de 4 a 10 dias para serem eficazes após o consumo efectivo do isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

Este produto contém um agente amargo e um corante.