

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: Boumatic Iodine product family

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας: EU-0020541-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: EU-0020541-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνοψη και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	2
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - meta SPC 1	2
2. Σύνοψη της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	3
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	3
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	10
6. Άλλες πληροφορίες	11
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	11
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - meta SPC 2	12
2. Σύνοψη της μετα-SPC	13
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	13
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	13
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	20
6. Άλλες πληροφορίες	21
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	21
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - meta SPC 3	23
2. Σύνοψη της μετα-SPC	24
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	24
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	24
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	31
6. Άλλες πληροφορίες	32
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	32

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

Boumatic Iodine product family

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Boumatic
Διεύθυνση	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Βέλγιο
Αριθμός άδειας	EU-0020541-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

EU-0020541-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

18/11/2019

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31/10/2029

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Christeyns n.v.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Afrikalaan 182 9000 Ghent Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Afrikalaan 182 9000 Ghent Βέλγιο

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1319 - Ιώδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Christeyns n.v.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Afrikalaan 182 9000 Ghent Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Χιλή

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,5
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

meta SPC 1

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,44 - 0,5
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση αριθ. 1.1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) - για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα.
Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.
Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία.

Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση αριθ. 1.2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια
Κοινή ονομασία: Bacteria
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού, για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικές στα χημικά μπότες και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Χρήση αριθ. 1.3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) - για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού, για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση πριν ή μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Χρήση αριθ. 1.4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας πριν ή μετά το άρμεγμα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - για το προάρμεγμα: ελάχιστος χρόνος επαφής 1 λεπτού, για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό πριν ή μετά το άρμεγμα.</p> <p>Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.</p> <p>Χρησιμοποιήστε το αναρραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.</p>
--

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 1

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20°C πριν από τη χρήση.
Για αγωγή πριν το άρμεγμα: επεξεργαστείτε ολόκληρη τη θηλή με το προϊόν, αφήστε το να δράσει για 60 δευτερόλεπτα και στεγνώστε τις θηλές σκουπίζοντας, χρησιμοποιώντας πετσέτες μιας χρήσης, για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση του γάλακτος.
Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση πριν ή μετά το άρμεγμα.
Μακριά από παιδιά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν
Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους / επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής: 2 ετών

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Udder Dip	περιοχή της αγοράς: EU
Udder Dip Max	περιοχή της αγοράς: EU
Udder D Max	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine Dip	περιοχή της αγοράς: EU

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP
3 - Εθνική άδεια)

Uddine Dip	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine DP	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine DP	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine DS	περιοχή της αγοράς: EU
EU-0020541-0001 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,5
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

meta SPC 2

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-2

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,38
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση αριθ. 2.1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση αριθ. 2.2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια
Κοινή ονομασία: Bacteria
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα
Μέθοδοι/οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Χρήση αριθ. 2.3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση. - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Χρήση αριθ. 2.4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα</p>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/οι εφαρμογής	<p>Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα.</p> <p>Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό -</p> <p>Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.</p> <p>Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.</p> <p>Χρησιμοποιήστε το αναρραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.</p>

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 2

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20°C πριν από τη χρήση.

Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Μακριά από παιδιά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν

Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους / επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής: 1 χρόνος

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Gladiator RTU	περιοχή της αγοράς: EU
Udder Max Barrier	περιοχή της αγοράς: EU

Gladiator Max Barrier	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine BARRIER	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine BARRIER	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine RTU	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine RTU	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine BR	περιοχή της αγοράς: EU
Αριθμός άδειας EU-0020541-0002 1-2 <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,26
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	1,2

Εμπορική ονομασία

Udder Star Spray	περιοχή της αγοράς: EU
Udder Spray Max	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine Spray	περιοχή της αγοράς: EU

Uddine Spray	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine SP	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine SP	περιοχή της αγοράς: EU
EU-0020541-0003 1-2	

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,29
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

meta SPC 3

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

1-3

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. Σύνθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,43 - 0,5
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση αριθ. 3.1 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

-

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια
Κοινή ονομασία: Bacteria
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) -

Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Γεμίστε το κύπελλο εμβάπτισης με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Με κάθε αγωγή, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον όγκο του προϊόντος αγωγής στο κύπελλο εμβάπτισης. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά για τα μάτια.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση αριθ. 3.2 – Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια
Κοινή ονομασία: Bacteria
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
	Απολυμαντικά θηλής για τη χειρωνακτική εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών
	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με ψεκασμό - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 2 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με την ενδεικνυόμενη ποσότητα μη αραιωμένου προϊόντος απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικές στα χημικά μπότες και προστατευτικά για τα μάτια.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Χρήση αριθ. 3.3 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με εμβάπτιση της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με λουτρό (dip treatment) - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση. - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με εμβάπτιση μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 10 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση.

Χρησιμοποιήστε το αναραίωτο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Χρήση αριθ. 3.4 – Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολυμαντικά θηλής για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή με ψεκασμό της θηλής της αγελάδας μετά το άρμεγμα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - Για μετά το άρμεγμα, ελάχιστος χρόνος επαφής 5 λεπτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	15 ml ανά αγωγή ψεκασμού - Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση - 3 φορές ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Βαρέλι HDPE 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE και HDPE IBC 1000 kg

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προϊόν για την απολύμανση της θηλής της αγελάδας με ψεκασμό μετά το άρμεγμα.

Εφαρμόστε μια ποσότητα προϊόντος επαρκή για την κάλυψη ολόκληρης της θηλής, το μέγιστο 15 ml ανά εφαρμογή με εμβάπτιση με ψεκασμό.

Χρησιμοποιήστε το αναραιγμένο προϊόν απευθείας από την αρχική συσκευασία. Για τη μείωση της δερματικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετά ΠΧΠ 3

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Τα προϊόντα πρέπει να φέρονται σε θερμοκρασίες άνω των 20°C πριν από τη χρήση.

Για αγωγή μετά το άρμεγμα: Η εφαρμογή στις θηλές θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άρμεγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι θηλές να καλύπτονται πλήρως. Αφήστε τις θηλές να στεγνώσουν στον αέρα. Οι αγελάδες πρέπει να παραμείνουν σε όρθια στάση, μέχρις ότου το προϊόν να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 5 λεπτά).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης κάποιου άλλου βιοκτόνου που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Μακριά από παιδιά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Πρώτες βοήθειες: γενικές πληροφορίες: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί από το προϊόν

Μετά από εισπνοή: Παράσχετε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα. Γενικά, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας τα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και κατόπιν πιείτε νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υπονόμους / επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύεται σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής: 2 ετών.

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Udder Star	περιοχή της αγοράς: EU
Udder Star Max	περιοχή της αγοράς: EU

Udder S Max	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine Star	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine Star	περιοχή της αγοράς: EU
Udderdine ST	περιοχή της αγοράς: EU
Uddine ST	περιοχή της αγοράς: EU
Αριθμός άδειας EU-0020541-0004 1-3 <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Ενεργός Ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,5
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη			69011-36-5	500-241-6	2,5