



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/19-12/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/1-19-2

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

### RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **AGRORAT BD-5 PRO / BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO / SANTOX B PRO / BROLON MAMAC PRO / AGRORAT BD-5 PRO**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **1.1.2023.**

### Obrazloženje

Trgovačko društvo **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Španjolske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda pod imenom za tržište Republike Hrvatske **AGRORAT BD-5 PRO / BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO / SANTOX B PRO / BROLON MAMAC PRO / AGRORAT BD-5 PRO**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 1.1.2023. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

#### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**
2. Arhiva



## **Sažetak svojstava biocidnog proizvoda**

AGRORAT BD-5 PRO

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/19-12/16; URBROJ: 534-07-1-1-3/1-19-2

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0020430-0000

## 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	AGRORAT BD-5 PRO BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO SANTOX B PRO BROLON MAMAC PRO AGRORAT BD-5 PRO
-----------------	---

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Laboratorios Agrochem S.L.
	Adresa	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/19-12/16	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0020430-0000	
Datum odobrenja	20.3.2019.	
Datum isteka odobrenja	1.1.2023.	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	LABORATORIOS AGROCHEM, S.L.
Adresa proizvođača	Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera-Barcelona Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera-Barcelona Španjolska
Naziv proizvođača	Pestrid d.o.o.
Adresa proizvođača	Šandora Petefija 109, 31327 Bilje Hrvatska
Lokacija proizvodnih pogona	Šandora Petefija 109, 31327 Bilje Hrvatska
Naziv proizvođača	Sanitacija Osijek d.o.o.
Adresa proizvođača	Jarak 3, 31208 Petrijevcu Hrvatska
Lokacija proizvodnih pogona	Jarak 3, 31208 Petrijevcu Hrvatska
Naziv proizvođača	Cosmosol d.o.o.
Adresa proizvođača	Ulica Sv. L.B. Mandića 111 g, 31000 Osijek Hrvatska
Lokacija proizvodnih pogona	Ulica Sv. L.B. Mandića 111 g, 31000 Osijek Hrvatska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
Adresa proizvođača	Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera (Barcelona) Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera (Barcelona) Španjolska

## 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0.005

### 2.2. Vrsta formulacije

mamac gotov za upotrebu

## 3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H360D Može naškoditi nerođenom djetetu. H373 Uzrokuje oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Oznake obavijesti	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P260 Ne udisati prašinu. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj u/na u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada - predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

## 4. ODOBRENA UPORABA

### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Uporaba br. 1 – Upotreba 1 - Kućni miš i/ili smeđi štakor, osposobljeni profesionalac, u zatvorenom prostoru**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Rodenticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor mladi / npr. glodavci <i>Mus musculus</i> Kućni miš odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) <i>Mus musculus</i> Kućni miš mladi / npr. glodavci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Primjena mamaca gotovih za upotrebu Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Štakori: zaštitne kutije sa 100-200 g po jednom mjestu Miševi: zaštitne kutije sa 60-100 g po jednom mjestu  Za suzbijanje infestacije kućnim miševima u zatvorenom treba upotrijebiti 60-100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji). Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima u zatvorenom treba upotrijebiti 100-200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja: 5 kg. Zrno u vrećicama: Pojedinačne vrećice od 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 i 200 grama u pakiranjima vrećica do 30 kg. Rasuto žito: Paketi od rasutog zrna do 30 kg. Pakiranje je ograničeno na odvojeno pakirane vreće s najviše 10 kg po vrećici. Materijal za pakiranje: Papir ili vrećice od: PP ili PE ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE. Plastične boce ili kante: HDPE ili PE ili PP ili PET ili PVC. Kartonske vrećice od: PET ili LDPE ili papir za pakiranje. Kartonske kutije.

#### 4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

#### 4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).
- Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
- Kako bi smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, tijekom tretmana često treba tražiti i uklanjati tijela uginulih glodavaca, u skladu s preporukama navedenim u Kodeksu dobre prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno izlaganje mamaca.
- Ovaj pripravak treba biti korišten samo u zatvorenim prostorima i mjestima koja su nedostupna djeci i ne-ciljnim životinjama.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Kada je mjesto postavljanja mamca blizu sustava za odvod vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu

## 4.2. Opis uporabe

**Tablica 2. Uporaba br. 2 – Upotreba 2 - Kućni miš i/ili smeđi štakor, osposobljeni profesionalac, na otvorenom oko zgrada**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Rodenticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor mladi / npr. glodavci <i>Mus musculus</i> Kućni miš odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) <i>Mus musculus</i> Kućni miš mladi / npr. glodavci
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko građevina
Načini primjene	Primjena mamaca gotovih za upotrebu Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Štakori: zaštitne kutije sa 100-200 g po jednom mjestu Miševi: zaštitne kutije sa 60-100 g po jednom mjestu - 0 Za suzbijanje infestacije kućnim miševima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti 60-100 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji). Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima na otvorenom oko zgrada treba upotrijebiti 100-200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja: 5 kg. Zrno u vrećicama: Pojedinačne vrećice od 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 i 200 grama u pakiranjima vrećica do 30 kg. Rasuto žito: Paketi od rasutog zrna do 30 kg. Pakiranje je ograničeno na odvojeno pakirane vreće s najviše 10 kg po vrećici. Materijal za pakiranje: Papir ili vrećice od: PP ili PE ili PET ili LDPE ili PET

	/ PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE. Plastične boce ili kante: HDPE ili PE ili PP ili PET ili PVC. Kartonske vrećice od: PET ili LDPE ili papir za pakiranje. Kartonske kutije.
--	---

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

#### 4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).
- Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, tijekom tretmana često treba tražiti i uklanjati tijela uginulih glodavaca, u skladu s preporukama navedenim u Kodeksu dobre prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno izlaganje mamaca.
- Ne postavljati ovaj proizvod izravno u jazbine.

#### 4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, kanala za vodu, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba osigurati da mamac ne bude u kontaktu s vodom.

#### 4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu

#### 4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu

### 4.3. Opis uporabe

**Tablica 3. Uporaba br. 3 – Upotreba 3 - Smeđi štakor, osposobljeni profesionalac, na otvorenom prostoru & odlagališta otpada.**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Rodenticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor mladi / npr. glodavci

Područje primjene	na otvorenom vanjska otvorena područja odlagališta otpada
Načini primjene	kutija za mamce Mamci su namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Štakori: Zaštitne kutije sa 100 - 200 g mamaca po kutij po jednom mjestu tretiranja. - 0 Za suzbijanje infestacije smeđim štakorima na otvorenim područjima i odlagalištima otpada treba upotrijebiti 100-200 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja: 5 kg. Zrno u vrećicama: Pojedinačne vrećice od 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 i 200 grama u pakiranjima vrećica do 30 kg. Rasuto žito: Paketi od rasutog zrna do 30 kg. Pakiranje je ograničeno na odvojeno pakirane vreće s najviše 10 kg po vrećici. Materijal za pakiranje: Papir ili vrećice od: PP ili PE ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE. Plastične boce ili kante: HDPE ili PE ili PP ili PET ili PVC. Kartonske vrećice od: PET ili LDPE ili papir za pakiranje. Kartonske kutije.

#### 4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.
- Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

#### 4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).
- Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, tijekom tretmana često treba tražiti i uklanjati tijela uginulih glodavaca, u skladu s preporukama navedenim u Kodeksu dobre prakse.
- Ne koristiti pripravak kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno izlaganje mamaca.
- Ne postavljati ovaj proizvod izravno u jazbine.

#### 4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada je mjesto postavljanja mamca blizu površinskih voda (npr. rijeke, ribnjaci, vodeni kanali, nasipi, jarci za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

#### 4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu

#### 4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti odjeljak Upute za upotrebu



## 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>

### 5.1. Upute za uporabu

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja s proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal za rukavice mora navesti nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Učestalost kontrole tretiranog područja treba biti u nadležnosti operatora, u skladu s procjenom provedenom na početku deratizacije. Ta bi učestalost trebala biti u skladu s preporukama iz relevantnog kodeksa najbolje prakse.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Upute za uporabu koje su "specifične za mamce": rasute pelete-granule, žitarice: Ne otvarati vrećice s mamcem; Postaviti mamac na mjesto za postavljanje pomoću naprave za doziranje. Potrebno je navesti postupke za smanjivanje prašine (na primjer mokro brisanje).

### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod mogu nabaviti samo osposobljeni profesionalni korisnici (npr. "samo za osposobljene profesionalne korisnike")
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja na rezistenciju na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.

<sup>1</sup> Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- Antikoagulantne rodenticide iste ili slabije jačine ne upotrebljavati naizmjenično tijekom provođenja tretmana, zbog sprječavanja razvoja rezistencije. Za naizmjeničnu uporabu treba koristiti ne-antikoagulantne rodenticide, ako su dostupni, ili jače antikoagulantne rodenticide.
- Kutije za mamce ili pribor koji je korišten na prekrivenim mjestima za postavljanja mamaca ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta pripravka s očima: uvijek treba provjeriti da li osoba ima kontaktne leće i maknuti ih, zatim oči isprati tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.

U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinaru.

Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342".

Opasno za divlje životinje.

### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu s Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

### **5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Rok uporabe: 2 godine.

## **6. OSTALE INFORMACIJE**

Zbog odgođenog početka djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana da počnu djelovati.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.

Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.