

# Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

**Ime družine:** Raid mats

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0026527-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0026527-0000

## Kazalo

Del I. - Prva raven informacij	1
1. Upravne informacije	1
2. Sestava in formulacija družine proizvodov	2
Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)	3
1. Administrativne informacije o meta SPC - <b>meta SPC 1</b>	3
2. Sestava meta SPC	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	4
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	5
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	8
6. Druge informacije	8
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	9
1. Administrativne informacije o meta SPC - <b>meta SPC 2</b>	9
2. Sestava meta SPC	10
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	10
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	11
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	14
6. Druge informacije	14
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	15

## Del I. - Prva raven informacij

### 1. Upravne informacije

#### 1.1. Ime družine

Raid mats

#### 1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

#### 1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov

Z.A. la Pièce 8 1180 Rolle Švica

Številka dovoljenja

SI-0026527-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0026527-0000

Datum dovoljenja

15/07/2021

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

14/06/2031

#### 1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

SC Johnson Europe Sàrl,

Naslov proizvajalca

Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švica

Lokacije proizvodnje

Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italija

ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bolgarija

## 1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1404 - Transflutrín
<b>Ime proizvajalca</b>	Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95 supplier),
<b>Naslov proizvajalca</b>	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon Cedex 09, Francija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija
<b>Aktivna snov</b>	1404 - Transflutrín
<b>Ime proizvajalca</b>	Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG),
<b>Naslov proizvajalca</b>	Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Am Rhein, Nemčija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija
<b>Aktivna snov</b>	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)
<b>Ime proizvajalca</b>	Endura S.p.A,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Italija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Via Baiona, 107 – 111, 48123 Ravenna, Italija

## 2. Sestava in formulacija družine proizvodov

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
evkaliptol		Neaktivna snov			0 - 1,5

## 2.2. Vrsta(-e) formulacije

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

## Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

### 1. Administrativne informacije o meta SPC

#### 1.1. Identifikator meta SPC

meta SPC 1

#### 1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-1

#### 1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

## 2. Sestava meta SPC

### 2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
evkaliptol		Neaktivna snov			0 - 0

## 2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

### Formulacija(-e)

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

### Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

### Previdnostni stavki

Ne vdihavati hlapov.  
Po uporabi roke temeljito umiti.  
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.  
Preprečiti sproščanje v okolje.  
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.  
Ob slabem počutju pokličite zdravnika.  
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško oskrbo.  
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.  
Prestreči razlito tekočino.  
Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
Hraniti zaklenjeno.  
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.  
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

## 4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Insekticid proti komarjem za uporabo v zaprtih prostorih v gospodinjstvu.

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Insekticid proti komarjem. Do 10 ur zaščite.
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: family Culicidae Splošno ime: Komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Anopheles stephensi Splošno ime: Komarji mrzličarji Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus Splošno ime: Hišni komar (Southern House Mosquito) Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Aedes Albopictus Splošno ime: Tigrasti komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Aedes Aegypti. Splošno ime: Komarji rumene mrzlice Razvojni stadij: Odrasli osebki
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Notranjost, znotraj. Gospodinjstvo.
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Vložek, ki se vstavi v električni grelnik Podroben opis: Vstavite en vložek v električni grelnik
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: En vložek za do 30 m3. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Vsak vložek zadostuje za do 10 ur zaščite.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Škatla vsebuje 10, 20, 30,40, 50 ali 60 vložkov, z ali brez električnega grelnika. Vsak vložek je pakiran v mehko PET vrečko. Vrečke so sestavljene v trakove.

Primarno/komercialno pakiranje vsebuje tudi karton.

Škatla: karton (papir)

Mehka vrečka: PET

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1. Vzemite vložek iz ovitka/vrečke.
2. Vstavite vložek v grelnik, tako da ga držite za najtanjši del ob strani in ga poravnate s sredino reže za vložek. Za tem si umijte in osušite roke.
3. Vstavite grelnik v električno vtičnico. Proizvod začne delovati v roku 30 minut.
4. Po 10 urah uporabe izvlcite grelnik iz vtičnice in odstranite porabljen vložek, tako da ga z novim potisnete iz reže.
5. Hranite proizvod na suhem mestu, stran od sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.

Strategije za preprečevanje razvoja odpornosti:

- Kjer je mogoče, združite uporabo proizvoda z nekemičnimi ukrepi.
- Proizvod naj se vedno uporablja v skladu s priporočili na etiketi
- Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajote uporabljajte proizvode z različnimi načini delovanja.
- Nadzorujte nivo učinkovitosti in v primeru znižanja učinkovitosti preverite, če obstajajo dokazi o razvoju odpornosti - bodite pozorni, da lahko sanitarne razmere in bližina netretiranih refugijev prispevata k tveganju za ponovni napad.
- V primeru, da pravilna uporaba (glede na navodila na etiketi), ne daje pričakovane stopnje zaščite in obstajajo znaki odpornosti, prenehajte z uporabo katerega koli proizvoda, čigar aktivna snov deluje na enak način.
- Uporabniki naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije v primeru, da je tretma neučinkovit. Nosilec avtorizacije naj obvesti pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdržite zunanjo embalažo za popolna navodila za uporabo in varnostna navodila.  
Ne dopustite, da kakršnikoli materiali prekrivajo napravo v času delovanja.  
Ne dotikajte se naprave s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.  
Tako po vstavljanju ali odstranjevanju vložka si umijte roke.

Preprečite dostop mačk do tretiranih območij, zaradi visoke občutljivosti na piretroide.

Odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke pred uporabo.

Med uporabo izključite zračni filter akvarija.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Preprečiti uporabo na območjih, kjer se skladišči, pripravlja ali uživa hrana npr. kuhinje, kleti, jedilnice.



#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

##### Verjetni neposredni ali posredni učinki:

Ni pričakovanih neželenih učinkov, če se uporablja po navodilih.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja). Če simptomi ne prenehajo: poiščite zdravniško pomoč.

##### Ukrepi prve pomoči:

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Zaužitje: ni posebnih zahtev.

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Hraniti izven dosega otrok.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Rok trajanja izdelka je 4 leta pri sobni temperaturi v primarni/komercialni embalaži.

Ne hraniti nad 40 °C.

## 5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

### 5.1. Navodila za uporabo

Glejte prejšnji oddelek.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte prejšnji oddelek.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte prejšnji oddelek.

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte prejšnji oddelek.

### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glejte prejšnji oddelek.

## 6. Druge informacije

Vsebuje piperonil butoksid.

## 7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

### 7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

<b>Trgovsko ime</b>	RAID PIASTRINE ZANZARE INODORE	Področje trženja: SI
<b>Številka dovoljenja</b> <small>(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)</small>	SI-0026527-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	79,794
evkaliptol		Neaktivna snov			0

## 1. Administrativne informacije o meta SPC

### 1.1. Identifikator meta SPC

meta SPC 2

### 1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-2

### 1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

## 2. Sestava meta SPC

### 2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
evkaliptol		Neaktivna snov			0,9 - 1,5

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

#### Formulacija(-e)

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

#### Stavki o nevarnosti

Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
 Povzroča hudo draženje oči.  
 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

#### Previdnostni stavki

Ne vdihavati hlapov.  
 Po uporabi roke temeljito umiti.  
 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.  
 Preprečiti sproščanje v okolje.  
 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.  
 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč.  
 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško oskrbo.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Ob slabem počutju pokličite zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško oskrbo.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.

Prestreči razlito tekočino.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Hraniti zaklenjeno.

Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi..

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi..

## 4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Insekticid proti komarjem za uporabo v zaprtih prostorih v gospodinjstvu.

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid proti komarjem. Do 10 ur zaščite.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: family Culicidae  
Splošno ime: Komarji  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Anopheles stephensi  
Splošno ime: Komarji mrzličarji  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus  
Splošno ime: Hišni komar (Southern house mosquito)  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Aedes albopictus  
Splošno ime: Tigrasti komarji  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Aedes aegypti  
Splošno ime: Komarji rumene mrzlice  
Razvojni stadij: Odrasli osebk

##### Področje uporabe

<b>Način(-i) uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Notranjost, znotraj. Gospodinjstvo.
	Metoda: Vložek, ki se vstavi v električni grelnik Podroben opis: Vstavite en vložek v električni grelnik.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: En vložek za do 30 m3. Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Vsak vložek zadostuje za do 10 ur zaščite.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Škatla vsebuje 10, 20, 30,40, 50 ali 60 vložkov, z ali brez električnega grelnika. Vsak vložek je pakiran v mehko PET vrečko. Vrečke so sestavljene v trakove.  Primarno/komercialno pakiranje vsebuje tudi karton.  Škatla: karton (papir)  Mehka vrečka: PET

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1. Vzemite vložek iz ovitka/vrečke.

2. Vstavite vložek v grelnik, tako da ga držite za najtanjši del ob strani in ga poravnate s sredino reže za vložek. Za tem si umijte in osušite roke.

3. Vstavite grelnik v električno vtičnico. Proizvod začne delovati v roku 30 minut.

4. Po 10 urah uporabe izvlecite grelnik iz vtičnice in odstranite porabljen vložek, tako da ga z novim potisnete iz reže.

5. Hranite proizvod na suhem mestu, stran od sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.

Strategije za preprečevanje razvoja odpornosti:

- Kjer je mogoče, združite uporabo proizvoda z nekemičnimi ukrepi.
- Proizvod naj se vedno uporablja v skladu s priporočili na etiketi
- Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajoče uporabljajte proizvode z različnimi načini delovanja.
- Nadzorujte nivo učinkovitosti in v primeru znižanja učinkovitosti preverite, če obstajajo dokazi o razvoju odpornosti - bodite pozorni, da lahko sanitarne razmere in bližina netretiranih refugijev prispevata k tveganju za ponovni napad.
- V primeru, da pravilna uporaba (glede na navodila na etiketi), ne daje pričakovane stopnje zaščite in obstajajo znaki odpornosti, prenehajte z uporabo katerega koli proizvoda, čigar aktivna snov deluje na enak način.
- Uporabniki naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije v primeru, da je tretma neučinkovit. Nosilec avtorizacije naj obvesti pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdržite zunanjo embalažo za popolna navodila za uporabo in varnostna navodila.

Ne dopustite, da kakršnikoli materiali prekrivajo napravo v času delovanja.

Ne dotikajte se naprave s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.

Takoj po vstavljanju ali odstranjevanju vložka si umijte roke.

Preprečite dostop mačk do tretiranih območij, zaradi visoke občutljivosti na piretroide.

Odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke pred uporabo.

Med uporabo izključite zračni filter akvarija.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Preprečiti uporabo na območjih, kjer se skladišči, pripravlja ali uživa hrana npr. kuhinje, kleti, jedilnice ipd.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

##### Verjetni neposredni ali posredni učinki:

Ni pričakovanih neželenih učinkov, če se uporablja po navodilih.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja). Če simptomi ne prenehajo: poiščite zdravniško pomoč.

##### Ukrepi prve pomoči:

**PRI VDIHAVANJU:** Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

**PRI STIKU S KOŽO:** umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Zaužitje: ni posebnih zahtev.

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Hraniti izven dosega otrok.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

#### **4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Rok trajanja izdelka je 4 leta pri sobni temperaturi v primarni/komercialni embalaži.

Ne hraniti nad 40 °C.

### **5. Splošna navodila za uporabo meta SPC**

#### **5.1. Navodila za uporabo**

Glejte prejšnji oddelek.

#### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte prejšnji oddelek.

#### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte prejšnji oddelek.

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte prejšnji oddelek.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte prejšnji oddelek.

### **6. Druge informacije**



Vsebuje piperonil butoksid, evkaliptol in d-limonen.

## 7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

### 7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

<b>Trgovsko ime</b>	RAID PIASTRINE ZANZARE EUCALIPTO	Področje trženja: SI
<b>Številka dovoljenja</b> <small>(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)</small>	SI-0026527-0002 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	79,794
evkaliptol		Neaktivna snov			0,9