

**HU**

***MELLÉKLET***

**BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA**

MURIN Forte rágcsálóirtó blokk

**Terméktípus(ok)**

PT14: Rágcsálóirtó szerek

**Az engedély száma:** HU-2019-MA-14-00249-0000

**R4BP eszközszám:** HU-0020955-0000

## 1. fejezet - Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kereskedelmi név | MURIN Forte rágszálóírtó blokk |
|------------------|--------------------------------|

### 1.2. Az engedély jogosultja

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Az engedély jogosultjának neve és címe | Név | Vebi Istituto Biochimico s.r.l.             |
|  | Cím | via Desman, 43 35010 Borgoricco Olaszország |
| Az engedély száma                      |     | HU-2019-MA-14-00249-0000                    |
| <i>R4BP eszközszám</i>                 |     | HU-0020955-0000                             |
| Az engedély megadásának dátuma         |     | 01/04/2014                                  |
| Az engedély lejáratának dátuma         |     | 31/12/2026                                  |

### 1.3. A termék gyártója (gyártói)

|                 |  |
|-----------------|--|
| A gyártó neve   | Vebi Istituto Biochimico s.r.l.                  |
| A gyártó címe   | via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Olaszország |
| Gyártási helyek | via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Olaszország |

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hatóanyag       | Bromadiolon   |
| A gyártó neve   | ACTIVA SRL  |
| A gyártó címe   | Via Feltre 32 20132 Milánó Olaszország  |
| Gyártási helyek | Dr. Tezza s.r.l., Via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (Verona) Olaszország |

---

## 2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

### 2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

| Triviális név | IUPAC-név   | Funkció   | CAS-szám   | EK-szám   | Tartalom (%) |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|--------------|
| Bromadiolon   | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | hatóanyag | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,005        |

### 2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

### 3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Figyelmeztető mondatok            | <p>H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket . . .</p> <p>H372: Károsítja a szerveket . ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér).</p>   |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | <p>P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.</p> <p>P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.</p> <p>P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.</p> <p>P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.</p> <p>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.</p> <p>P301: LENYELÉS ESETÉN::</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P310: Azonnal forduljon orvoshoz.</p> <p>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.</p> |

## 4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

### 4.1. A felhasználások leírása

#### 1. táblázat - Felhasználás #1 - házi egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri

|  |   |
|--|---|
| Terméktípus  | PT14: Rágcsálóirtó szerek   |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Nem releváns rágcsálóirtók esetén   |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)      | Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i><br>Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek<br><br>Tudományos név: <i>Rattus rattus</i><br>Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek<br><br>Tudományos név: <i>Mus musculus</i><br>Közhasználatú név: egyéb: Házi egér<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek  |
| Felhasználási terület(ek)                                  | beltéri felhasználás<br><br>beltéri   |
| Az alkalmazás módja(i)                                     | Módszer: Csalétek alkalmazása<br><br>Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek  |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság                        | Alkalmazási arány: -<br><br>Hígítás (%): -<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br><br>Egerek ellen: legfeljebb 50 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kismértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.<br>Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.<br><br>Patkányok ellen: legfeljebb 200 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kismértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.<br>Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, |

|   |   |
|---|---|
|   | az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcshálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.  |
| Felhasználói kör                        | képzett szakember   |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p>10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 80, 100, 120, 150 és 200 grammos blokkok</p> <p>Csomag mérete: 1,5 - 25 kg</p> <p><i>10 kg-nál nagyobb csomagolás esetén</i> belső csomagolási egységeket kell alkalmazni, amelynek mérete legfeljebb 5 vagy 10 kg lehet.</p> <p>Csomagolóanyag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén</li> <li>- fémdoboz, papír, karton</li> <li>- doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/polietilén</li> <li>- vödör: HDPE</li> </ul> |

#### 4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

#### 4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

#### 4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 4.2. A felhasználások leírása

### 2. táblázat - Felhasználás #2 - házi egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéri

|  |  |
|--|--|
| Terméktípus  | PT14: Rágcsálóirtó szerek  |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Nem releváns rágcsálóirtók esetén  |
| Célgazdaság(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)        | Tudományos név: Rattus norvegicus<br>Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek<br><br>Tudományos név: Rattus rattus<br>Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek<br><br>Tudományos név: Mus musculus<br>Közhasználatú név: egyéb: Házi egér<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek  |
| Felhasználási terület(ek)                                  | kültéri felhasználás<br><br>Egerek és patkányok: kültéren épületek körül Patkányok: kültéren épületek körül, nyílt területeken, hulladéklerakók körül  |
| Az alkalmazás módja(i)                                     | Módszer: Csalétek alkalmazása<br><br>Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek   |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság                        | Alkalmazási arány: -<br><br>Hígítás (%): -<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br><br>Egerek ellen: legfeljebb 50 g csalétek/csalétekállomány. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kismértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.<br>Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.<br><br>Patkányok ellen: legfeljebb 200 g csalétek/csalétekállomány. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kismértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.<br>Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket. |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| Felhasználói kör                        | képzett szakember   |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p>10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 80, 100, 120, 150 és 200 grammos blokkok</p> <p>Csomag mérete: 1,5 - 25 kg</p> <p><i>10 kg-nál nagyobb csomagolás esetén</i> belső csomagolási egységeket kell alkalmazni, amelynek mérete legfeljebb 5 vagy 10 kg lehet.</p> <p>Csomagolóanyag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén</li> <li>- fémdoboz, papír, karton</li> <li>- doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/polietilén</li> <li>- vödör: HDPE</li> </ul> |

#### 4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól.
- Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.

#### 4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

#### 4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárcok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

#### 4.3. A felhasználások leírása



**3. táblázat - Felhasználás #3 - patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – csatornák**

|  |   |
|--|---|
| Terméktípus  | PT14: Rágcsálóirtó szerek   |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | Nem releváns rágcsálóirtók esetén   |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)      | Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i><br>Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és érett egyedek<br><br>Tudományos név: <i>Rattus rattus</i><br>Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány<br>Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és érett egyedek   |
| Felhasználási terület(ek)                                  | egyéb: Egyéb<br><br>Csatornarendszerben történő alkalmazás  |
| Az alkalmazás módja(i)                                     | Módszer: Csalétek alkalmazása<br><br>Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban vagy a csatornaaknában felfüggesztve alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.   |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság                        | Alkalmazási arány: -<br><br>Hígítás (%): -<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>Csatornafedelenként legfeljebb 250 gramm csalétek<br><br>Csatornarendszerben történő patkányirtásra csak a 25 grammos, vagy annál nagyobb tömegű blokkok használhatók.   |
| Felhasználói kör   | képzett szakember   |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok                    | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 80, 100, 120, 150 és 200 grammos blokkok<br>Csomag mérete: 1,5 - 25 kg<br><i>10 kg-nál nagyobb csomagolás esetén belső csomagolási egységeket kell alkalmazni, amelynek mérete legfeljebb 5 vagy 10 kg lehet.</i><br><br>Csomagolóanyag:<br>- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén<br>- fémdoboz, papír, karton<br>- doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/polietilén<br><br>- vödör: HDPE |

---

#### **4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

Csatornarendszerben történő alkalmazáskor a csatléket úgy kell kihelyezni és rögzíteni, hogy a víz / szennyvíz ne érhesse el vagy moshassa el.

#### **4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

#### **4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a terméket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.

#### **4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

-

#### **4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

-

#### **4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

-

---

## 5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS<sup>1</sup>

### 5.1. Felhasználási útmutató

- Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékokat). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.)
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.
- Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.
- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.
- Ne használjon tartósan véralvadásgátló rágcsálóirtó csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.
- Ne alkalmazza a terméket tartósan (állandó kihelyezéssel).
- Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.

---

<sup>1</sup>Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

- 
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
  - A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.
  - A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.
  - A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.
  - A csalétekállomásokat és a kihelyezéshez használt szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.
  - A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.
  - Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtószert tartalmaz”; „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz.(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)”. Továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenméreg, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon. A termékinformációnak (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztetnie kell arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).

### **5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

- A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén - adott esetben késleltetve jelentkező - tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.
- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.
- Továbbá:
- Bőrrel való érintkezés esetén: mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
- Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
- Szájba kerülés esetén: gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át.Tilos hánytatni! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtószert tartalmaz”; „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz.(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)”. Továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenméreg, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon. A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).
- Veszélyes a vadon élő állatokra.

### **5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

- Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

---

- Az irtószer összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

### **5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.
- Gyermek, madarak, háziállatok és használatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
- Szavatossági idő: 24 hónap

---

## 6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

---

Címkefelirat tartalmazza:

**MURIN Forte rágcsálóirtó blokk**

**Hatóanyaga:** 0,005% Bromadiolon

**II. forgalmi kategóriájú irtószer**

**Engedélytulajdonos:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l. (Borgoricco, Olaszország)

**NNK engedélyszám:** HU-2019-MA-14-00249-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2., 3., 4. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei