

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-ED094273-51 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας στο βιοκτόνο **Klerat® Pellets XT** με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης,
- την άδεια του προϊόντος **Klerat® Pellets XT** που έλαβε στην Ολλανδία με αριθμό **R4BP3 ASSET No: NL-0029070-0000**, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Klerat® Pellets XT με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0264

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

09/07/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

05/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής 15349, Ελλάδα**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

Klerat® Pellets XT

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Ερασιτέχνες & επαγγελματίες

4. Μορφή:

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:
Brodifacoum 0,0024% β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

Βοηθητικές ουσίες: 99,9976% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 05/08/2027.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία: 09/07/2024



(Δρ. Μάκης Αντωνιάδης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Klerat® Pellets XT

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0264

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Klerat® Pellets XT Talon® Pellets XT	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
	Διεύθυνση	Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής 15349, Ελλάδα
Αριθμός άδειας	KY-0264	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	09/07/2024	
Ημερομηνία λήξης άδειας	05/08/2027	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67, 4058 Βασιλεία, Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	2 ^ο χλμ Κοινοτικής Οδού Οινοφύτων-Αγίου Θωμά, Οινόφυτα Βοιωτίας 32011, Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG., Ελβετία
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67, 4058 Βασιλεία, Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Aurorium UK Ltd., Hale Bank WA8 8NS Widnes, Ην. Βασίλειο

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0024

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Ευρύ Κοινό-Εσωτερικοί χώροι-Ποντικοί ή/και αρουραίοι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) – Νεαρά και ενήλικα άτομα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) - Νεαρά και ενήλικα άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση σε προσφραγισμένα σακουλάκια (15γρ.) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα	Ποντίκια: 2-3 φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό

εφαρμογής	<p>σταθμό. Αρουραίοι: 3-4 φακελάκια (45-60γρ.) ανά δολωματικό σταθμό</p> <p>Ποντίκια: Τοποθετήστε 2-3 προσφραγισμένα φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>Αρουραίοι: Τοποθετήστε 3-4 προσφραγισμένα φακελάκια (45-60γρ.) δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Μεγέθη συσκευασιών: Ελάχιστο 30γρ. Μέγιστο 150γρ. Σακουλάκια σε κάθε συσκευασία: 2-10 σακουλάκια ανά κουτί. Γραμμάρια δολώματος ανά σακουλάκι: 15γρ. Υλικό συσκευασίας: Σακουλάκι: Χαρτί/ LLDPE/ Εξωτερικό κουτί: Χαρτόνι</p>

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. Μην ανοίγετε τα σακουλάκια. Πρέπει να επισκέπτεστε τους δολωματικούς σταθμούς τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια προκειμένου να ελέγξετε αν το δόλωμα έπιασε, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι και για να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) – Νεαρά και ενήλικα άτομα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) - Νεαρά και ενήλικα άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος εφαρμογής	Δολώμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση σε προσφραγισμένα σακουλάκια (15γρ.) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντίκια: 2-3 φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αρουραίοι: 3-4 φακελάκια (45-60γρ.) ανά δολωματικό σταθμό Ποντίκια: Τοποθετήστε 2-3 προσφραγισμένα φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών. Αρουραίοι: Τοποθετήστε 3-4 προσφραγισμένα φακελάκια (45-60γρ.) δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μεγέθη συσκευασιών: Ελάχιστο 30γρ. Μέγιστο 150γρ. Σακουλάκια σε κάθε συσκευασία: 2-10 σακουλάκια ανά κουτί. Γραμμάρια δολώματος ανά σακουλάκι: 15γρ. Υλικό συσκευασίας: Φακελάκι: Χαρτί/ LLDPE/ Εξωτερικό κουτί: Χαρτόνι

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. Μην ανοίγετε τα φακελάκια.

Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.3. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι – Ποντικοί ή/και αρουραίοι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) – Νεαρά και ενήλικα άτομα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) - Νεαρά και ενήλικα άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε σκεπασμένα και

	προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Ποντίκια: 30-50γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης. Αρουραίοι: 50-75γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης</p> <p>Ποντίκια: 30-50γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>Αρουραίοι: 50-75γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά Χύδην δόλωμα συσκευασμένο σε: κουτί/ δοχείο/ σακούλα Υλικό συσκευασίας: Κουτί: Χαρτόνι/ δοχείο/ σακούλα: PP (αδιαφανές)

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε σκεπασμένα/προστατευμένα δολωματικά σημεία.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια προκειμένου να ελέγξετε αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
[Όταν παρέχονται] Ακολουθήστε κάθε πρόσθετη οδηγία που παρέχεται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από

τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε διαλείπουσα δόλωση.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.4. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτηρίων – Ποντικοί ή/και αρουραίοι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> (Οικιακός ποντικός) – Νεαρά και ενήλικα άτομα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) - Νεαρά και ενήλικα άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτηρίων
Μέθοδος εφαρμογής	Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τα σημεία δόλωσης να είναι σκεπασμένα και προστατευμένα σε δολωματικούς σταθμούς. Απευθείας εφαρμογή/ τοποθέτηση δολώματος έτοιμου προς χρήση μέσα στα λαγούμια.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντίκια: 30-50γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης. Αρουραίοι: 50-75γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης, 50γρ. ανά λαγούμι Ποντίκια: 30-50γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση

	<p>ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>Αρουραίοι: 50-75γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>50γρ. δολώματος ανά λαγούμι</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά Χύδην δόλωμα συσκευασμένο σε: κουτί/ δοχείο/ σακούλα Υλικό συσκευασίας: Κουτί: Χαρτόνι/ δοχείο/ σακούλα: PP (αδιαφανές)

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση, σε σκεπασμένα/ προστατευμένα σημεία δόλωσης ή σε λαγούμια.
Προστατέψτε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό έχει καταστραφεί από νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ζώα μη στόχους.
Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται στα λαγούμια για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ζώα μη στόχους και παιδιά.
Καλύψτε ή μπλοκάρτε τις εισόδους των λαγουμιών με δολώματα για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και διασκορπισμού των δολωμάτων.
[Όταν παρέχονται] Ακολουθήστε κάθε πρόσθετη οδηγία που παρέχεται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε διαλείπουσα δόλωση.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς

κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, κανάλια νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή σε συστήματα αποστράγγισης νερού για να μην παρασυρθεί το δόλωμα σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης και πλημμύρας.

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό:

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τα τα προσφραγισμένα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να

εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων- μυοκτονιών.

Επαγγελματίες:

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της εφαρμογής, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των πληθυσμών (IPM), που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις σπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου υπάρχει η δυνατότητα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαθέτουν σαφή σήμανση για να δηλώνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- [Αν απαιτείται από την εθνική πολιτική ή νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να σηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και δίπλα στα δολώματα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση που θα εξηγήσει τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς επίσης να αναφέρει τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Αν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με την προφανή έκταση της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στα

στοιχεία του προϊόντος).

- Τοποθετήστε τα χύδην δολώματα σε μορφή pellet στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρική συσκευή. Προσδιορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

Η συχνότητα των επισκέψεων στην προσβεβλημένη περιοχή θα καθορίζεται από τον χειριστή, με δεδομένη την επιθεώρηση που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Αυτή η συχνότητα πρέπει να συμφωνεί με τις συστάσεις που παρέχονται από τον αντίστοιχο κώδικα ορθής πρακτικής.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό:

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην χρησιμοποιείτε τρωκτικοκτόνα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή τον εντοπισμό δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»). Οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].

Επαγγελματίες:

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή εφαρμογής και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [εκτός από την περίπτωση εξουσιοδότησης για μόνιμες δολωματικές εφαρμογές].
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή μικρότερη

αποτελεσματικότητα για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για κυκλική εφαρμογή, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, αν διατίθεται, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα οικιακά σκεύη που χρησιμοποιούνται σε σκεπασμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος απομάκρυνσης θα περιγράφεται συγκεκριμένα στην εθνική περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και θα αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος].

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Το παρόν προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, που ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Σημείωση για τον ιατρό: Αντίδοτο - Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/ κτηνιατρικό προσωπικό.

Γενικά: Να έχετε μαζί σας τον περιέκτη/ δοχείο του προϊόντος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας όταν καλείτε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης, ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν ιατρό ή όταν πηγαίνετε για θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, αν υπάρχουν και η αφαίρεσή τους είναι εύκολη. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με έναν χειρουργό-κτηνίατρο.

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαθέτουν σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μη μετακινείται», «Περιέχει τρωκτικοκτόνο», «Ονομασία προϊόντος ή αριθμός άδειας», «Δραστική ουσία(ες)» και «Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων».

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. [Η μέθοδος απόρριψης θα περιγραφεί συγκεκριμένα στην εθνική Περίληψη χαρακτηριστικών Προϊόντος και θα αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος].

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείτε στον αρχικό περιέκτη/ δοχείο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Χρόνος ζωής προϊόντος: 2 έτη

6. Άλλες πληροφορίες

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων . Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια και χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους. Το παρόν προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ύλη.