

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: Udder dip

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: EU-0020541-0000

Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3): EU-0020541-0001

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	9
5.1. Инструкции за употреба	9
5.2. Мерки за намаляване на риска	10
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	10
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	10
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	10
6. Друга информация	10

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Udder Dip
Udder Dip Max
Udder D Max
Udderdine Dip
Uddine Dip
Udderdine DP
Uddine DP
Udderdine DS

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Boumatic
	Адрес	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Белгия
Номер на разрешението	EU-0020541-0000 1-1	

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	EU-0020541-0001
Дата на издаване на разрешението	18/11/2019
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/10/2029

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	Christeyns n.v.
Адрес на производителя	Afrikalaan 182 9000 Ghent Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Afrikalaan 182 9000 Ghent Белгия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	Christeyns n.v.
Адрес на производителя	Afrikalaan 182 9000 Ghent Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Чили

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,5
Етоксилат на мастен алкохол			69011-36-5	500-241-6	2,99

2.2. Тип на формулирането

AL - Всяка друга течност

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се измие Ръцете старателно след употреба.
Използвайте предпазни очила.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
При продължително дразнене на очите:Потърсете медицински съвет.
Да се избягва изпускане в околната среда.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Употреба # 1.1 – Третиране чрез ръчно потапяне, дезинфектанти за вимета преди или след доене

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Дрожди
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Дезинфектанти за вимета чрез ръчно потапяне на кравешкото виме преди или след доене

Метод(и) на прилагане

Отворена система: потапяне -

преди доене: време за контакт мин. 1 минута
след доене: време за контакт мин. 5 минути.

Дозировка(и) и честота на прилагане

Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 10 ml на едно третиране - Продуктът е готов за употреба - 2 пъти дневно

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон от HDPE от 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg и контейнер за превоз в насипно състояние от 1000 kg

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Продукт за дезинфекция на вимета чрез потапяне преди или след доене.
Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 10 ml на едно третиране чрез потапяне.

Напълнете чашката за потапяне с посоченото количество неразреден продукт директно от оригиналната опаковка. При всяко третиране трябва да се внимава за обема на продукта в чашата за потапяне. За да се намали кожната експозиция, се препоръчва да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавиците трябва да бъде уточнен от притежателя на разрешението в информацията за продукта), и защита на очите.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Употреба # 1.2 – Третиране чрез ръчно напръскване, дезинфектанти за вимета преди или след доене

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: дрожди
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Дезинфектанти за вимета чрез ръчно напръскване на кравешкото виме преди или след доене

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване -
преди доене: време за контакт мин. 1 минута,
след доене: време за контакт мин. 5 минути.

Дозировка(и) и честота на прилагане

Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 15 ml на едно напръскване - Продуктът е готов за употреба -
2 пъти дневно

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бидон от HDPE от 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg и контейнер за превоз в насипно състояние от 1000 kg

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

Продукт за дезинфекция на вимета чрез напръскване, преди или след доене.

Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 15 ml на едно третиране чрез напръскване.

Напълнете колбата за пръскане с посоченото количество неразреден продукт директно от оригиналната опаковка. За да се намали кожната експозиция, се препоръчва да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавиците трябва да бъде уточнен от притежателя на разрешението в информацията за продукта), защитно облекло, химически устойчиви ботуши и защита на очите.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Употреба # 1.3 – Третиране чрез автоматично потапяне, дезинфектанти за вимета преди или след доене

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: дрожди
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Дезинфектанти за вимета чрез автоматично потапяне на кравешкото виме преди или след доене

Метод(и) на прилагане	Отворена система: потапяне - преди доене: време за контакт мин. 1 минута, след доене: време за контакт мин. 5 минути.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 10 ml на едно потапяне - Продуктът е готов за употреба - 3 пъти дневно
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE от 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg и контейнер за превоз в насипно състояние от 1000 kg

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

<p>Продукт за дезинфекция на вимета чрез потапяне преди или след доене.</p> <p>Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 10 ml на едно третиране чрез потапяне.</p> <p>Използвайте неразредения продукт направо от оригиналната опаковка. За да се намали кожната експозиция, се препоръчва да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.</p>

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - Употреба # 1.4 – Третиране чрез автоматично напръскване, дезинфектанти за вимета преди или след доене

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито Дезинфектанти за вимета чрез автоматично напръскване на кравешкото виме преди или след доене
Метод(и) на прилагане	Отворена система: опръскване - преди доене: време за контакт мин. 1 минута, след доене: време за контакт мин. 5 минути.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 15 ml на едно напръскване - Продуктът е готов за употреба - 3 пъти дневно
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE от 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg и контейнер за превоз в насипно състояние от 1000 kg

4.4.1 Специфични инструкции за употреба

Продукт за дезинфекция на вимета чрез напръскване, преди или след доене.

Използвайте такова количество от продукта, което е достатъчно, за да покрие цялото виме, при максимум 15 ml на едно третиране чрез напръскване.

Използвайте неразредения продукт направо от оригиналната опаковка. За да се намали кожната експозиция, се препоръчва да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 1

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Продуктите трябва да се оставят да достигнат температури от над 20°C преди употреба.
За третиране преди доене: третирайте цялото виме с продукта, оставете да действа 60 секунди и подсушете вимето, като използвате кърпи за еднократна употреба, за да избегнете замърсяване на млякото.
За третиране след доене: Вимето трябва да се третира възможно най-бързо след доене по начин, който напълно го покрива. Оставете вимето да изсъхне. Кравите трябва да се държат в изправено положение, докато продуктът изсъхне напълно (поне 5 минути).

5.2. Мерки за намаляване на риска

В случай че е необходима комбинация от дезинфектанти преди и след доене, обмислете използването на друг несъдържащ йод биоциден продукт за дезинфекция преди или след доене.
Да се съхранява извън обсега на деца.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Първа помощ: обща информация: незабавно отстранете всички дрехи, замърсени с продукта
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух; консултирайте се с лекар в случай на оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте старателно кожата. Обикновено продуктът не дразни кожата.

При контакт с очите: Изплакнете отворените очи в продължение на няколко минути под течаща вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
При поглъщане: Изплакнете устата, след което пийте вода. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Продуктът да не се изпуска в канализационната система/ надземните или подпочвените води.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.
Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изхвърлянето в отделна пречиствателна станция за отпадни води.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се предпазва от измръзване. Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и далеч от деца.

Срок на годност: 2 години

6. Друга информация