

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Nom: Omega Pharma IR3535

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 13/23/L-M00-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0013488-0000

Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	2
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	3
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta01	3
2. Composition du méta-RCP	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	3
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	4
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	6
6. Autres informations	8
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	8
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta02	9
2. Composition du méta-RCP	9
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	9
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	10
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	16
6. Autres informations	18
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	18
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta03	20
2. Composition du méta-RCP	20
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	20
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	21
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	23
6. Autres informations	25
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	25
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta04	26
2. Composition du méta-RCP	26
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	27

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	27
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	29
6. Autres informations	31
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	31

Partie 1. - Premier niveau d'information

1. Informations administratives

1.1. Nom

Omega Pharma IR3535

1.2. Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

1.3. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Omega Pharma International n.v.
	Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	13/23/L-M00-000	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0013488-0000	
Date de l'autorisation	16/01/2023	
Date d'expiration de l'autorisation	02/12/2032	

1.4. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

Nom du fabricant	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Barcelone Espagne

2. Composition et formulation de la famille de produits

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Ethanol als Ethylalcohol Absoluut gedenatureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta01

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger	<p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence	<p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.</p>

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Moustiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Moustiques Aedes Stade de développement: Adultes</p> <p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Moustiques Culex Stade de développement: Adultes</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Extérieur</p> <p>Intérieur; Extérieur</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Système ouvert</p> <p>Description détaillée: Répartition du produit sur la peau par friction.</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: cf. ci-dessous</p> <p>Dilution (%): /</p> <p>Nombre et fréquence des applications:</p>

	<p>Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: maximum 2 applications / jour.</p> <p>Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: maximum 1 application / jour.</p> <p>Quantité appliquée: 1 g par 600 cm² (équivalent à la taille d'une cerise sur la totalité des bras et des jambes pour un enfant et équivalent à la taille d'une noix sur la totalité des bras et des jambes pour un adulte).</p> <p>Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 mois.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Lotion dans un flacon en PEHD/PE avec un bouchon en PP dans un emballage secondaire (étui en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Suivre les instruction d'utilisation.

Après l'application, le produit offre 4 heures de protection contre les moustiques.

Seul l'utilisation sous des conditions tempérées a été démontré.

Appliquer soigneusement sur toute la peau exposée, propre et sèche, exceptée les yeux et les lèvres.

Enfants et adultes âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum

Des facteurs tels qu'une température élevée, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de la protection. Renouveler l'application après la baignade ou la douche.

En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant l'application du produit.

Informez le titulaire de l'autorisation si le produit s'avère inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Pour usage externe uniquement.

Le produit ne doit être appliqué que sur les parties non couvertes de la peau comme les bras, les mains, les jambes et le visage.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

Pour l'utilisation chez les nourrissons et les jeunes enfants, une protection de type mécanique (vêtements, moustiquaires) est

recommandée en protection primaire.

Éviter le contact de la peau traitée avec les vêtements et les aliments.

Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons.

Se laver les mains avant de manipuler des aliments.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour les enfants âgés jusqu'à 12 ans, le produit doit être appliqué par un adulte.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Renouveler l'application uniquement si nécessaire, notamment en cas de forte transpiration ou après la baignade.

Si la protection n'est plus nécessaire, il est recommandé d'enlever le produit par lavage.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 18 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

/

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial	Jungle Formula kids lotion	Marché: LU
Numéro de l'autorisation <small>(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)</small>	LU-0013488-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,78

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta02

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Moustiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Moustiques Aedes Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Moustiques Culex Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Application par pulvérisation sur la peau.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1 g par 600 cm ² . Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total: Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation). Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations. Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.

	<p>Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.</p> <p>Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Adultes et enfant de plus de 6 mois.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 4 heures de protection contre les moustiques.</p> <p>L'utilisation n'a été démontrée que sous conditions tempérées.</p>
--

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Répulsif - Tiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Ixodes ricinus Nom commun: Tiques Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Application par pulvérisation sur la peau.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1 g par 600 cm ² . Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total: Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation). Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations.

	<p>Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.</p> <p>Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.</p> <p>Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Adultes et enfants de plus de 6 mois.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 8 heures de protection contre les tiques.</p>

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Répulsif - Insectes piqueurs - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine – À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicoides spp. Nom commun: Moucheron Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Phlebotominae Nom commun: Phlébotomes Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Vespula Nom commun: Guêpes Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Application par pulvérisation sur la peau.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1 g par 600 cm ² . Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total: Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation). Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations.

	<p>Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.</p> <p>Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.</p> <p>Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Adultes et enfants de plus de 6 mois.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 1 heure de protection contre les moucheron.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 6 heures de protection contre les phlébotomes.</p> <p>Repousse les guêpes de la peau jusqu'à 2,5 heures.</p>

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Se conformer aux instructions d'utilisation.

Appliquer soigneusement sur toute la peau exposée, propre et sèche, à l'exception des yeux et des lèvres.

Des facteurs tels qu'une température élevée, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de la protection. Renouveler l'application après la baignade ou la douche.

En cas d'utilisation concomitante du produit avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant l'application du produit.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Uniquement pour usage externe.

Le produit doit être appliqué uniquement sur les parties non couvertes de la peau telles que les bras, les mains, les jambes et le visage.

Pour une application sur le visage: vaporiser sur la main de l'adulte et appliquer avec parcimonie sur le visage de l'adulte ou de l'enfant en évitant les yeux et la bouche.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

Pour une utilisation chez le nourrisson ou le jeune enfant, une protection mécanique (vêtements, moustiquaires) est recommandée en première protection.

Lors de la pulvérisation à l'intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et évitez de respirer les aérosols.

Éviter tout contact de la peau ou des vêtements traités avec des aliments.

Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons.

Se laver les mains avant de manipuler les aliments.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour les enfants jusqu'à 12 ans: Le produit doit être appliqué par des adultes.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Renouveler l'application uniquement si nécessaire, notamment en cas de forte transpiration ou après la baignade.

Si la protection n'est plus nécessaire, il est recommandé d'enlever le produit par lavage.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avalier. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 24 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

/

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Jungle Formula Outdoor & Camping

Marché: LU

Numéro de l'autorisation(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

LU-0013488-0002 1-2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,92

Nom commercialMousti K.O lotion bébés et femmes
enceintes

Marché: LU

Numéro de l'autorisation(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

LU-0013488-0003 1-2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,92

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta03

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-3

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le contenu dans un centre de recyclage.

Éliminer le récipient dans un centre de recyclage.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Moustiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Moustiques Aedes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Moustiques Culex
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Intérieur; Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert
Description détaillée:

Répartition du produit sur la peau par friction.

Taux d'application: cf. ci-dessous

Taux et fréquences d'application

Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications:
Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: maximum 2 applications / jour.

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: maximum 1 application / jour.

Quantité appliquée: 1 g par 600 cm² (équivalant à la taille d'une cerise sur la totalité des bras et des jambes pour un enfant et équivalant à la taille d'une noix sur la totalité des bras et des jambes pour un adulte).

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 mois.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon avec tube et col en PEHD/PE, avec un bouchon en PP, dans un emballage secondaire (étui en carton) - de 15 ml à 100 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Après l'application, ce produit offre 5 heures de protection contre les moustiques.

L'utilisation n'est démontrée que dans des conditions tempérées.

Appliquer soigneusement sur toute la peau exposée, propre et sèche, à l'exception des yeux et des lèvres.

Des facteurs tels qu'une température élevée, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de la protection. Renouveler l'application après la baignade ou la douche.

En cas d'utilisation concomitante du produit avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant l'application du produit.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Pour usage externe uniquement.

Le produit ne doit être appliqué que sur les parties non couvertes de la peau comme les bras, les mains, les jambes et le visage.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

Pour l'utilisation chez les nourrissons et les jeunes enfants, une protection de type mécanique (vêtements, moustiquaires) est recommandée en protection primaire.

Éviter le contact de la peau traitée avec les vêtements et les aliments.

Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons.

Se laver les mains avant de manipuler des aliments.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour les enfants âgés jusqu'à 12 ans, le produit doit être appliqué par un adulte.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Renouveler l'application uniquement si nécessaire, notamment en cas de forte transpiration ou après la baignade.

Si la protection n'est plus nécessaire, il est recommandé d'enlever le produit par lavage.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 30 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

/

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Mousti K.O crème anti-moustiques bébés et femmes enceintes

Marché: LU

Numéro de l'autorisation

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)

LU-0013488-0004 1-3

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,82
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	6

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta04

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-4

1.3 Type(s) de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Ethanol als Ethyalcohol Absoluut gedensureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Contient des alpha- et bêta-pinènes et du limonène. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Tenir au frais.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Poux de tête – Grand public (à partir de 24 mois) – Utilisation sur les cheveux humains – À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pediculidae:
Nom commun: Poux de tête
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Pompe de pulvérisation - application sur la chevelure.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Enfants à partir de 2 ans et plus âgés: appliquer jusqu'à 11 pulvérisations sur le cuir chevelu des enfants. Adultes: appliquer jusqu'à 22 pulvérisations sur le cuir chevelu pour bien mouiller en profondeur tous les cheveux de la zone du cuir chevelu. Pulvériser sur le reste des cheveux afin de les mouiller complètement. Appliquer une fois par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en PP/PEHD avec un pulvérisateur en PE-LD/PP et un bouchon en PP, dans un emballage secondaire (étui en carton) - de 15 ml à 125 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Se conformer aux instructions d'utilisation.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de poux présents.

Utilisez d'abord un pédiculicide si nécessaire. Le produit ne repousse que les nouvelles infestations.

Après l'application, ce produit repousse les poux de tête jusqu'à 24 heures.

Appliquer chaque matin sur des cheveux propres et séchés à la serviette, après les avoir coiffés de la manière habituelle.

Pulvériser le produit sur les cheveux près du cuir chevelu (entre 2-5 cm) sur la totalité de la chevelure comme une laque.

Assurez-vous de couvrir tous les cheveux, en accordant une attention particulière aux zones proches de la nuque et derrière les oreilles. Assurez-vous que le cuir chevelu et les cheveux sont suffisamment humidifiés.

Laissez les cheveux sécher naturellement sans appliquer de chaleur. Ne pas utiliser un sèche-cheveux.

L'application doit être répétée après le lavage des cheveux.

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 2 ans.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Uniquement pour usage externe.

Lors de la pulvérisation à l'intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et évitez d'inspirer du produit.

Ne pas pulvériser dans les yeux.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour une utilisation sur les cheveux des enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 24 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Paranix Repellent

Marché: LU

Numéro de l'autorisation

LU-0013488-0005 1-4

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -
Autorisation nationale)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol als Ethyalcohol Absoluut gedenatureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1