

**SL**

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA**

Omega Pharma IR3535

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti

**Številka dovoljenja SI-0030287-0000**

**Številka proizvoda v R4BP SI-0030287-0000**

---

**Del I.**  
**PRVA RAVEN INFORMACIJ**

---

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Ime družine

Ime	Omega Pharma IR3535
-----	---------------------

### 1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
--------------------------	--

### 1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Perrigo Supply Chain International DAC
	Naslov	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irska
Številka dovoljenja		SI-0030287-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0030287-0000
Datum dovoljenja		24/03/2023
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		19/07/2024

### 1.4. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Medgenix Benelux,
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

Ime proizvajalca	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,
Naslov proizvajalca	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

### 1.5. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	Merck KGaA,
Naslov proizvajalca	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9 % (m/m)
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92 % (m/m)
Propilen glikol 1 avrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	0 - 6 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine
-----------------------	-------------------

---

**Del II.**  
**DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-ji)**

---

## **Poglavje 1. META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

### **1.1. Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta01
---------------	------------------

### **1.2. Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1
----------	-----

### **1.3. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
--------------------------	--

---

## **Poglavje 2. SESTAVA META SPC 1**

### **2.1. Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78 % (m/m)

### **2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine
-----------------------	-------------------

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1

Stavki o nevarnosti	H319: Povzroča hudo draženje oči.  H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  P102: Hraniti zunaj dosega otrok.  P264: Po uporabi temeljito umiti roke .  P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč.



## Poglavje 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Culex komarji Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Indoor; outdoor
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem  Podroben opis: Nanos izdelka na kožo z mazanjem
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)  Redčenje (%): 0  Število in časovni razpored uporabe:  Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan  Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)  Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 250 ml  Plastenka za losjon: HDPE/PE Pokrovček za losjon: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

---

--	--

#### **4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Po nanosu nudi ta izdelek 4 ur **zaščite** pred komarji.

Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.

Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Starost 6 let in več: **največ 2 nanosa/dan**

Starost 6 mesecev do < 6 let: **največ 1 nanos/dan**

Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje **zaščite**. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za **zaščito** pred soncem najprej nanesite izdelek za **zaščito** pred soncem in **počakajte 20 minut**, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Samo za zunanjo uporabo.

Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.

Ne nanašajte v otroške dlani.

Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna **zaščita** priporoča mehanska **zaščita** (oblačila, mreže proti komarjem).

Izogibajte se stiku obdelovane kože ali **oblačil** s hrano.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali **pijače** ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali **pijačo**.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.

Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.

Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih **močnega** potenja ali po plavanju.

Če **zaščita** ni več potrebna, je **priporočljivo** izdelek sprati.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

**PRI ZAUŽITJU:** Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. **NE** spodbujajte bruhanja.

**Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU Z OČMI:** Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. **Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU S KOŽO:** Če pride do draženja kože, sperite z vodo in **poiščite** zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

**PRI VDIHAVANJU:** Če se pojavijo simptomi, **pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

---

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material.  
Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.  
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.  
Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.  
Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev (v PP/HDPE)

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

**Poglavje 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

**7.1. Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Jungle Formula Anti Muggenlotion Kids	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Sensitive Lotion	Področje trženja: SI
	Jungle Formula for sensitive skin	Področje trženja: SI
	Jungle Formula 20% IR3535 lotion	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids lotion	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja	SI-0030287-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetilaminopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,78 % (m/m)

---

## **Poglavje 1. META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

### **1.1. Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta02
---------------	------------------

### **1.2. Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2
----------	-----

### **1.3. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
--------------------------	--



---

## Poglavje 2. SESTAVA META SPC 2

### 2.1. Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine
-----------------------	-------------------

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2

Stavki o nevarnosti	H319: Povzročča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	<p>P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na v oljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>P102: Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>P264: Po uporabi temeljito umiti roke .</p> <p>P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno i zpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P337 + P313: Če draženje oči ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.</p>

## Poglavje 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) –uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Culex komarji Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem  Podroben opis: Nanos pršila na kožo s pršilnikom
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> . Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do < 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do < 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do < 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan  Redčenje (%): 0  Število in časovni raspored uporabe:  Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 250 ml

---

	Plastenka: PP/HDPE Pršilnik: PE-PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla
--	--

#### **4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.  
Po nanosu nudi ta izdelek 4 ure zaščite pred komarji.  
Uporaba je dokazana samo v zmernih pogojih.

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

## 4.2. Opis uporabe

**Tabela 2. Repelent proti klopom – splošna uporaba (nad 6 mesecev) - uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Ixodes ricinus</i> Splošno ime: drugo: klopi Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem  Podroben opis: Nanos pršila na kožo s pršilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> . Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do < 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do < 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do < 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan  Redčenje (%): 0  Število in časovni razpored uporabe:  Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 250 ml  Plastenka: PP/HDPE

---

	Pršilnik: PE-PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonska škatla
--	---

#### **4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.  
Po nanosu nudi ta izdelek 8 ur zaščite pred klopi.

#### **4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### 4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### 4.3. Opis uporabe

**Tabela 3. Repelent proti pikajočim insektom – splošna uporabe (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Culicoides spp. Splošno ime: drugo: Mušice Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Phlebotomus spp. Splošno ime: drugo: Peščene muhe Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: drugo: Vespula spp. Splošno ime: drugo: Ose Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem

	Podroben opis: Pršilnik - nanos na človeško kožo
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 1,0 g na 600 cm<sup>2</sup>. Skupna količina razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) na roke in noge: Odrasli: 80 razpršitev s pršilnikom (0,190 ml na razpršek) Otroci ≥ 6 let: 45 razpršitev s pršilnikom Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan. 6 mesecev do &lt; 1 leta: 20 razpršitev s pršilnikom 1 do &lt; 2 leti: 25 razpršitev s pršilnikom 2 do &lt; 6 let: 35 razpršitev s pršilnikom Starost od 6 mesecev do &lt; 6 let: največ 1 nanos/dan</p> <p>Redčenje (%): 0</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do &lt; 6 let: največ 1 nanos/dan</p>
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	<p>Od 15 ml do 250 ml</p> <p>Plastenka: PP/HDPE Pršilnik: PE-PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla</p>

#### 4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Odrasli in otroci, starejši od 6 mesecev.

Po nanosu nudi ta izdelek 1 uro zaščite pred mušicami.

Po nanosu nudi ta izdelek 6 ur zaščite pred peščenimi muhami.

Odganja ose s kože do 2,5 uri.



---

#### **4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Samo za zunanjo uporabo.

Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.

Za nanos na obraz: razpršite odraslemu v dlan in nanesite zmerno količino na obraz odraslega ali otroka, pri čemer se izogibajte očem in ustom.

Ne nanašajte v otroške dlani.

Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).

Ko pršite v zaprtih prostorih, se prepričajte, da je prostor dobro prezračen, in se izogibajte vdihavanju pršila;

Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.

Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.

Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.

Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

**PRI ZAUŽITJU:** Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja.

**Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU Z OČMI:** Izperite. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. **Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU S KOŽO:** Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

**PRI VDIHAVANJU:** Če se pojavijo simptomi, pokličite **CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

---

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material  
Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.  
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

## Poglavje 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

### 7.1. Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Jungle Formula 20% IR3535 spray	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Sensitive spray	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids spray	Področje trženja: SI
	Jungle Formula Multi-Insect spray	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja	SI-0030287-0002 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetilaminopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,92 % (m/m)

### 7.2. Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Jungle Formula Kids spray	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja	SI-0030287-0003 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetilaminopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,92 % (m/m)

---

## **Poglavje 1. META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE**

### **1.1. Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta03
---------------	------------------

### **1.2. Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3
----------	-----

### **1.3. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
--------------------------	--

---

## Poglavje 2. SESTAVA META SPC 3

### 2.1. Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 - 20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92 % (m/m)
Propilen glikol l avrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine
-----------------------	-------------------



### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3

Stavki o nevarnosti	H319: Povzročča hudo draženje oči.  H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  P102: Hraniti zunaj dosega otrok.  P264: Po uporabi temeljito umiti roke .  P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč.  P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  P391: Prestreči razlito tekočino.  P501: Odstraniti vsebino {1:...:}.  P501: Odstraniti posodo {1:...:}.

## Poglavje 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Aedes komarji Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Culex komarji Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem  Podroben opis: Nanos izdelka na kožo z mazanjem
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)  Redčenje (%): 0  Število in časovni razpored uporabe:  Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm <sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem) Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 100 ml Tuba in vrat tube: PP/HDPE Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Po nanosu nudi ta izdelek 5 ur zaščite pred komarji.

Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.

Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Samo za zunanjo uporabo.

Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.

Ne nanašajte v otroške dlani.

Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).

Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.

Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.

Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.

Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

**PRI ZAUŽITJU:** Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja.

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

**PRI STIKU Z OČMI:** Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

**PRI STIKU S KOŽO:** Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

**PRI VDIHAVANJU:** Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material

Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

---

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.

Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite izven dosega otrok in nečiljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 30 mesecev (v PP/HDPE)

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

---

**Poglavje 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3****7.1. Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Moustikolog ne Haute tol érance crèm e bébé	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja	SI-0030287-0004 1-3	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,82 % (m/m)
Propilen glikol l avrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	6 % (m/m)



---

## **Poglavje 1. META SPC 4 UPRAVNE INFORMACIJE**

### **1.1. Identifikator 4 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta04
---------------	------------------

### **1.2. Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4
----------	-----

### **1.3. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
--------------------------	--

---

## Poglavje 2. SESTAVA META SPC 4

### 2.1. Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetilaminopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9 % (m/m)
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine
-----------------------	-------------------

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4

Stavki o nevarnosti	H319: Povzroča hudo draženje oči. H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. EUH208: Vsebuje alfa- in beta-pinen ter limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P235: Hraniti na hladnem. P264: Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

## Poglavje 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Repelent proti človeškim naglavnim ušem – splošna uporaba (2 leti in starejši) – uporaba na človeških lasih - znotraj in zunaj**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Pediculidae: Pediculidae: Splošno ime: drugo: človeške naglavne uši Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  Znotraj; zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem  Podroben opis: Pršilnik - nanos na lase.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Otroci, stari 2 leti in več: nanesite do 11 razprškov na lase ob lasišču otroka. Odrasli: nanesite do 22 razprškov na lase ob lasišču odraslega, tako da jih po celotnem lasišču dobro zmočite. Popršite tudi po preostalih lasih, da jih popolnoma zmočite.  Redčenje (%): 0  Število in časovni razpored uporabe: Enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 125 ml  Plastenka: PP/HDPE Pumpica: PE-LD/PP Pokrovček: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

#### **4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

---

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 4**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Zagotovite, da ni prisotnih uši.

Če je potrebno, najprej uporabite pedikulicid. Izdelek ščiti samo pred novo okužbo.

Po nanosu odganja ta izdelek naglavne uši do 24 ur.

Nanesite vsako jutro na čiste in z brisačo posušene lase, potem ko ste jih oblikovali na običajen način.

Razpršite na lase blizu lasišča (med 2–5 cm) po celotnih laseh kot z lakom.

Pazite, da pokrijete vse lase, pri čemer bodite še posebej pozorni na predele blizu vratu in za ušesi. Poskrbite, da bodo lasišče in lasje zadosti navlaženi.

Pustite, da se lasje posušijo naravno brez uporabe toplote. Ne uporabite sušilnika za lase.

Nanos je potrebno ponoviti po umivanju las.

Primerno za uporabo pri odraslih in otrocih, starih 2 leti in več.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Samo za zunanjo uporabo.

Ko pršite v zaprtih prostorih, poskrbite, da je prostor dobro prezračen in se izogibajte vdihavanju pršila.

Ne pršiti v oči.

Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

V primeru uporabe na otroških laseh, morajo izdelek nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenčkih. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenčki.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

**PRI ZAUŽITJU:** Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja.

**Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU Z OČMI:** Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. **Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

**PRI STIKU S KOŽO:** Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

**PRI VDIHAVANJU:** Če se pojavijo simptomi, pokličite **CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material. Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.

Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

---

## **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Zaščititi pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 24 mesecev (v PP/HDPE)



---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

---

**Poglavje 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4****7.1. Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Paranit zaščita pred ušmi	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja	SI-0030287-0005 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetilaminopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20,9 % (m/m)
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	29,1 % (m/m)