

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Vertox Oktablok

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2022/0324/MRS/IE/BPA 70533

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0029349-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	Vertox Cub Parafinat Pro Prokum Cub Parafinat Pro METATOX PROFESSIONAL bloc rodenticid parafinic
--------------------------------	--

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	PelGar International Limited
	Adresă	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța
Numărul autorizației		RO/2022/0324/MRS/IE/BPA 70533
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0029349-0000
Data autorizației		18/07/2013
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord SC Pest Control Expert Drumul Lapus Depozit Nr 99-101 Sector 1 România SC Promedivet SRL str. Lunga 46/G Sovata 54500 jud. Mures România METATOX Pestticide Gyártó-, és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom Kossuth u. 8. Ungaria

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Brodifacum
Denumirea producătorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Prazska 54 280 02 Kolin Cehia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromophenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substanță activă	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	<p>H373: Poate provoca leziuni ale organelor blood în caz de expunere prelungită sau repetată { 1:indica#i cale a de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol: }.</p> <p>H360D: Poate dăuna fătului.</p> <p>EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instruc#iunile de utilizare.</p> <p>EUH208: Con#ine 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reac#ie alergică.</p>
Fraze de precau#ie	<p>P201: Procura#i instruc#iuni speciale înainte de utilizare.</p> <p>P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și în#elese toate măsurile de securitate.</p> <p>P280: Purta#i mănuși de protecție.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: A se depozita sub cheie.</p> <p>P501: Arunca#i conținutul la in accordance with national regulations.</p>

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Profesional - in interior si in exterior (in jurul cladirilor)

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: altele: Soarece de casa Etapă de dezvoltare: altele: Adulti si minori Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: Sobolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Adulti si minori
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior In interior In exterior in jurul cladirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Momeală gata de folosit în sta#ii rezistente la manipulări.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: 10 - 60 g de momeală pe sta#ie. Dacă este nevoie de mai multe statii, distan#a minimă între sta#ii trebuie să fie de 5 metri. #oareci: 5 - 20 g de momeală pe sta#ie. Dacă este nevoie de mai multe statii, distan#a minimă între sta#ii trebuie să fie de 2 metri. Diluare (%): N/A Numărul #i calendarul de aplicare: #oareci Infestare mare – 5 - 20g de momeală în sta#ii la fiecare 2 metri Infestare scăzută – 5 - 20g de momeală în sta#ii la fiecare 5 metri. #obolani Infestare mare – 10 - 60 g de momeală în sta#ii la fiecare 5 metri Infestare scăzută – 10 - 60 g de momeală în sta#ii la fiecare 10 metri. Programul standard de folosire a momelii (maxim 35 de zile - vezi Instruc#iunile de folosin#ă)

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Blocuri libere sau înfășurate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz amator și blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare:</p> <p>- Găleată sau cuvă de PE sau PP Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 20 kg.</p> <p>Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptușite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.</p> <p>Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 20 kg. Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.</p> <p>Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)</p> <p>Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 12 kg.</p> <p>2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în stăcii de momeală de #oareci de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.</p> <p>Cutii de #oareci multipli în pachet: 10g - 250 15g - 125 20g – 96, 120, 144 30g – 96, 120, 144 40g – 72, 96, 120 60g – 48, 60, 72, 96 80g – 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în stăcii de momeală de #oareci de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau</p> <p>în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.</p> <p>Cutii de #oareci multipli în pachet: 10g - 250 20g – 96, 120, 144 30g – 96, 120, 144 40g – 72, 96, 120 50g - 48, 60, 72, 96</p>

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în sta#ii de momeală de #obolani de unică sau de mai multă folosin#ă rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adi#ionale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de #obolani multipli în pachet:

20g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

Blocuri de 50g, ambalate în sta#ii de momeală de #obolani de unică sau de mai multă folosin#ă de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de #oareci multipli în pachet:

50g – 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de sta#ie de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibilă de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă în cutie de carton.

Unită#i multiple în pachet:

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton

Unită#i multiple în pachet: 80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96 200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96 400g - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96
--

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

#OARECI

- Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceasta, pentru a verifica, dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Se umple din nou momeala când este necesar.
- [Când sunt disponibile] Urmăriți orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

#OBOLANI

- Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 5-7 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceasta, pentru a verifica, dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Se umple din nou momeala când este necesar.
- [Când sunt disponibile] Urmăriți orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

CÂND FOLOSIȚI ÎN EXTERIOR

- Protejați momeala de la condițiile atmosferice (de ex. ploaie zăpadă, etc.) Plasați momeala care nu sunt predispuși inundațiilor.
- Înlocuiți orice momeală din stațiile de momeală care a fost deteriorat de apă sau contaminat cu murdărie.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu plasați produsul direct în vizuini.

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

INTERIOR

- Când amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenaj, să vă asigurați că momeala nu poate intra în contact cu apa.

EXTERIOR

- Când amplasați momeala în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, anuri de irigație) sau sisteme de drenaj, să vă asigurați, că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

N/A

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

N/A

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Profesioniști antrenați - interior și exterior (în jurul clădirilor) și în sistemele de canalizare

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: altele: #oarece de casă Etapă de dezvoltare: altele: Adul#i #i minori Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Adul#i #i minori
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior Interior Exterior - în jurul clădirilor În sistemele de canalizare
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit în sta#ii de momeală rezistente la manipulări Puncte de momeală acoperite #i protejate. Aplica#ia momelii gata de folosit în vizuini. Sisteme de canalizare- Momeala gata de folosit trebuie ancorat sau aplicat în sta#ii de momeală care previn momeala să intre în contact cu apa reziduală.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #OBOLANI: 10 - 60 g de momeală pe sta#ie de momeală. Dacă este nevoie de mai multe sta#ii de momeală, distan#a minimă între sta#iile de momeală trebuie să fie 5 metri. #OARECI: 5 - 20 g de momeală pe sta#ie de momeală. Dacă este nevoie de mai multe sta#ii de momeală, distan#a minimă dintre sta#ii de momeală trebuie să fie de 2 metri. Diluare (%): N/A Numărul #i calendarul de aplicare: #oareci Infestare mare – 5 - 20g momeală în sta#ii de momeală la fiecare 2 metri. Infestare scăzută – 5 - 20g momeală în sta#ii de momeală la fiecare 5 metri.

	<p>#obolani Infestare mare – 10 - 60g momeală în sta#ii de momeală la fiecare 5 metri.</p> <p>Infestare scăzută – 10 - 60g momeală în sta#ii de momeală la fiecare 10 metri.</p> <p>Program de momelire standard (max 35 zile - vezi Instruc#iunile de utilizare).</p> <p>Momelire în impulsuri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Blocuri libere sau înfă#urate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz amator #i blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare: - Găleată sau cuvă de PE sau PP Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 20 kg.</p> <p>Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptu#ite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.</p> <p>Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 20 kg. Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.</p> <p>Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)</p> <p>Mărime de ambalaj minim 3 kg. Mărime de ambalaj maxim 12 kg.</p> <p>2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în sta#ii de momeală de #oareci de unică sau de mai multă folosin#ă de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Cutii de #oareci multipli în pachet: 10g - 250 15g - 125</p>

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în sta#ii de momeală de #oareci de unică sau de mai multă folosin#ă rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau

în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adi#ionale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de #oareci multipli în pachet:

10g - 250

20g – 96, 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

50g - 48, 60, 72, 96

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în sta#ii de momeală de #obolani de unică sau de mai multă folosin#ă rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adi#ionale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Cutii de #obolani multipli în pachet:

20g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120

60g – 48, 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 32, 48, 60, 72, 96

240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

Blocuri de 50g, ambalate în sta#ii de momeală de #obolani de unică sau de mai multă folosin#ă de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Cutii de #oareci multipli în pachet:

50g – 60, 72, 96

80g – 32, 48, 60, 72, 96

	<p>100g - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96 1 -20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de sticlă de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibile de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC. Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă în cutie de carton. Unități multiple în pachet:</p> <p>80g – 32, 48, 60, 72, 96 100g - 32, 48, 60, 72, 96 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96 Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton Unități multiple în pachet: 80g – 32, 48, 60, 72, 96 100g - 32, 48, 60, 72, 96 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

- [Când este disponibil] Urmăriți price instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

- Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților de rozătoare.

- Dacă este folosit pentru momelire în pulsuri: - Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. Colectați momeala respinsă și rozătoarele moarte.

EXTERIOR

- Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt predispuse inundațiilor.

- Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală care a fost deteriorat de apă sau contaminată de pământ.

- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament [Nu se aplică unde se autorizează explicit momealirea permanentă].

- [Când este disponibil] Urmăriți instrucțiunile adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

UTILIZARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE

- Momeala trebuie amplasată în așa fel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie luată de apă.

PUNCTE DE MOMEALĂ ACOPERITE/PROTEJATE

- [Pentru utilizare în exterior punctele de momeală trebuie acoperite și amplasate strategic, ca să se minimizeze expunerea la speciile non-țintă].

- [Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

APLICAȚIE DIRECTĂ ÎN VIZUINI

- Momelele trebuie plasate astfel încât să minimizeze expunerea la speciile non-țintă și la copii.

- Acoperiți sau blocați intrarea vizuinilor, pentru a reduce riscul ca momeala să fie respinsă.

- [Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

MOMELIRE ÎN IMPULSURI

- Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și după aceea la intervale de 7 zile. Colectați orice momeală respinsă și rozătoarele moarte.
- [Când este disponibil] Urmăriți orice informație adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Acolo unde este posibil, înaintea tratamentului informați orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]
- Luați în considerare măsurile preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați alimentele și băuturile potențiale cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și pentru a reduce probabilitatea reinfestării.
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
- Să nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestărilor de rozătoare sau monitorizarea activităților de rozătoare.

UTILIZARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE

- [dacă politica sau legislația națională o cere] Amplasați momeala doar la sistemele de canalizare, care sunt conectate la stația de epurare.

APLICARE DIRECTĂ ÎN VIZUINI

- Acolo unde este posibil, înaintea tratamentului informați orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Când amplasați punctele de momeală în apropierea sistemelor de drenaj a apei, să vă asigurați că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

EXTERIOR

- Când amplasați momeala în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, canale de irigație) sau sisteme de drenaj, să vă asigurați, că momeala nu poate să intre în contact cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

N/A

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

N/A

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

PROFESIONIȘTI

- Înainte de utilizare, citiți și urmăriți informațiile de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau este furnizat la punctul de vânzare.
- Efectuați un sondaj înainte de începerea activității pe aria infestată, și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și determinați cauza probabilă și mărimea infestării.
- Îndepărtați hrana ușor de ajuns pentru rozătoare (de ex. cereale vărsate sau deșeurile de alimente). În afară de aceasta, nu curățați aria infestată înainte de tratament, pentru că aceasta deranjează populația de rozătoare, și astfel acceptarea momeii devine mai dificil de atins.
- Produsul trebuie folosit doar ca parte dintr-un sistem integrat de management (IPM), incluzând printre altele și măsuri de igienă și acolo unde este posibil metode de control fizice.
- Luați în considerare măsurile preventive de control (de ex. astupați găurile, îndepărtați hrana și băutura potențială cât este de posibil) pentru a îmbunătăți consumul de produs și a reduce probabilitatea reinfestării.
- Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a locurilor unde activitatea de rozătoare a fost observată în prealabil (de ex. căile de călătorie, locurile de cuibare, locurile de hrănire, găuri, vizuini, etc.).
- Acolo unde este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie ancorate la pământ sau la alte structuri.
- Stațiile de momeală trebuie etichetate în așa fel încât să arate clar, că conțin rodenticide și că nu pot fi mișcate sau deschise.
- [Dacă politica sau legislația națională o cere] Atunci când produsul este folosit în zone publice, artele tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notă care explică riscurile primare și secundare de otrăvire de către anticoagulant precum și indică primile măsuri de luat în cazul otrăvirii, trebuie plasate dealungul momelilor.
- Momeala trebuie ancorat ca să nu poate fi târât din stația de momeală.
- Plasați produsul inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și alte animale non-șintă.
- Plasați produsul departe de alimente, băutură și furaje, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.
- Purtați mănuși protective, rezistente la chimicale, când manipulați produsul.
- A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Dacă absorbția de momeală este relativ scăzut la mărimea aparentă a infestației, considerați reamplasarea stațiilor de momeală la locuri mai îndepărtate și schimbarea tipului de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul nu se oprește și nu se observă declin în activitatea de rozătoare, trebuie găsit cauza probabilă. Unde alte elemente au fost excluse, este probabil, că există rozătoare rezistente, deci luați în considerare un rodenticid non-anticoagulant rodenticid, acolo unde este posibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea considerați utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.
- Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

PROFESIONIȘTI ANTRENAȘI

- Înainte de utilizare, citiți și urmăriți informațiile de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau este furnizat la punctul de vânzare.
- Efectuați un sondaj înainte de începerea activității pe aria infestată, și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și determinați cauza probabilă și mărimea infestării.
- Îndepărtați hrana ușor de ajuns pentru rozătoare (de ex. cereale vărsate sau deșeurile de alimente). În afară de aceasta, nu curățați aria infestată înainte de tratament, pentru că aceasta deranjează populația de rozătoare, și astfel acceptarea momeii devine mai dificil de atins.
- Produsul trebuie folosit doar ca parte dintr-un sistem integrat de management (IPM), incluzând printre altele și măsuri de igienă și acolo unde este posibil metode de control fizice.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

- Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a locurilor unde activitatea de rozătoare a fost observată în prealabil (de ex. căile de călătorie, locurile de cuibare, locurile de hrănire, găuri, vizuini, etc.).- Acolo unde este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie ancorate la pământ sau la alte structuri.- Stațiile de momeală trebuie etichetate în așa fel încât să arate clar, că conțin rodenticide și că nu pot fi mișcate sau deschise.
- [Dacă politica sau legislația națională o cere] Atunci când produsul este folosit în zone publice, ariile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notă care explică riscurile primare și secundare de otrăvire de către anticoagulant precum și indică primile măsuri de luat în cazul otrăvirii, trebuie plasate dealungul momelilor.
- Momeala trebuie ancorat ca să nu poate fi târât din stația de momeală. - Plasați produsul inaccesibil copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și alte animale non-șintă.- Plasați produsul departe de alimente, băutură și furaje, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea. - Purtați mănuși protective, rezistente la chimicale, când manipulați produsul.- A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului. - A nu mânca, bea sau fuma când utilizați produsul. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Frecvența vizitelor la aria tratată ar trebui să fie discreția operatorului, în lumina studiului condus la începutul tratamentului. Frecvența trebuie să fie consistentă cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
- Dacă absorbția de momeală este relativ scăzut la mărimea aparentă a infestației, considerați reamplasarea stațiilor de momeală la locuri mai îndepărtate și schimbarea tipului de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul nu se oprește și nu se observă declin în activitatea de rozătoare, trebuie găsit cauza probabilă. Unde alte elemente au fost excluse, este probabil, că există rozătoare rezistente, deci luați în considerare unui rodenticid non-anticoagulant rodenticid, acolo unde este posibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Deasemenea considerați utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

PROFESIONIȘTI

- Acolo unde este posibil, înaintea tratamentului informați orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordanță cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]
- Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, cîuțați și îndepărtați rozătoarele moarte, la intervale frecvente în timpul tratamentului (de ex. de două ori pe săptămână). [Acolo unde este relevant, specificați dacă sunt necesare inspecții mai frecvente sau zilnice].
- Produsul nu trebuie folosit după 35 de zile fără o evaluare stării infestației și a eficacității tratamentului.
- Nu utilizați momeală care conține substanță activă anticoagulantă ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informația de produs (de ex. etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar: produsul nu poate fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru profesioniști"). produsul trebuie folosit în stații de momeală rezistente la manipulari adecvate (de ex. "folosiți doar în stații de momeală rezistente la manipulari"). utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală (de ex. etichetați stațiile de momeală conform cu recomandările produsului").
- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de ex. etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei suspectate de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (de ex. activitatea de rozătoare se mai observă), utilizatorul trebuie să ceară sfat de la furnizorul produsului, sau să se apeleze la o firmă de deratizare.
- Nu spălați stațiile de momeală între aplicații.
- Dispuneți de rozătoarele moarte conform cu cerințele locale [Metoda de dispunere trebuie descris specific în SPC-ul național și trebuie să apară pe eticheta produsului].

PROFESIONI#TI ANTRENA#I

- Acolo unde este posibil, înainte de tratamentul informa#i orice trecător (de ex. utilizatorii ariei tratate #i a împrejurimilor) despre campania de control a rozătoarelor [în concordan#ă cu codul de bună practică aplicabilă, dacă există]
- Informa#ia de produs (de ex. etichetă #i/sau prospect) trebuie să arate clar: produsul nu poate fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru profesioni#ti").
- Nu utiliza#i în zone unde rezisten#a la substan#a activă este suspectată.
- Produsul nu trebuie folosit după 35 de zile fără o evaluare stării infesta#iei și a eficacită#ii tratamentului.
- Nu rota#i anticoagulan#i diferi#i cu poten#ial mai slab sau comparabil pentru scopuri de management al rezisten#ei. Pentru utilizare rota#ională, lua#i în considera#ie următoarele: Do not rotate the use of different anticoagulants with comparable or weaker potency for resistance management purposes. For rotational use, consider using a non-anticoagulant rodenticide, if available, or a more potent anticoagulant.
- Do not wash the bait stations or utensils used in covered and protected bait points with water between applications.
- Dispune#i de rozătoarele moarte conform cu cerin#ele locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substan#ă anticoagulantă. Dacă este înghi#it, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea de nas #i de gingii. În cazuri severe, pot apărea vânătăi #i sânge în excremente sau urină.
- Antidot: Vitamina K1 administrat doar de personal medical/veterinar.
- În caz de:
 - Expunerea dermală, spăla#i pielea cu apă #i apoi cu apă #i săpun.
 - Expunerea ochilor, clăti#i ochii cu lichid de clătit ochi sau apă, #ine#i pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Expunere orală, clăti#i gura cu apă. Nu administra#i nimic prin gură persoanelor incon#tiente. Nu provoca#i vomă. Dacă este înghi#it, solicita#i sfatul medicului imediat #i arăta#i-le ambalajul sau eticheta produsului. Contacta#i un chirurg veterinar, dacă este înghi#it de un animal de companie.
- Sta#iile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informa#ii: "nu mi#ca#i sau deschide#i"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau număr de autoriza#ie"; "substan#a/e activă" #i "în caz de accident, suna#i la centrul de informare toxicologic [insera#i numărul na#ional]".
- Periculos pentru animale sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- LA sfâr#itul tratamentului dispune#i de momeala neconsumată #i de ambalaj în conformitate cu cerin#ele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-
- Păstra#i într-un loc uscat, răcoros #i bine ventilat. Păstra#i containerul închis #i departe de lumina directă de soare.
 - Păstra#i în locuri în care nu au acces copii, păsări, animale de companie #i animale de fermă.
 - Termen de valabilitate: 2 ani

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor pe bază de anticoagulant ia 4-10 zile după consumul momelii ca să aibă efect.
- Rozătoarele pot fi purtători de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâini goale., folosiți mănuși sau unelte, ca clește când le aruncați.
- Acest produs conține un agent amar și colorant.
- Utilizați biocidele în mod sigur și sustenabil.
- Este ilegal utilizarea acestui produs pentru alte utilizări sau în alt mod decât cel prescris pe etichetă.
- Poison Information: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin (01-8092166), retain the label for reference.
- Please note IRELAND applies a minimum Professional pack size of 2.5 Kg instead of 3.0 kg.