

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

STORM Wax Block Bait 20gr

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT14: Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ14-0140

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP:** GR-0019816-0000

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	STORM Wax Block Bait 20gr
-------------------	---------------------------

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	BASF HELLAS Single Member Industrial and Commercial S.A.
	Διεύθυνση	2 Paradissou Str. & Kifissias Ave. 15125 Marousi, Ελλάδα
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0140
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0019816-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		07/11/2018
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2025

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	BASF Agro B.V. (NL) Freienbach Branch
Διεύθυνση παρασκευαστή	Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon SZ Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lower House Road, Halebank, Widnes WA8 8NS Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Flocoumafen
Επωνυμία παρασκευαστή	BASF Agro B.V. (NL) Freienbach Branch
Διεύθυνση παρασκευαστή	Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lower House Road, Halebank, Widnes WA8 8NS Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Flocoumafen	4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin	δραστική ουσία	90035-08-8	421-960-0	0,005
Citric Acid	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Μη δραστική ουσία	77-92-9	201-069-1	0,5

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: RB - Δόλωμα, έτοιμο προς χρήση

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P308+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό..</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε /περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής..</p>

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι επαγγελματίες) - εσωτερικοί χώροι**

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν είναι σχετικό για τα τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά  Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά  Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο  Εσωτερικοί χώροι - Επαγγελματίες χρήστες
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Λεπτομερής περιγραφή: Εσωτερικοί χώροι Δολωματική εφαρμογή – Περιοδική Δόλωση: - Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). - Καλυπτόμενα και προστατευμένα σημεία δόλωσης (μόνο σε περίπτωση που έχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για τα θυλαστικά μη-στόχους και τους ανθρώπους με τους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς: 1 δόλωμα (20 γραμ) ανα σημείο δόλωσης. Για αρουραίους: 2-3 δολώματα (40-60 γραμ.) ανά σημείο δόλωσης.  Αραιώση (%): -  Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για ποντικούς: 1 δόλωμα (20 γραμ) ανα σημείο δόλωσης. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1-2 μέτρων μεταξύ τους. Για αρουραίους: 2-3 δολώματα (40-60 γραμ.) ανά σημείο δόλωσης. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5-10 μέτρων μεταξύ τους.  Τεχνική της περιοδικής δόλωσης: - Επιθεωρήστε την περιοχή και αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια κάθε 7 ημέρες.

	Μετακινήστε οποιοδήποτε άθικτο δόλωμα σε ενεργούς χώρους. Σε κάθε επίσκεψη, αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα. Τοποθετήστε το δόλωμα σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή, σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης. Εάν ο έλεγχος των τρωκτικών δεν επιτευχθεί, ελέγξτε και πάλι το χώρο για να διαπιστώσετε τους λόγους και να εξετάσει την επανατοποθέτηση ή την αύξηση του αριθμού των σημείων δόλωσης.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χύδην δόλωμα των 20 γραμ. ή σακουλάκι από χαρτόνι ή πλαστικό (PE/PP/PET/HDPE) που περιέχουν 60 γραμ. δολώματος, περαιτέρω συσκευασμένα σε: - Πλαστικό δοχείο: 3 κιλά έως 10 κιλά, PP ή HDPE ή PET. Κλείσιμο: καπάκι PP ή PE - Σακούλα επανασφραγιζόμενη: 3 κιλά έως 10 κιλά, πολυφύλλο χαρτί, εύκαμπτες σακούλες που μπορούν να ξανακλείσουν. - Επικαλυμμένο κιβώτιο από χαρτόνι: 3κιλά έως 10 κιλά, επανακλειόμενο χάρτινο κιβώτιο με επίστρωση LDPE.

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.

- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται σε προφυλαγμένα σημεία, για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο και σε παιδιά.

- Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Επιθεωρήστε την περιοχή και αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια κάθε 7 ημέρες.

- Ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται από τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο.

- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή καταπολέμησης τρωκτικών, πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του απεντομωτή, υπό το πρίσμα του ελέγχου που πραγματοποιεί

---

#### **4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

#### **4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή, ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

- Λάβετε υπ'οψη μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. τρύπες βύσματος, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την προσληψη του προϊόντος

και να μειώσει την πιθανότητα επαναπροσβολής.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. Η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").

- Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη δράση, για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγές χρήσης, εξετάστε τη χρήση ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.

#### **4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Όταν τοποθετείτε σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

#### 4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το σημείο με τις οδηγίες χρήσης

#### 4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε το σημείο με τις οδηγίες χρήσης

### 4.2. Περιγραφή χρήσης

#### Πίνακας 2. Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι επαγγελματίες) - Εξωτερικοί χώροι – γύρω από κτίρια.

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν είναι σχετικό για τα τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ποντίκι Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά  Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά  Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο  Εξωτερικοί χώροι – γύρω από κτίρια.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή: - Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). - Καλυπτόμενα και προστατευμένα σημεία δόλωσης (μόνο σε περίπτωση που έχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για τα θυλαστικά μη-στόχους και τους ανθρώπους με τους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας). - Απ'ευθείας τοποθέτηση δολώματος σε στοές των αρουραίων στο έδαφος.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς: 1 δόλωμα (20 γραμ) ανα σημείο δόλωσης ή στοά. Για αρουραίους: 2-3 δολώματα (40-60 γραμ.) ανά σημείο δόλωσης ή στοά.



	<p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:          Για ποντικούς: 1 δόλωμα (20 γραμ) ανα σημείο δόλωσης ή στοά. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 1-2 μέτρων μεταξύ τους.          Για αρουραίους: 2-3 δολώματα (40-60 γραμ.) ανά σημείο δόλωσης ή στοά. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δολωματικών σταθμών, να τοποθετούνται σε απόσταση 5-10 μέτρων μεταξύ τους.          Τεχνική της περιοδικής δόλωσης:          Επιθεωρήστε την περιοχή και αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια κάθε 7 ημέρες.          Μετακινήστε οποιοδήποτε άθικτο δόλωμα σε ενεργούς χώρους. Σε κάθε επίσκεψη, αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα. Τοποθετήστε το δόλωμα σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή, σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης. Εάν ο έλεγχος των τρωκτικών δεν επιτευχθεί, ελέγξτε και πάλι το χώρο για να διαπιστώσετε τους λόγους και να εξετάσει την επανατοποθέτηση ή την αύξηση του αριθμού των σημείων δόλωσης.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Χύδην δόλωμα των 20 γραμ. ή σακουλάκι από χαρτόνι ή πλαστικό (PE/PP/PET/HDPE) που περιέχουν 60 γραμ. δολώματος, περαιτέρω συσκευασμένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλαστικό δοχείο: 3 κιλά έως 10 κιλά, PP ή HDPE ή PET. Κλείσιμο: καπάκι PP ή PE</li> <li>- Σακούλα επανασφραγιζόμενη: 3 κιλά έως 10 κιλά, πολύφυλλο χαρτί, εύκαμπτες σακούλες που μπορούν να ξανακλείσουν.</li> <li>- Επικαλυμμένο κιβώτιο από χαρτόνι: 3κιλά έως 10 κιλά, επανακλειόμενο χάρτινο κιβώτιο με επίστρωση LDPE.</li> </ul>

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν εκτίθενται σε πλημμύρες.

- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα στα σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

- 
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.
  - Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί, για να ελαχιστοποιείται η έκθεση των ειδών μη-στόχων.
  - Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
  - Επιθεωρήστε την περιοχή και αντικαταστήστε τα φαγωμένα δόλωμα αρχικά μετά από 3 ημέρες και στη συνέχεια κάθε 7 ημέρες.
  - Συλλέξτε οποιοδήποτε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.
  - Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους των δολωμένων στοών ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι καταστροφής και έκχυσης των δολωμάτων.
  - Για εξωτερική χρήση, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.
  - Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή καταπολέμησης τρωκτικών, πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια απεντομωτή, υπό το πρίσμα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη της θεραπείας. Η συχνότητα αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

#### **4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

#### **4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

- Λάβετε υπ'οψη μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. τρύπες βύσματος, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την προσληψη του προϊόντος

και να μειώσει την πιθανότητα επαναπροσβολής.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

- 
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
  - Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
  - Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη δράση, για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγές χρήσης, εξετάστε τη χρήση ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.
  - Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.
  - Το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).
  - το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
  - οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος. (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
  - Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μοσκοτονιών.
  - Τα δολώματα πρέπει να εναποτίθενται με ασφάλεια κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά. Ασφαλείστε τα δολώματα με τρόπο τέτοιο ώστε να μη μπορούν να απομακρυνθούν από τα σημεία δόλωσης.

#### **4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Κατά την τοποθέτηση σημείων δόλωσης κοντά στα επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, κανάλια άρδευσης) ή αποστράγγιση νερού

εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

---

**4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε το σημείο με τις οδηγίες χρήσης

**4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε το σημείο με τις οδηγίες χρήσης

---

## Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

-Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α βοθηιών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

---

- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

-Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το

προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.

- Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

- Δόλωμα σε φακέλους: Μην ανοίγετε τους φακέλους που περιέχουν το δόλωμα.

## **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση.

- Μη χρησιμοποιείται το προϊόν, όπου έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα των τρωκτικών στη συγκεκριμένη δραστική ουσία.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης σύμφωνα με τις συστάσεις του κώδικα ορθής πρακτικής.

- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

---

- Το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).

- το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).

- οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περιλήψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος. (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).

- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή/και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης

θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### **5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση:

- δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

---

- οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Μην χρησιμοποιείται τον περιέκτη για άλλο σκοπό.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια. Το προϊόν δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες >30° C.



---

---

## **Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.

- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.