

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Vertox 25 Pasta Bait

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2022/0320/MRS/ IE/BPA70509

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0029353-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denumire (denumiri) comerciale | Prokum Pasta Prokum Pasta Pro Vertox Pasta Vertox Pasta Pro |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

1.2. Deținătorul autorizației

| | | |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Denumirea și adresa deținătorului autorizației | Denumire | PelGar International Limited |
| | Adresă | 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța |
| Numărul autorizației | | RO/2022/0320/MRS/ IE/BPA70509 |
| Numărul deciziei de reglementare R4BP | | RO-0029353-0000 |
| Data autorizației | | 18/07/2013 |
| Data de expirare a autorizației | | 31/12/2026 |

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea producătorului | PelGar International Limited |
| Adresa producătorului | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |
| Adresa locurilor de producție | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 Neumünster Germania Promedivet G, Strada Lungă 46, 545503 Sovata România |

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substanță activă | Brodifacum |
| Denumirea producătorului | PelGar International Limited |
| Adresa producătorului | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |
| Adresa locurilor de producție | Prazska 54 280 02 Kolin Cehia Promedivet G, Strada Lungă 46 545503 Sovata România |

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------------|
| Brodifacum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | substanță activă | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025 % (de greutate) |

2.2. Tip(uri) de formulare

XX Altele: Momeală gata de folosit: Pasta

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fraze de pericol | H373: Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată .. |
| Fraze de precau#ie | P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Arunca#i conținutul la în conformitate cu regle mentările na#ionale.. |

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Șoareci de casă – public general – interior

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoarece de casă Etapă de dezvoltare: altele: Adul#i #i minori |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior Interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. |
| Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare | Frecven#a de aplicare: Pentru șoareci folosi#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 m în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Pentru șoareci utiliza#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. Fixa#i 1 plic (12 g or 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 5 metri (la distan#e de 2 metri în zonele de infesta#ie înaltă) în zone unde șoarecile sunt active. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | publicul larg (neprofesioni#ti) |
| Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare | 10, 12 sau 15 g momeală împachetată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie în exterior de container PP (cuve sau găle#i) Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie Ambalaj exterior: PE PP cuve sau găle#i 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g. 10, 12 sau 15 g momeală împachetată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie în cartoane exterioare căptu#ite cu PE sau în cartoane sau pungi PE în cutii de carton. Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie Ambalaj exterior: exterior de carton căptu#it cu PE sau carton sau pungi PE în cutie de carton 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g. |

10, 12 sau 15 g momeală împachetată individual în plicuri de ceai din hârtie comestibil în pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminat - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton. Ambalaj interior: plicuri

de ceai din hârtie

Ambalaj exterior: Pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g.

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt împachetate cu multipli în exterior de carton. Ambalaj interior: tăvi de momeală din carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură.

Ambalaj exterior: exterior de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g.

Multipli până la 50 g (doar #oareci)

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g). Tăvile sunt împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton, ambalaj de blister, manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g.

Multipli până la 50 g (doar #oareci)

1 sau 2 plicuri de ceai x 10 g ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabilă, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. 10 g, 20 g, 40 g.

Multipli până la 50 g

Plicuri de ceai 1 x 12 g ambalate în stații de momeală pentru #oareci, rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton.

Ambalaj interior: plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton 12 g, 24 g, 48 g.

Multipli până la 50 g

Plicuri de ceai de 15 g, ambalate în stații de momeală pentru #oareci, rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2, 3 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Amblaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 15 g, 30 g, 45 g Multipli până la 50 g |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri, în sta#ii de momeală rezistente la manipulări.

Fixați 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 5 metri (2 metri în zone cu infesta#ie înaltă) acolo unde #oarecile sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situa#ii unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme proaspete sau excremente). #oarecile sunt foarte curioase și poate ajuta programul de control mutarea momelii la fiecare 2-3 zile odată cu inspectarea sau reîncărcarea punctelor de momeală. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10 - 14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Sta#iile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informa#ia de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect), trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficien#ă suspectate până la sfâr#itul tratamentului (de exemplu se mai poate observa activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor. Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Șobolani – Public general – interior

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolan maro Etapă de dezvoltare: toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior Interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit de a folosi în stații de momeală gata de folosit. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Pentru șobolani utilizați 1 - 4 picături de 15 g sau 1 - 5 picături de 12 g sau 1 - 6 picături de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șobolani folosiți 1 - 4 picături de 15 g sau 1 - 5 picături de 12 g sau 1 - 6 picături de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri. Fixați picăturile în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cantitatea maximă de momeală pe ambalaj 150 g Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în picături de ceai din hârtie comestibile în container extern PE/PP (cuve sau găleți) Ambalaj intern: picături de ceai din hârtie Ambalaj extern: cuve sau găleți de PE PP 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g. Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în picături de ceai din hârtie comestibile în exterior de carton cu captușeală din PE sau carton sau pungă PE în cutii carton Ambalaj interior: picături de ceai din hârtie Ambalaj exterior: Exterior de carton captușit cu PE sau carton sau pungă PE în cutie de carton 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g. |

Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în plicuri de ceai din hârtie comestibile ambalate în hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi de PP laminate - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton Ambalaj intern: plicuri de ceai din hârtie

Ambalaj extern: Pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi laminate de PP 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g.

Momeală liberă ambalat în tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt ambalate cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală din carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g.

Multipli până la 50 g (doar #oareci) sau 150 g (#obolani/#obolani #i #oareci).

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală de PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g). Tăvile sunt ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g sau 150 g (#obolani/#obolani #i #oareci)

Plicuri de ceai de 1, 2 sau 3 x 15 g fixate pe o bară de metal fixă într-o stație de momeală rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabilă, toate împachetate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau o pungă lipită prin căldură sau exterior poli cu capac de carton. Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g sau 150 g

Multipli până la 150 g

Plicuri de ceai de 1, 2, 3, 4 sau 5 x 10 g fixate pe o bară de metal fixă într-o stație de momeală rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabilă, toate împachetate cu multipli de 1, 2, 3 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.

Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli până la 150 g

10g – 1, 2, 4, 6, 8, 12

| | |
|--|------------------|
| | 20g – 1, 2, 4, 6 |
| | 30g – 1, 2, 4 |
| | 40g – 1, 2 |
| | 50g – 1, 2 |
| | 60g – 1, 2 |
| | 80g – 1 |
| | 90g – 1 |
| | 100g – 1 |
| | 120g – 1 |
| | 150g – 1 |

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani folosiți 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1 - 5 plicuri x 12 g sau 1 - 6 plicuri x 10 g la distan#e de 5 - 10 metri.

Fixați plicurile în stații de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 10 metri (5 metri în zone cu infesta#ie înaltă) în zone unde #obolani sunt activi. Să nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea momelei. Dacă nu există niciun semn de activitate de #obolani în jurul momelei după 7 - 10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare.

Verificați consumul de momeală regulat și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații acolo unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mi#cați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după a#ezarea momelei.

Dacă nu există niciun semn de activitate de #obolani în apropierea momelei după 7 - 10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, cre#teți cantitatea momelei prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu cre#teți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile de la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei suspectate a eficien#ei până la sfâr#itul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vân#ătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu folosiți acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Șobolani – public general – în exterior în jurul clădirilor

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în exterior În exterior în jurul clădirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Pentru #obolani folosiți 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1 - 5 plicuri x 12 g sau 1-6 plicuri x 10 g la distanțe de 5 - 10 metri. Diluaie (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru #obolani folosiți 1 - 4 plicuri x 15g sau 1 - 5 plicuri x 12 g sau 1 -6 plicuri x 10 g la distanțe de 5 - 10 metri. Fixați plicurile în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone cu infestație înaltă) acolo unde #obolani sunt activi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cantitatea maximă de momeală pe ambalaj 150 g Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în plicuri de ceai din hârtie comestibile în container extern PE/PP (cuve sau găleți) Ambalaj intern: plicuri de ceai din hârtie Ambalaj extern: cuve sau găleți de PE PP 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g. |

Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în plicuri de ceai din hârtie comestibile în exterior de carton cu căptușeală din PE sau carton sau pungi PE în cutii carton

Ambalaj interior: plicuri de ceai

din hârtie

Ambalaj exterior: Exterior de carton căptușit cu PE sau carton sau pungi PE în cutie de carton 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g.

Momeală de 10, 12 sau 15 g, ambalate individual în plicuri de ceai din hârtie comestibile ambalate în hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi de PP laminate - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton

Ambalaj intern: plicuri

de ceai din hârtie

Ambalaj extern: Pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi laminate de PP 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g.

Momeală liberă ambalat în tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt ambalate cu multipli în exterior de carton

Ambalaj interior: tăvi

de momeală din carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g.

Multipli până la 50 g (doar #oareci) sau 150 g (#obolani/#obolani #i #oareci).

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală de PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g). Tăvile sunt ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu

capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g sau 150 g (#obolani/#obolani #i #oareci)

Plicuri de ceai de 1, 2 sau 3 x 15 g fixate pe o bară de metal fixă într-o stație de momeală rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabilă, toate împachetate în multipli de 1, 2 sau 4 într-un exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau o pungă lipită prin căldură sau exterior poli cu capac de carton. Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g sau 150 g

Multipli până la 150 g

Plicuri de ceai de 1, 2, 3, 4 sau 5 x 10 g fixate pe o bară de metal fixă într-o stație de momeală rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabilă, toate împachetate cu multipli de 1, 2, 3 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Ambalaj interior: Plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP</p> <p>Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton</p> <p>Multipli până la 150 g</p> <p>10g – 1, 2, 4, 6, 8, 12</p> <p>20g – 1, 2, 4, 6</p> <p>30g – 1, 2, 4</p> <p>40g – 1, 2</p> <p>50g – 1, 2</p> <p>60g – 1, 2</p> <p>80g – 1</p> <p>90g- 1</p> <p>100g – 1</p> <p>120g – 1</p> <p>150g – 1</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani folosi#i 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1 - 5 plicuri x 12 g sau 1 - 6 plicuri x 10 g la distan#e de 5 - 10 metri.

Fixa#i plicurile în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 10 metri (5 metri în zone cu infesta#ie înaltă) în zone unde #obolani sunt activi. Să nu muta#i sau deranja#i punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea momelii. Dacă nu există niciun semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7 - 10 zile, muta#i momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare.

Verifica#i consumul de momeală regulat #i înlocui#i momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repeta#i tratamentul în situa#ii acolo unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mi#ca#i sau deranja#i punctele de momeală pentru câteva zile după a#ezarea momelii.

Dacă nu există niciun semn de activitate de #obolani în apropierea momelii după 7 - 10 zile, muta#i momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, cre#te#i cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu cre#te#i mărimea punctului de momeală. Înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Sta#iile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile de la începutul tratamentului #i cel pu#in săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte #i de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumple#i momeala când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informa#ia de produs (de exemplu etichetă #i/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei suspectate a eficien#ei până la sfâr#itul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânyătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor. Plasa#i sta#iile de momeală în ariile care nu sunt predispuse inunda#iilor.

Nu folosi#i acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Șoareci de casă – profesioniști – interior

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoareci de casă Etapă de dezvoltare: toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit în stații de momeală rezistente la manipulare. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Pentru șoareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 picături (10 g) la distanțe de 2 - 5 metri în stații de momeală rezistente la manipulare. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) 1 - 2 picături (10 g) la distanțe de 2 - 5 metri în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 picături (10 g) stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în cazul infestațiilor înalte) acolo unde șoarecii sunt active. |

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | <p>Mărimea minimă de ambalare 2,5 kg.</p> <p>Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie, ambalat în container exterior de PE/PP (cuve sau găleți)</p> <p>Ambalaj interior: plic de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: cuve sau găleți de PE PP 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalate individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în exterior de carton căptușite cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton.</p> <p>Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: Exterior de carton căptușit cu PE sau carton sau pungi PE în cutie de carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalate individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminat - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton</p> <p>Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminat 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt împachetate cu multipli în exterior de carton.</p> <p>Ambalaj interior: tăvi de momeală din PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură.</p> <p>Ambalaj exterior: carton exterior 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.</p> <p>Momeală liberă ambalat în tăvi de momeală din PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g sau 60 g). Tăvile sunt împachetate în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate împachetate cu multipli de 1/2/4 în carton exterior sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.</p> <p>Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură</p> <p>Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20kg.</p> <p>1 sau 2 plicuri de ceai x 10 g ambalate în stații de momeală pentru oareci rezistente la manipulări, din HDPE sau PP, de unică folosință sau reutilizabile. Toate sunt împachetate cu multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli</p> |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>cu capac de carton. Ambalaj interior: plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac din carton.</p> <p>Cutii multiplii pentru #oareci în ambalaj: 20 g – 144 40 g – 72, 96, 120, 144 80 g – 32, 48, 60, 72, 96 Plicuri de ceai de 12 g ambalate în sta#ii de momeală pentru #oareci rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile. Toate ambalate în multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Cutii multiplii pentru #oareci în ambalaj: 24 g – 120, 144 48 g – 60, 72, 96, 120, 144 96 g – 32, 48, 60, 72, 96 Plicuri de ceai de 15 g ambalate în sta#ii de momeală rezistente la manipulări pentru #oareci, din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2, 3 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Ambalaj interior: Plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP Ambalaj exterior: Exterior de carton ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii multiplii pentru #oareci în ambalaj: 30 g – 96, 120, 144 45 g – 60, 72, 96, 120 60 g – 48, 60, 72, 96</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci folosi#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări.

Fixa#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în sta#ii de momeală rezistente la temperaturi la distan#e de 5 metri (2 metri în zone de infesta#ie înaltă) în locurile unde #oarecile sunt active. Verifica#i regulat consumul de momeală #i înlocui#i momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului.

Repeta#i tratamentul acolo unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). #oarecile sunt foarte curioase #i poate ajuta programul de control mutarea momelii la fiecare 2 - 3 zile odată cu inspectarea sau reîncărcarea punctelor de momeală. Inspecta#i frecvent punctele de momeală în primele 10 - 14 zile #i înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, cre#te#i cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu cre#te#i mărimea punctului de momeală. Înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Sta#iile de momeală trebuie vizitate cel pu#in la fiecare 2 - 3 zile la începutul perioarei de tratament #i cel pu#in săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte #i de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumple#i momeala când este necesar.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem integrat de gestionare al dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice de control.

Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației înainte la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandată alternarea momelilor cu anticoagulanți diferiți. Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este folosit în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notificare explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant precum și indicând măsurile prime care trebuie luate în cazul otrăvirii trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu folosiți momeală care conține ca substanță activă un anticoagulant ca momeală permanentă pentru prevenirea infestației de rozătoare sau monitorizarea activității de rozătoare.

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii locului tratat și a împrejurimilor) despre campania de control al rozătoarelor.

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acolo unde plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare a apei, să asigurați că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Șobolani – profesioniști – interior

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rozătoare. |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți 1-4 plicuri x 15 g sau 1-5 plicuri x 12 g sau 1-6 plicuri x 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stații de momeală rezistente la manipulare. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șobolani folosiți 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1-5 plicuri x 12 g sau 1-6 plicuri x 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați plicurile în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în locuri cu infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg. Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în containere exterioare din PE/PP (cuve sau găleți) Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie Ambalaj exterior: cuve sau găleți din PE PP 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile în carton exterior capturat cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton Ambalaj interior: Plicuri de ceai din hârtie Ambalaj exterior: carton exterior capturat cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală ambalată individual de 10, 12 sau 15 g în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în pungi hârtie/PE/PE/ |

AL, PP, PET/PE sau PP laminate - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie

Ambalaj exterior: pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate de 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g sau 60g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt ambalate cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g or 60g). Tăvile sunt împachetate în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate sunt împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Plicuri de ceai de 1, 2 sau 3 x 15 g fixate pe o bară de metal fixă în stații de momeală rezistente la manipulare pentru #obolani din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

30 g – 96, 120, 144

45 g – 60, 72, 96, 120

60 g – 48, 60, 72, 96

90 g – 32, 48, 60, 72

120 g – 32, 48, 60, 72

180 g – 16, 24, 32, 48

Plicuri de ceai de 1, 2, 3, 4 sau 5 x 10 g fixate pe o bară de metal fixă în stații de momeală rezistente la manipulare pentru #obolani din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

10 g – 250
20 g – 125, 144
30 g – 96, 120, 144
40 g – 72, 96, 120, 144
50 g – 60, 72, 96, 120, 144
60 g – 48, 60, 72, 96, 120
80 g – 32, 48, 60, 72, 96
90 g – 32, 48, 60, 72, 96
100 g – 32, 48, 60, 72, 96
120 g – 24, 32, 48, 60, 72
150 g – 24, 32, 48, 60, 72
160 g – 16, 24, 32, 48, 60, 72
200 g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani utilizați 1-4 plicuri de 15 g sau 1-6 plicuri de 10 g la distanțe de 10 metri

Fixați plicurile în stații de momelă rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde #obolani sunt activi. Nu mutați sau deranjați punctele de momelă după plasarea momelii.

Verificați regulat consumul de momelă și schimbați momela consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momelă pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momela într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momela dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momelă. Nu creșteți mărimea punctului de momelă. Schimbați orice momelă consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Stațiile de momelă trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momela este acceptată, stațiile de momelă sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momela când este necesar. Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem integrat de gestionare al dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice de control.

Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației și întâ la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandată alternarea momelilor cu anticoagulanți diferiți. Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este folosit în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notificare explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant precum și indicând măsurile prime care trebuie luate în cazul otrăvirii trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purta#i mănu#i de protec#ie rezisten#i la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Acolo unde este posibil, înainte tratamentul informa#i to#i posibili spectatori (de exemplu utilizatorii zonei tratate #i a împrejurimilor) despre campania de control al rozătoarelor.

Nu utiliza#i momeală care con#ine o substan#ă activă anticoagulantă ca momeală permanentă pentru prevenirea infesta#iei de rozătoare sau monitorizarea activită#ii de rozătoare.

4.5.3. În func#ie de modul de utilizare, particularită#i ale efectelor posibile directe sau indirecte, instruc#iuni de prim-ajutor și măsuri de urgen#ă pentru protec#ia mediului

Atunci când plasa#i sta#iile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare de apă, să vă asigura#i că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4. În func#ie de modul de utilizare, instruc#iuni pentru eliminarea în siguran#ă a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.5.5. În func#ie de modul de utilizare, condi#iile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condi#ii normale de depozitare

Nu sunt.

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – în exterior în jurul clădirilor

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: altele: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #oarece de casă #i/sau #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în exterior Exterior în jurul clădirilor. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rata (ratele) și frecvența de aplicare</p> | <p>Frecvența de aplicare: Pentru oareci folosiți 1 plic de 15 g, 12 g, sau 1-2 plicuri de 10g la distanțe de 2 - 5 metri în stățiile de momeală rezistente la manipulare. Pentru obolani folosiți 1 - 4 plicuri de 15 g sau 1-5 plicuri de 12 g sau 1-6 plicuri de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stățiile de momeală rezistente la manipulare.</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare: Pentru oareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distanțe de 2 - 5 metri în stățiile de momeală rezistente la manipulare. Fixați 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în stățiile de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde oarecile sunt active.</p> <p>Pentru obolani folosiți 1 - 4 plicuri de 15 g sau 1 - 5 plicuri de 12 g sau 1 - 6 plicuri de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stățiile de momeală rezistente la manipulare. Fixați plicurile în stățiile de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone cu infestație înaltă) acolo unde obolanii sunt activi.</p> |
| <p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p> | <p>profesionist</p> |
| <p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p> | <p>Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg. Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în containere exterioare din PE/PP (cuve sau găleți)</p> <p style="text-align: right;">Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: cuve sau găleți din PE PP 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile în carton exterior căptușit cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton</p> <p>Ambalaj interior: Plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: carton exterior căptușit cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală ambalată individual de 10, 12 sau 15 g în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în pungi hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton</p> <p style="text-align: right;">Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate de 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g</p> |

sau 60g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt ambalate cu multipli în exterioare de carton Ambalaj interior:tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g or 60g). Tăvile sunt împachetate în sta#ii de momeală din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile. Toate sunt împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Plicuri de ceai de 1 , 2 sau 3 x 15 g fixate pe o bară de metal fixă în sta#ii de momeală rezistente la manipulări pentru #obolani din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: Plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

30 g – 96, 120, 144

45 g – 60, 72, 96, 120

60 g – 48, 60, 72, 96

90 g – 32, 48, 60, 72

120 g – 32, 48, 60, 72

180 g – 16, 24, 32, 48

Plicuri de ceai de 1 , 2, 3, 4 sau 5 x 10 g fixate pe o bară de metal fixă în sta#ii de momeală rezistente la manipulări pentru #obolani din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: Plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

10 g –250

20 g – 125, 144

30 g – 96, 120, 144

40 g – 72, 96, 120, 144

50 g – 60, 72, 96, 120, 144

| |
|--------------------------------|
| 60 g – 48, 60, 72, 96, 120 |
| 80 g – 32, 48, 60, 72, 96 |
| 90 g – 32, 48, 60, 72, 96 |
| 100 g – 32, 48, 60, 72, 96 |
| 120 g – 24, 32, 48, 60, 72 |
| 150 g – 24, 32, 48, 60, 72 |
| 160 g – 16, 24, 32, 48, 60, 72 |
| 200 g – 16, 24, 32, 48, 60 |

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări.

Fixați 1 plic (12g sau 15g) sau 1 - 2 plicuri (10g) în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 5 metri (2 metri în zonele de infesta#ie înaltă) în locurile unde #oarecile sunt active. Verificați în mod regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situa#ii când există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). #oarecile sunt foartecurioși și poate ajuta programul de control motarea momelii la fiecare 2 - 3 zile, odată cu verificarea sau reîncărcarea punctelor de momeală. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10 -14 zile și înlocuiți momeala consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, atunci creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală.

Sta#iile de momeală trebuie vizitată cel puțin la fiecare 2 - 3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala dacă este necesar.

Pentru #obolani folosiți 1-4 plicuri x 15 g sau 1-5 plicuri x 12 g sau 1-6 plicuri x 10 g la distan#e de 5 - 10 metri.

Fixați plicurile în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 10 metri (5 metri în zone cu infesta#ie înaltă) acolo unde #obolani sunt activi. Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după a#ezarea momelii. Dacă nu există nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de #obolani.

Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situa#ii acolo unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală.

Sta#ia de momeală trebuie vizitată doar după 5-7 zile de la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar.

Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Protejați momeala de la condi#iile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasați sta#iile de momeală în locuri care nu sunt predispușe inunda#iilor.

Urmăriți orice instruc#iune adi#ională furnizate de codul de cea mai bună practică.

Executați un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fa#a locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infesta#iei.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrat[al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezisten#ă a popula#iei #intă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezisten#ei la anumite substan#e active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezisten#ei, este recomandat, să alternați momelile care con#in substan#e active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legisla#ia na#ională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către

anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu aplicați direct acest produs în vizuini.

Nu folosiți momeli care conțin ca substanțe active anticoagulanți ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii locului tratat și a împrejurimilor) despre campania de control al rozătoarelor.

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea stațiilor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelii cu apa este evitată.

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.7. Descrierea utilizării

Tabel 7. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea stiintifica: altele: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #oarece de casă #i/sau #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior Interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. |
| Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare | Frecven#a de aplicare: Pentru #oareci utiliza#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sunt puncte de momeală acoperite.Pentru #obolani utiliza#i 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1 - 5 plicuri de 12 g sau 1-6 plicuri de 10 g la distan#e de 5 - 10 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Pentru #oareci folosi#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distan#e de 2 - 5 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixa#i 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau î puncte de momeală acoperite la distan#e de 5 metri (2 metri în zone de infesta#ie înaltă) acolo unde #oarecile sunt active. Pentru #obolani folosi#i 1 - 4 plicuri de 15 g sau 1 - 5 plicuri de 12 g sau 1 - 6 plicuri de 10 g la distan#e de 5 - 10 metri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixa#i plicurile în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite la distan#e de 10 metri (5 metri în zone cu infesta#ie înaltă) acolo unde #obolanii sunt activi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesioni#ti instrui#i |
| Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare | Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg. Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în containere exterioare din PE/PP (cuve sau găle#i) Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie Ambalaj exterior: cuve sau găle#i din PE PP 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile în carton exterior căptu#it cu PESau carton sau pungi PE în cutii de carton |

Ambalaj interior: Plicuri de ceai din hârtie

Ambalaj exterior: carton exterior căptușit cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală ambalată individual de 10, 12 sau 15 g în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în pungi hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate - vândute așa cum sunt sau în exterior de carton

Ambalaj interior: plicuri de

ceai din hârtie

Ambalaj exterior: pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminate de 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g sau 60g) cu capac lipit prin căldură. Tăvile sunt ambalate cu multipli în exterior de carton

Ambalaj interior: tăvi

de momeală de carton fibros, PVC, PS, PET/PE, PP sau PE cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Momeală liberă ambalată în tăvi de momeală din PP sau PE cu capac lipit prin căldură (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g or 60g). Tăvile sunt împachetate în stații de momeală din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. Toate sunt împachetate cu multipli de 1/2/4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de

momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Plicuri de ceai de 1, 2 sau 3 x 15 g fixate pe o bară de metal fixă în stații de momeală rezistente la manipulari pentru #obolani din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Cutii de #obolani multipli în pachet:
30 g – 96, 120, 144
45 g – 60, 72, 96, 120
60 g – 48, 60, 72, 96
90 g – 32, 48, 60, 72
120 g – 32, 48, 60, 72
180 g – 16, 24, 32, 48

Plicuri de ceai de 1, 2, 3, 4 sau 5 x 10 g fixate pe o bară de metal fixă în stații de momeală rezistente la manipulari pentru

#obolani din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: Plicuri de ceai în sta#ii de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

10 g –250
20 g – 125, 144
30 g – 96, 120, 144
40 g – 72, 96, 120, 144
50 g – 60, 72, 96, 120, 144
60 g – 48, 60, 72, 96, 120
80 g – 32, 48, 60, 72, 96
90 g – 32, 48, 60, 72, 96
100 g – 32, 48, 60, 72, 96
120 g – 24, 32, 48, 60, 72
150 g – 24, 32, 48, 60, 72
160 g – 16, 24, 32, 48, 60, 72
200 g – 16, 24, 32, 48, 60

4.7.1. Instruc#iuni specifice de utilizare

- Îndepărta#i produsul rămas la sfâr#itul perioadei de tratament.
- Atunci când este disponibil, urmări#i orice instruc#iune adi#ională furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

[Acolo unde este relevant] Plasa#i momeala pasta cu un aplicator suficient de lung (saputla) pentru a reduce expunerea mâinii - evita#i introducerea mâinilor în găleată.

[Acolo unde este relevant] Specifica#i cum trebuie cură#at echipamentul (spatula) #i cum poate fi evitat contactul cu reziduurile de momeală.

Executa#i un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate #i o evaluare la fa#a locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate #i de a determina probabilă cauză #i extindere a infesta#iei.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrat[al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă #i acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Dacă politica sau legisla#ia na#ională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare #i secundare de către anticoagulant, precum #i indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispozi#ie dealungul momelilor.

Dacă este folosit pentru momelire în impulsuri:

- Înlocui#i momeala consumată doar după 3 zile #i după acesta la intervale de maxim 7 zile. Colecta#i orice momeală vărsată #i rozătoarele moarte.
- Acolo unde este disponibil, urmări#i instruc#iunile specifice furnizate de codul de bună practică aplicabilă la nivel na#ional.

4.7.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control.

Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților rodenticide.

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.7.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stăile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa.

4.7.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.7.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.8. Descrierea utilizării

Tabel 8. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – exterior în jurul clădirilor

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: altele: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: șoarece de casă și/sau șobolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în exterior În exterior în jurul clădirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală |

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală sau stații de momeală rezistente la manipulări.</p> |
| <p>Rata (ratele) și frecvența de aplicare</p> | <p>Frecvența de aplicare: Pentru oareci utilizați 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distanțe de 2 - 5 metri în stații de momeală rezistente la manipulări sunt puncte de momeală acoperite. Pentru obolani utilizați 1 - 4 plicuri x 15 g sau 1 - 5 plicuri de 12 g sau 1-6 plicuri de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite.</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare: Pentru oareci folosiți 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) la distanțe de 2 - 5 metri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixați 1 plic (12 g sau 15 g) sau 1 - 2 plicuri (10 g) în stații de momeală rezistente la manipulări sau în puncte de momeală acoperite la distanțe de 5 metri (2 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde oarecile sunt active. Pentru obolani folosiți 1 - 4 plicuri de 15 g sau 1 - 5 plicuri de 12 g sau 1 - 6 plicuri de 10 g la distanțe de 5 - 10 metri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixați plicurile în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri (5 metri în zone cu infestație înaltă) acolo unde obolanii sunt activi. Momeală direct în vizuină: 1 - 6 plicuri (10 g) sau 1 - 5 plicuri (12 g) sau 1 - 4 plicuri (15 g) de momeală pe vizuină</p> |
| <p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p> | <p>profesioniști instruiți</p> |
| <p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p> | <p>Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg. Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile din hârtie ambalate în containere exterioare din PE/PP (cuve sau găleți)</p> <p style="text-align: right;">Ambalaj interior: plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: cuve sau găleți din PE PP 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală de 10, 12 sau 15 g ambalată individual în plicuri de ceai comestibile în carton exterior capturat cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton</p> <p>Ambalaj interior: Plicuri de ceai din hârtie</p> <p>Ambalaj exterior: carton exterior capturat cu PE sau carton sau pungi PE în cutii de carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> |

Ambalaj interior: Plicuri de ceai în stații de momeală din HDPE sau PP

Ambalaj exterior: exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Cutii de #obolani multipli în pachet:

10 g – 250
20 g – 125, 144
30 g – 96, 120, 144
40 g – 72, 96, 120, 144
50 g – 60, 72, 96, 120, 144
60 g – 48, 60, 72, 96, 120
80 g – 32, 48, 60, 72, 96
90 g – 32, 48, 60, 72, 96
100 g – 32, 48, 60, 72, 96
120 g – 24, 32, 48, 60, 72
150 g – 24, 32, 48, 60, 72
160 g – 16, 24, 32, 48, 60, 72
200 g – 16, 24, 32, 48, 60

4.8.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zonele care nu sunt predispuse inundațiilor.

Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament (Nu se aplică acolo, unde este autorizată în mod explicit conform anexei 4).

Dacă este utilizat pentru momelire în impulsuri: - Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maxim 7 zile. Colectați orice momeală vărsată și rozătoarele moarte. Atunci când este disponibil, urmăriți instrucțiunile specifice furnizate de codul de bună practică aplicabilă la nivel național. Pentru utilizare în aer liber, punctele de momeală trebuie acoperite și plasate în locuri strategice pentru a minimaliza expunerea la speciile neșintă. Atunci, când este disponibil, urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată codul de cea mai bună practică relevantă.

Atunci când este folosit în vizuini: Momeala trebuie plasată așa încât să minimalizeze expunerea la speciile neșintă și copiii. Acoperiți sau blocați intrarea vizuinilor momelite pentru a reduce riscul ca momeală să fie respinsă sau vărsată.

Executați un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Acolo unde este relevant, plasați momeala cu un aplicator suficient de îndelungat (spatula) pentru a reduce expunerea mâinii - evitați introducerea mâinilor în găleată.

Acolo unde este relevant, specificați cum trebuie curățat echipamentul (de exemplu spatula) și cum poate fi evitată contactul cu reziduurile momelii.

Protejați momeala de la condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasați stațiile de momeală în locuri care nu sunt predispuse inundațiilor.

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.

4.8.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control.

Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților rodenticide.

Când este utilizat în vizuini: Momeala trebuie plasată în așa fel, încât să minimalizeze expunerea la speciile neintâlnite de copii. Acoperiți sau blocați intrările vizuinilor momelite pentru a reduce riscul ca momeala să fie respinsă sau vărsată.

Portați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.8.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelii cu apa este evitată.

4.8.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.8.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.9. Descrierea utilizării

Tabel 9. Șobolani – profesioniști instruiți – sisteme de canalizare

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant pentru rodenticide. |

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | altele: Other Sisteme de canalizare. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a fi ancorat sau aplicat direct în stații de momeală care previn momeala să intre în contact cu apa de canalizare. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: În sistemul de canalizare, plasași blocuri de 200 g - 300 g la fiecare 30 -50 metri (niciodată mai mult decât 300 g la fiecare gaură de canalizare).. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: În sistemul de canalizare, plasași 200 - 300 g de momeală la fiecare 30 - 50 metri (niciodată mai mult decât 300 g la fiecare gaură de canalizare). |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesioniști instruiți |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Mărimea minimă de ambalaj este de 2,5 kg. Până la 25 kg saci multistrat de hârtie cu barieră de umiditate din PE sau saci multistrat de hârtie cu sac separat interior din PE sau saci #esute cu sac intern separat din PE sau saci #esute din PP fără căptușeală. Ambalaj interior: - Ambalaj exterior: Saci hârtie, PP, PE, 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 4,5kg, 5kg, 10kg, 20kg Plicuri de 15,20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleși sau pungi) Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, Al/PE sau hârtie/AL/PE Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleși sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: Carton căptușit cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. |

Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE, în exterior de carton fibros/carton.
Ambalaj interior: Plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE
Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi)

Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Momeală în carton căptu#it cu PE Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg.

Pachetul este restric#ionat la saci împachetate separat cu mărime maximă a sacului de 10 kg.

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci)v #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi cu capac lipit prin căldură împachetate cu multipli în carton exterior

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: carton exterior Multiplii

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu un capac lipit prin căldură în sta#ii de momeală din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, împachetate în multipli de 1,2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior de poli cu capac de carton.
Ambalaj interior: Tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: sta#ii de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multiplii

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90g – 32, 48, 60, 72, 96 100g – 32, 48, 60, 72, 96 120g – 24, 32, 48, 60, 72 200g – 16, 24, 32, 48, 60 240g – 16, 24, 32, 48, 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.9.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

În sistemul de canalizare plasa#i 200 - 300 g de momeală la fiecare 30 - 50 metri (niciodată mai mult decât 300 g în fiecare gaură de canalizare).

Fixa#i plicurile la structurile disponibile pentru a asigura că nu sunt luate de apă. Verifica#i regulat consumul de momeală #i înlocui#i momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repeta#i tratamentul în situa#ii acolo unde există dovada unei noi infesta#ii.

Momeala trebuie aplicată în a#a fel încât să nu intre în contact cu apa#i să nu fie luată de apa.

Urmări#i orice instruc#iune adi#ională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executa#i un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate #i o evaluare la fa#a locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate #i de a determina probabilă cauză #i extindere a infesta#iei.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă #i acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Dacă politica sau legisla#ia na#ională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare #i secundare de către anticoagulant, precum #i indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispozi#ie dealungul momelilor.

4.9.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă politica na#ională sau legisla#ia o cer, plasa#i momeala doar în sistemele de canalizare care nu sunt conectate la o sta#ie de epurarea a apelor uzate.

Purta#i mănu#i de protec#i rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu utiliza#i acest produs ca momeală permanentă pentru prevenire infesta#iei de rozătoare sau monitorizarea activită#iilor de rozătoare.

4.9.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasa#i punctele de momeală în apropierea apelor de suprafa#a (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de iriga#ie) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigura#i că momeala nu intră în contact cu apa.

4.9.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.9.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

None

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți și urmăriți informația de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau care este furnizat la punctul de vânzare, înainte de utilizare.

Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu dopurile, îndepărtați mâncarea și băutura potențială cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și de a reduce probabilitatea reinveziei.

Înainte de folosirea produselor rodenticide, trebuie luate în considerare metodele de control nechimice (de exemplu capcane).

Îndepărtați mâncarea care este gata disponibil pentru rozătoare (de exemplu grâu vărsat sau deșeurile alimentare). În afara de acesta să nu curățați zona infestată doar înainte de tratament, pentru că acesta doar o să-l deranjeze populația de rozătoare și momeala va fi mai greu acceptată.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (doar cele ambalate în plicuri, nu și momeala liberă).

Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată.

Acolo, unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri.

Nu plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare unde pot intra în contact cu apa.

Plasați stațiile de momeală departe de mâncare, băutură și furaje animale, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

Plasați stațiile de momeală la lacouri inaccesibile pentru copii, păsări, animale domestice și alte animale neîntâ.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării a produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea acestui produs.

Profesioniștii și profesioniștii instruiți: Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul de momeală nu se oprește, și nu se observă un declin în activitatea de rozătoare, atunci trebuie determinate cauzele probabile. Acolo unde alte elemente au fost excluse, este posibil ca există rozătoare rezistente, deci luați în considerare utilizarea unui rodenticid ne-coagulant, acolo unde este disponibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [Metoda de eliminare trebuie descrisă specificat în SPC-ul național și să fie reflectată pe eticheta produsului].

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin atât de frecvent, cât de frecvent stațiile de momeală sunt inspectate.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate până la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar, că produsul nu trebuie vândut publicului general (de exemplu "doar pentru profesioniști").

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști instruiți:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar că produsul trebuie vândut doar profesioniștilor instruiți care dețin certificat doveditor de conformitate cu cerințele de instruire aplicabile (de exemplu „doar pentru profesioniști instruiți”).

Profesioniștii: Să nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști:] Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator despre campania de control al rozătoarelor.

Profesioniști instruiți:

Să nu spălați stațiile de momeală sau ustensilele utilizate în punctele de momeală acoperite și protejate cu apă între aplicații.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști instruiți:] Nu rotați utilizarea anticoagulanților diferiți cu potențial comparabil sau mai slab pentru obiective de control rezistenței. Pentru uz rotațional, luați în considerare utilizarea unui rodenticid necoagulant, dacă este disponibil sau un anticoagulant mai puternic.

Profesioniști instruiți :

Nu utilizați în locuri unde rezistența substanței active poate fi suspectată.

Nu rotați utilizarea anticoagulanților diferiți cu potențial comparabil sau mai slab pentru obiective de control rezistenței. Pentru uz rotațional, luați în considerare utilizarea unui rodenticid necoagulant, dacă este disponibil sau un anticoagulant mai puternic.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea vânătăi sau sânge în excremente sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de expunere: Expunere dermală, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

Expunerea ochilor, clătiți ochii cu lichid de clătire a ochilor sau apă, păstrați pleoapele deschise pentru cel puțin 10 minute.

Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu dați niciodată nimic prin gură unei persoane inconștiente.

Nu provocați vomă. Dacă este înghițit, cereți ajutor medical și arătați-le containerul și eticheta produsului.

Dacă este înghițit de un animal de companie contactați un medic veterinar.

Stațiile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau numărul de autorizație"; "substanțe active" și "în caz de accident, sunați numărul Centrului Național de Informare Toxicologică (01) 809 2166".

Periculos animalelor sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Purtarea mănușilor este recomandat.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Valabilitate: 24 luni

Păstra#i într-un loc uscat, răcoros #i bine ventila. #ine#i ambalajul închis #i departe de lumina directă a soarelui. Păstra#i în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, #i animale de fermă.
Păstra#i doar în containerul original.

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor anticoagulant poate lua 4 - 10 zile de a deveni eficienți după consumarea momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și unelte ca clește când îndepărtați pe ele.

Acest produs conține o substanță amară și un colorant. This product contains a bittering agent and a dye.