

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Autan® Tropical rychleschnoucí sprej

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0011627-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0011627-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	3
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Autan® Tropical rychleschnoucí sprej
OFF!® Tropical rychleschnoucí sprej
Autan® Active rychleschnoucí sprej
Autan® Protection Plus rychleschnoucí sprej
OFF!® Protection Plus rychleschnoucí sprej
Diffusil® repelent Dry spray
OFF!® Multi insect rychleschnoucí sprej
Autan® Multi insect rychleschnoucí sprej
Autan® Sport rychleschnoucí sprej
OFF!® Sport rychleschnoucí sprej
OFF!® rychleschnoucí sprej
OFF!® proti klíšťatům rychleschnoucí sprej
Diffusil® proti klíšťatům rychleschnoucí sprej

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	S.C. Johnson s.r.o.
	Adresa	Radlicka 519-16 150 00 Praha 5 Česká republika
Číslo povolení	CZ-0011627-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0011627-0000	
Datum udělení povolení	20/02/2017	
Datum skončení platnosti povolení	20/02/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Adresa výrobce	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko
Umístění výrobních závodů	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
Název výrobce	Vertellus Performance Materials Inc
Adresa výrobce	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy
Umístění výrobních závodů	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.
Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
Odstraňte obsah /obal podle místních předpisů.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Neprofesionální použití

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

VII.2 Ochrana zdraví
Repelentní sprej na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Culicidae:
Obecný název: komáři
Vývojové stadium: Dospělci

Latinský název: Ixodidae:
Obecný název: klíšťata
Vývojové stadium: Dospělci

Oblast použití	<p>Vnitřní</p> <p>Venkovní</p> <p>IV.1 Použití v interiérech (dobře větrané prostory)</p> <p>IV.2 Použití v exteriérech</p>
Metoda(y) aplikace	<p>Metoda: Stříkání</p> <p>Podrobný popis:</p> <p>Repelent proti komárům a klíšťatům. Až osm hodin po použití odpuzuje běžné, tropické a tygří komáry, kteří mohou přenášet malárii, žlutou zimnici, horečku dengue a západonilskou horečku.</p> <p>Odpuzuje klíšťata až 8 hodin po použití.</p> <p>Odpuzuje mnoho druhů komárů.</p>
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	<p>Míra aplikace: 1g výrobku na 645 cm²</p> <p>Ředění (%): 100</p> <p>Počet a načasování aplikace:</p> <p>Neaplikujte vícekrát než 1x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání.</p>
Kategorie uživatelů	Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	100 ml ocelová aerosolová nádobka pokovená cínem

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím dobře protřepejte.
Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namířte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu asi 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech:

Dospělí: Ruce, obličej, krk, předloktí a horní část chodidel.

Děti starší 2 let včetně: Obličej, krk, horní část chodidel.

Nepoužívejte pro děti mladší 2 let.

Při použití na obličej: nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte, vyhněte se očím a ústům.

Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let.

Nepoužívejte pod oblečením.

Nevdechujte aerosoly.

Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou.

Používejte pouze v exteriérech nebo v dobře větraných prostorách.

Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.
Je určený na neprofesionální použití.
Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.
Vyhýbejte se kontaktu s očima a ústy.
U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.
V důsledku ochrany zdraví směte výrobek nanášet max. 1x denně.
Nepoužívejte u dětí do 2 let.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Pokyny pro první pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem.

Nevylévejte do kanalizace.

Prázdný obal znovu nepoužívejte.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Chraňte před mrazem.

Skladujte v původním obalu.

Maximální doba skladování 2 roky.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Viz. povolená použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz. povolená použití .

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz. povolená použití .

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz. povolená použití .

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz. povolená použití .

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.