

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

MURIBROM FRESH BAIT

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2019/0164/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-00158

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0016659-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	MURIBROM FRESH BAIT
--------------------------------	---------------------

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	QUIMICA DE MUNGUIA S.A.
	Adresă	DERIO BIDEA 51 48100 MUNGUIA Spania
Numărul autorizației		RO/2019/0164/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-00158
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0016659-0000
Data autorizației		30/10/2013
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	QUIMICA DE MUNGUIA, S.A
Adresa producătorului	Calle Derio Bidea, 51 48100 Munguía, Vizcaya Spania
Adresa locurilor de producție	Calle Derio Bidea, 51 48100 Munguía, Vizcaya Spania

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromadiolone
Denumirea producătorului	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
Adresa producătorului	C/ Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	C/ Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

XX Altele: Ready-to-use: paste

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H360D: Poate dăuna fătului. H372: Provoacă leziuni ale organelor (blood în caz de expunere prelungită sau repetată ..
Fraze de precauție	P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P264: Spălați-vă .. bine după utilizare. P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Aruncați conținutul la as a hazardous waste to a registered establishment or undertaking, in accordance with current regulations.. P501: Aruncați recipientul la as a hazardous waste to a registered establishment or undertaking, in accordance with current regulations..

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Utilizarea # 1 – Șoareci de casă și/sau șobolani maronii – specialiști instruiți – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevantă pentru rozătoare
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: tineri
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosire pentru a fi folosită în capcane etan#e
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii cu momeală cu 100-200 g per punct de momire; #oareci: cutii cu momeală cu 60-100 g per punct de momire Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Șobolani: cutii cu momeală cu 100-200 g per punct de momire până la 200g de produs folosind: - saci de 20 gr 1 tava de 160 gr sau 2 de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g până la 100g de produs folosind: - saci de 10,15, 20 gr 1 tava de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g Șoareci: cutii cu momeală cu 60-100 g per punct de momire

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Dimensiunea minimă a pachetului de 3 kg. Numărul de pungi ambalate per pachet: până la 25Kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: plicuri individuale de 10, 15, 20gr.</p> <p>Material de ambalare: Sacii de 10,15 #i 20g în sacii de hârtie Kraft, pungi de plastic (PE sau PP), cutii din carton sau din plastic (HDPE) #i cupe de până la 25kg. Tuburi din plastic (HDPE, PE sau PP) de 300g cu pistol aplicator în cutii de carton de până la 10 unită#i. Tăvi din plastic (HDPE, PE or PP) pre-umplut de 80g în cutii de carton de până la 50 de unită#i. Tăvi de plastic (HDPE, PE or PP) de 160g în cutii de carton de până la 25 de unită#i.</p>

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărta#i produsul rămas la sfâr#itul perioadei de tratament.
- Respecta#i instruc#iunile suplimentare prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Acolo unde este posibil, înainte de tratament, informa#i orice persoane din zonă (de ex. utilizatori din zona tratată #i din împrejurimi) despre campania privind controlul rozătoarelor [în conformitate cu codul aplicabil al bunelor practici, dacă este cazul].
- #ine#i seamă de măsurile preventive de control (de ex. guri de evacuare, duce#i alimentele #i băuturile cât mai departe) pentru a spori aportul de produse #i pentru a reduce posibilitatea de invazie.
- Pentru a reduce riscul unei intoxica#ii secundare, căuta#i #i elimina#i rozătoarele moarte pe durata tratamentului la intervale frecvente, respectând recomandările prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.
- Nu folosi#i produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infesta#iei cu rozătoare sau pentru monitorizarea activită#ii rozătoarelor.
- Nu folosi#i produsul în tratamente folosite drept momeală.
- Acest produs va fi folosit doar în interior #i în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor sau a animalelor nevizate.

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când se plasează puncte de momire în apropierea sistemelor de evacuare a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Utilizarea # 2- Șoareci și/sau șobolani – specialiști instruiți – în exteriorul și în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevantă pentru rozătoare
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adulți Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adulți Denumirea științifică: Mus musculus

	Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: tineri
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior în exteriorul #i în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosire pentru a fi folosită în capcane etan#e
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: #obolani: cutii cu momeală cu 100-200 g per punct de momire; #oareci: cutii cu momeală cu 60-100 g per punct de momire Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: #obolani: cutii cu momeală cu 100-200 g per punct de momire până la 200g de produs folosind: - saci de 20 gr 1 tava de 160 gr sau 2 de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g până la 100g de produs folosind: - saci de 10,15, 20 gr 1 tava de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g #oareci: cutii cu momeală cu 60-100 g per punct de momire
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a pachetului de 3 kg. Numărul de pungi ambalate per pachet: până la 25Kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: plicuri individuale de 10, 15, 20gr. Material de ambalare: Saci de 10,15 #i 20g în saci de hârtie Kraft, pungi de plastic (PE sau PP), cutii din carton sau din plastic (HDPE) #i cupe de până la 25kg. Tuburi din plastic (HDPE), PE sau PP de 300g cu pistol aplicator în cutii de carton de până la 10 unită#i. Tăvi din plastic (HDPE, PE or PP) pre-umplut de 80g în cutii de carton de până la 50 de unită#i. Tăvi de plastic (HDPE, PE or PP) de 160g în cutii de carton de până la 25 de unită#i.

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momire în zone care nu sunt predispuse inundațiilor.
- Înlocuiți momeala din punctele de momire în care momeala s-a deteriorat prin contactul cu apa sau în care a fost contaminată de mizerie.
- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.
- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Acolo unde este posibil, înainte de tratament, informați orice persoane din zonă (de ex. utilizatori din zona tratată și din împrejurimi) despre campania privind controlul rozătoarelor.
- Puneți seamă de măsurile preventive de control (de ex. guri de evacuare, duceți alimentele și băuturile cât mai departe) pentru a spori aportul de produse și pentru a reduce posibilitatea de invazie.
- Pentru a reduce riscul unei intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte pe durata tratamentului la intervale frecvente, respectând recomandările prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.
 - Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestației cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
 - Nu folosiți produsul în tratamente folosite drept momeală.
 - Nu aplicați produsul direct în vizuine.

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Când se pune momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, anuri de irigare) sau în sisteme de drenare a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Utilizarea # 3 – Șobolani maronii – specialiști instruiți – Zone deschise în exterior & gropi de gunoi

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevantă pentru rozătoare
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adul#i Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior Zone deschise în exterior & gropi de gunoi
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosire pentru a fi folosită în capcane etan#e
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: Rats: bait boxes with 100-200g per baiting point Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Șobolani: cutii cu momeală cu 100 -200 g per punct de momire până la 200g de produs folosind: - saci de 20 gr 1 tava de 160 gr sau 2 de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g până la 100g de produs folosind: - saci de 10,15, 20 gr 1 tava de 80 gr Tub cu pistol aplicator de 300g
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Dimensiunea minimă a pachetului de 3 kg . Numărul de pungi ambalate per pachet: până la 25Kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: plicuri individuale de 10, 15, 20gr.

Material de ambalare:

Saci de 10,15 și 20g în saci de hârtie Kraft, pungi de plastic (PE sau PP), cutii din carton sau din plastic (HDPE) și cupe de până la 25kg.

Tuburi din plastic (HDPE, PE sau PP) de 300g cu pistol aplicator în cutii de carton de până la 10 unități.

Tăvi din plastic (HDPE, PE or PP) pre-umplut de 80g în cutii de carton de până la 50 de unități.

Tăvi din plastic (HDPE, PE or PP) pre-umplut de 160g în cutii de carton de până la 25 de unități.

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momire în zone care nu sunt predispuse inundării.
- Înlocuiți momeala din punctele de momire în care momeala s-a deteriorat prin contactul cu apa sau în care a fost contaminată de mizerie.
- Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.
- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Acolo unde este posibil, înainte de tratament, informați orice persoane din zonă (de ex. utilizatori din zona tratată și din împrejurimi) despre campania privind controlul rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul unei intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte pe durata tratamentului la intervale frecvente, respectând recomandările prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.
- Nu folosiți produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestației cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu folosiți produsul în tratamente folosite drept momeală.
- Nu aplicați produsul direct în vizuine.

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când se pune momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de apă, diguri, anuri de irigare) sau în sisteme de drenare a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Utilizare # 4 Șobolani maronii – specialiști instruiți – canale

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevantă pentru rozătoare
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adulți Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: tineri
Domeniul (domeniile) de utilizare	altele: Other canale
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: Momeala gata de folosire va fi prinsă sau aplicată în capcane care împiedică momeala să intre în contact cu apa reziduală.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Șobolani: 100-200 g per gură de canal. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Șobolani: 100-200 g per gură de canal. Până la 200g de produs folosind: - Blocuri de 20, 25, 30, 50, 100, 150 și 100g. Până la 100g de produs folosind:

	- Blocuri de 10, 15, 20, 25, 30, 50 și 100g.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Dimensiunea minimă a pachetului de 3 kg. Numărul de pungi ambalate per pachet: până la 25Kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: blocuri de ceară de 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 și 100g.</p> <p>Material de ambalare: blocurile sunt livrate în pungi de polietilenă sau polipropilenă, cutii de carton, găleți HDPE și/sau saci de hârtie Kraft</p>

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Momeala trebuie aplicată astfel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie luată de apă.
- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Puneți momeala doar în sistemele de canalizare care au legătură cu instalația de tratare a canalizării.
- Nu folosiți acest produs în tratamente pentru momeală

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea Instrucțiunile de utilizare

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Citiți și respectați informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul sau care sunt prevăzute în punctul de vânzare înainte de utilizare.

- Realizați un sondaj al zonei infestată înainte de a pune momeala și o evaluare la locație pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile pe unde umblă și pentru a stabili cauza posibilă și dimensiunea infestării.

- Îndepărtați alimentele care se află la îndemâna rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau deșeuri de alimente). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru nu va face decât să deranjeze populația de rozătoare, care va accepta cu dificultate momeala.

- Produsul trebuie folosit doar ca parte din sistemul de gestionare integrată a dăunătorilor (GID), inclusiv, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

- Produsul trebuie plasat în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost explorată anterior (de ex. căi de deplasare, cuiburi, locuri unde își găsesc hrană, găuri, vizuine etc.).

- Acolo unde este posibil, capcanele trebuie puse pe pământ sau pe alte structuri.

- Capcanele trebuie etichetate vizibil pentru a arăta că ele conțin rodenticide și că nu trebuie mișcate sau deschise (*vezi secțiunea 5.3 pentru a ști care sunt informațiile ce trebuie indicate pe etichetă*).

- Atunci când produsul se folosește în spații publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata perioadei de tratament printr-o notificare ce explică riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, și trebuie precizate primele măsuri ce trebuie luate în caz de intoxicație, care trebuie să fie menționate lângă momeală.

- Momeala trebuie fixată astfel încât să nu poată fi trasă afară din capcană.

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și de fermă și a altor animale nevizitate.

- Țineți produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

- Purtați mănuși de protecție rezistente la contactul cu produse chimice în faza de manipulare a produsului (materialul din care sunt făcute mănușile trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Acolo unde este cazul, specificați orice alte echipamente de protecție personală (de ex. ochelari sau mască) necesare atunci când se manipulează produsul]

- Când folosiți produsul, nu consumați alimente, băutură și nu fumați. Spălați mâinile și ielea expusă direct după ce folosiți produsul.

- Frecvența vizitelor în zona tratată trebuie să fie la discreția operatorului, în contextul sondajului realizat la inițierea tratamentului. Respectiva frecvență trebuie să respecte recomandările prevăzute de codul relevant al celor mai bune practici.

- Dacă aportul de momeală este redus în legătură cu dimensiunea aparentă a infestației, luați în considerare plasarea capcanelor în alte locuri și posibilitatea de a schimba formula momelii.

- Dacă, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momeala continuă să fie consumată și nu se observă diminuarea activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. În situația în care au fost excluse alte elemente, este posibil să fie o specie de rozătoare foarte rezistentă, așa că luați în considerare folosirea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este cazul, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați de asemenea în considerare folosirea unor capcane drept măsură alternativă de control.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

Nu deschideți plicul care conține momeala.

Puneți momeala în pastă cu un aplicator suficient de lung (spatulă) pentru a reduce expunerea mâinilor - evitați să atingeți recipientul.

Specificați modul în care echipamentul trebuie curățat (spatulă) și modul de evitare a contactului cu deeurile de momeală.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Acolo unde este posibil, înainte de tratament, informați orice persoane din apropiere cu privire la campania de control al rozătoarelor.

- Informațiile despre produs (de ex. etichetă și/sau broșură) vor specifica foarte clar faptul că produsul va fi furnizat doar utilizatorilor profesioniști instruiți titulari ai unei certificări ce demonstrează conformitatea cu cerințele de instruire aplicabile (de ex. "doar pentru specialiști instruiți").

- Nu folosiți în zone unde se suspectează rezistență la substanțele active.

- Pr o dusele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a statului de infestare și a eficienței tratamentului.

- Nu utilizați prin rotație diferiți ant icoagu l a nși cu putere comparabilă sau mai mică în scopul gestionării rezistenței. În scopul utilizării prin rotație, luați în vedere folosirea unui ne-ant icoag u lant r o d e n t i c i d, dacă este cazul, sau a unui ant icoagu lan t mai puternic.

- Nu spălați capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite sau protejate între aplicații.

- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [*Metoda de eliminare va fi descrisă în mod specific în condițiile naționale de protecție a sănătății și va fi menționată pe eticheta produsului*].

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot avea efect întârziat, pot include hemoragii nazale și sângerări gingivale. În cazuri grave, pot apărea contuzii și pot exista urme de sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată doar de personal medical/veterinar.

- În caz de:

• Expunere a dermei, spălați pielea inițial cu apă și apoi cu apă și săpun.

• Expunere a ochilor, verificați întotdeauna și scoateți lentilele de contact, clătiți ochii cu lichid sau apă, șiineți pleoapele deschise timp de 10 minute.

• Expunere orală, clătiți cu grijă gura cu apă. Nu administrați niciodată ceva pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. Dacă înghițiți, cereți imediat sfatul medicului și arătați containerul sau eticheta produsului [inserați informațiile specifice #ării]. Contactați un chirurg veterinar în cazul în care este înghițit de un animal [inserați informațiile specifice #ării]

- Capcanele trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "denumirea produsului sau numărul autorizației"; "substanța(substanțele) active" și "în caz de incident, apelați o unitate medicală de dezintoxicare [introduceți numărul de telefon național]"

- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale [Metoda de aruncare va fi descrisă în mod specific în Condițiile naționale de protecție a sănătății și va fi menționată pe eticheta produsului].

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- Depozitați la loc uscat, răcoros și bine ventilat. Țineți containerul închis și feriți-l de lumina soarelui.
- Depozitați în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a animalelor de fermă.
- Valabilitate la raft: 2 ani

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Din cauza modului întârziat de acționare, rodenticidele anticoagulante pot necesita între 4 și 10 zile pentru a face efectul după consumarea efectivă a momelii.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna neprotejată, folosiți mănuși sau unelte, cum ar fi clești, atunci când le eliminați.

- Acest produs conține un compus amar și vopsea.