



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/18-12/54
URBROJ: 534-07-1-1-3/1-19-3
Zagreb, 7. siječnja 2019.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **RUBIS BLOC / BLOC DF / RACAN BLOC DF**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Biocidni proizvod može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć.

V. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

VI. Ovo rješenje važi do **30.04.2023.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Irske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda pod imenom za tržište Republike Hrvatske **RUBIS BLOC / BLOC DF / RACAN BLOC DF**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Biocidni proizvod može se za opću uporabu prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 30.04.2023. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. **LODI S.A.S., Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska**
2. Arhiva



MINISTAR

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

RUBIS BLOC / BLOC DF / RACAN BLOC DF
Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/18-12/54; URBROJ: 534-07-1-1-3/1-19-3

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0020068-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	RUBIS BLOC BLOC DF RACAN BLOC DF
-----------------	--

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activites des Quatre Routes, Grand Fougeray, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/18-12/54	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0020068-0000	
Datum odobrenja	7.1.2019.	
Datum isteka odobrenja	30.04.2023.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Lodi SAS
Adresa proizvođača	Parc d'activités des quatre routes, 35390 Grand Fougeray Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Lodi SAS, Parc d'activités des quatre routes, 35390 Grand Fougeray Francuska Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers, 35390 GRAND FOUGERAY Francuska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Difenakum
Naziv proizvođača	PelGar International Ltd.
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Pražska, 280 02 Kolin Češka

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-07-5	259-978-4	0.005

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H373 Može uzrokovati oštećenje organa krv tijekom produljene ili ponavljane izloženosti . H360D Može naškoditi nerođenom djetetu.
Oznake obavijesti	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P280 Nositi zaštitne rukavice. P308+313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti pomoć liječnika. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti spremnik u/na mjesto predviđeno za sakupljanje opasnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim odredbama.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – osposobljeni profesionalni korisnici - kućni miš i/ili štakor - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> kućni miš odrasle i male jedinke <i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i malde jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac spreman za uporabu koji se koristi u kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja
Količine kod primjene i učestalost	suzbijanje štakora - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara; suzbijanje kućnih miševa - jaka infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 3 metra - blaga infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - 0 štakor - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara

	kućni miš - jaka infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 3 metra - blaga infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP (20-30 g) ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu Kanta (PE or PP) : -20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg -30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Nepakiran u pojedinačnu vrećicu: Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg. Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti preostali proizvod na kraju razdoblja tretiranja.
Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.
Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
U cilju sprečavanja sekundarnih otrovanja, tijekom trajanja postupka deratizacije često treba potražiti i ukloniti uginule glodavce, u skladu s preporukama iz odgovarajućeg kodeksa najbolje prakse.
- Ne koristiti proizvod kod povremene primjene mamaca (u pulsnom tretmanu).

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije s mamcem postavljaju blizu sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – osposobljeni profesionalni korisnici - miševi i/ili štakori – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle ili mlade jedinke <i>Mus musculus</i> kućni miš odrasle ili mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac spreman za uporabu koji se koristi u kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja - Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca - Izravna primjena mamca u jazbine
Količine kod primjene i učestalost	suzbijanje štakora - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara; suzbijanje kućnih miševa - jaka infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 3 metra - blaga infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - štakor - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara kućni miš - jaka infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 3 metra - blaga infestacija: 20-30 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP (20-30 g) ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu Kanta (PE or PP) : -20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg -30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Nepakiran u pojedinačnu vrećicu: Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećicom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg. Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštititi mamac od nepovoljnih atmosferskih uvjeta (npr. kiša, snijeg itd.). Kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti.

Ukloniti preostali proizvod pri kraju razdoblja tretiranja.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta. - Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

U slučaju postavljanja mamca u jazbine: mamci moraju biti postavljeni na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanji na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba prekriti ili blokirati kako bi se spriječilo odbacivanje ili prosipanje mamaca.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

U cilju sprečavanja sekundarnih otrovanja, tijekom trajanja postupka deratizacije često treba potražiti i ukloniti uginule glodavce, u skladu s preporukama iz odgovarajućeg kodeksa najbolje prakse.

Ne koristiti pripravak u tretmanu s pulsним (faznim) režimom.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada su mjesta postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeke, ribnjaci, kanali za vodu, brane, kanali za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba izbjegavati dodir mamca s vodom

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – osposobljeni profesionalni korisnici - štakori – vanjska otvorena područja i odlagališta otpada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke

Područje primjene	na otvorenom Vanjska otvorena područja Vanjska odlagališta otpada
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja - Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca - Izravna primjena u jazbine
Količine kod primjene i učestalost	suzbijanje štakora - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara - 0 štakor - jaka infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara - blaga infestacija: 90-100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP (20-30 g) ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu Kanta (PE or PP) : -20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg -30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Nepakiran u pojedinačnu vrećicu: Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg. Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštiti mamac od nepovoljnih atmosferskih uvjeta (npr. kiša, snijeg itd.). Kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti.

Ukloniti preostali proizvod pri kraju razdoblja tretiranja.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta. - Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

U slučaju postavljanja mamca u jazbine: mamci moraju biti postavljeni na način da se izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanji na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba prekriti ili blokirati kako bi se spriječilo izvlačenje ili prosipanje mamaca.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

U cilju sprečavanja sekundarnih otrovanja, tijekom trajanja postupka deratizacije često treba potražiti i ukloniti uginule glodavce, u skladu s preporukama iz odgovarajućeg kodeksa najbolje prakse.

Ne koristite proizvod kao trajne mamce za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Ne primjenjivati u tretmanima s pulsним (faznim) režimom.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada su mjesta postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeke, ribnjaci, kanali za vodu, brane, kanali za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba izbjegavati dodir mamca s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – osposobljeni profesionalni korisnici - štakori – kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	Kanalizacija
Načini primjene	primjena mamaca Gotovi mamci koji se moraju učvrstiti ili primijeniti u zaštitnim kutijama za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama. Pokrivena i zaštićena mjesta postavljanja mamaca
Količine kod primjene i učestalost	100 g mamca po mjestu postavljanja - suzbijanje štakora: 100 g mamca po mjestu postavljanja Redovito provjeravati potrošnju mamaca i nadopuniti pojedene ili prosute mamce novima, sve dok konzumacija ne prestane. Ponoviti tretman u situacijama kada se utvrdi postojanje nove infestacije.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Mamac od 100 g nepakiran u unutarnju vrećicu (s kukom) Kanta (PE or PP) :</p> <p>-100 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p>-30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg</p> <p>Kartonska kutija (s unutarnjom vrećom od PE): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja od 5 kg.</p>
--	--

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamci se moraju primijeniti na način da ne dođu u dodir s vodom i budu odneseni.
[Ako je moguće] Slijediti dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

[Ako to zahtijeva nacionalni propis ili praksa] Mamce postavljati samo u kanalizacijske sustave koji su povezani s uređajem za obradu otpadnih voda.
Ne primjenjivati u pulsnom režimu.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba br. 5 – profesionalni korisnici - kućni miševi – u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> kućni miševi odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	primjena mamaca Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja

Količine kod primjene i učestalost	20-30 g mamca po mjestu postavljanja. - 20-30 g mamca po mjestu postavljanja. Ako je potrebno kutije s mamcem postaviti na više mjesta, najmanja udaljenost među njima treba biti 3 metra. U slučaju blage infestacije razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu: 20-30 g Kanta (PE or PP) : - 20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg - 30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Nepakiran u pojedinačnu vrećicu: Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg. Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem oštećene te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

- [Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije s mamcem postavlja blizu sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Uporaba br. 6 – profesionalni korisnici - štakori - u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja
Količine kod primjene i učestalost	90-100 g mamca po mjestu postavljanja. - 90-100 g mamca po mjestu postavljanja. Ako je potrebno kutije s mamcem postaviti na više mjesta, najmanja udaljenost među njima treba biti 5 metara. U slučaju blage infestacije razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP (20-30 g) ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu Kanta (PE or PP) : -20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg -30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Nepakiran u pojedinačnu vrećicu 20-30-g: Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećicom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg. Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svakih 5 do 7 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem oštećene te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

- [Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije s mamcem postavlja blizu sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Uporaba br. 7 – profesionalni korisnici – kućni miševi i/ili štakori – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> smeđi štakor odrasle i mlade jedinke <i>Mus musculus</i> kućni miševi odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	primjena mamaca Mamac spreman za uporabu koji se koristi u zaštitnim kutijama za mamce koje su osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	miševi: 20-30 g po mjestu postavljanja; štakori: 90-100 g po mjestu postavljanja. - miševi: 20-30 g po mjestu postavljanja; štakori: 90-100 g po mjestu postavljanja Ako je potrebno kutije s mamcem postaviti na više mjesta, najmanja udaljenost među njima treba biti 3 metra (miševi) ili 5 metara (štakori). U slučaju blage infestacije razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 m (miševi) ili 10 metara (štakori).
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod se pakira u unutarnju pojedinačnu vrećicu PE ili PP (20-30 g) ili je nepakiran u pojedinačnu vrećicu Kanta (PE or PP) : -20 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg -30 g: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg Kutija za mamac (PP, PVC,PS) u kutiji od 5 kg Kartonska kutija: 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg

	<p>Nepakiran u pojedinačnu vrećicu 20-30 g:</p> <p>Kartonska kutija (s unutarnjom PE vrećom): 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5 kg, 7 kg, 7.5 kg, 8 kg, 8.5 kg, 9 kg, 9.5 kg, 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja: 5 kg.</p>
--	---

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštititi mamac od nepovoljnih atmosferskih uvjeta (npr. kiša, snijeg itd.). Kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana (miševi) ili 5 - 7 dana (štakori) u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem oštećene te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti.

- [Ako je moguće] Slijedite dodatne upute navedene u relevantnom kodeksu najbolje prakse.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ne primjenjivati ovaj proizvod izravno u jazbine.

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije s mamcem postavlja u blizinu površinskih voda (na primjer rijeka, jezera, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt vode i mamca.

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Profesionalni korisnici

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetocinima (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (na primjer putovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, rupa, jazbina itd.).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju premještati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3 SPCa).

Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označena tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Ako je količina pojedenog mamca relativno mala u odnosu na opseg infestacije, treba razmisliti o premještanju kutija s mamcima na dalja mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.

Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zamki kao alternativne mjere kontrole.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

Ne otvarati unutarnje vrećice u koje su zapakirani mamci.

Osposobljeni profesionalni korisnici

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (putovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, rupa, jazbina itd.).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju premještati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3 SPCa).

Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

O učestalosti posjeta tretiranom području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene, što bi trebalo biti usklađeno s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najbolje prakse.

Ako je količina pojedenog mamca relativno mala u odnosu na opseg infestacije, treba razmisliti o premještanju kutija s mamcima na druga mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.

Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost

glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zamki kao alternativne mjere kontrole.

Ne otvarati unutarnje vrećice u koje su zapakirani mamci.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dvaput tjedno).

Proizvod se ne smije koristiti više od 35 dana bez procjene stanja infestacije i učinkovitosti tretmana.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu (odnosno naljepnica i/ili uputa) treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod nije namijenjen općoj javnosti (pr. „samo za profesionalce”).
- proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja (pr. „koristite samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja”),
- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označite u skladu s preporukama za proizvod”).

Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj.

Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).

Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Osposobljeni profesionalni korisnici

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) trebaju sadržavati upozorenje da pripravak mogu nabaviti samo kvalificirani profesionalni korisnici koji posjeduju certifikat koji potvrđuje sukladnost s odgovarajućim zahtjevima izobrazbe (npr. "samo za osposobljene profesionalce").

Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.

Proizvod se ne smije upotrebljavati više od 35 dana bez procjene brojnosti populacije i učinkovitosti primjene.

Ne primjenjivati naizmjenično antikoagulante istog načina djelovanja ili slabije učinkovitosti radi upravljanja rezistencijom.

Za naizmjeničnu uporabu razmotriti uporabu ne-antikoagulantnih rodenticida, ako su dostupni, ili snažnijeg antikoagulansa.

Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posude koje se upotrebljavalo na pokrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu, odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta pripravka s očima: treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.

U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinaru.

Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu s Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

Preporučuje se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Držati samo u izvornom spremniku.

Rok uporabe: 24 mjeseca.

6. OSTALE INFORMACIJE

Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana da počnu djelovati.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.

Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.