



Bratislava, 24. septembra 2018
Naša značka: 20370/2018-3052-49463
Ref. číslo: bio/1859/O/18/RP

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-DG014625-55 žiadateľa LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francúzsko zo dňa 23. 12. 2014 o obnovu autorizácie číslo 2012/838/1171/SK/AMR/8897 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

obnovuje autorizáciu biocídneho výrobku

Názov biocídneho výrobku:

JADE BLOCK

Číslo autorizácie biocídneho výrobku:

SK13-MRS-002

Platnosť autorizácie do:

25. apríl 2023

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. IE/BPA 70524 platnej do 25. 4. 2023 vydanej príslušným orgánom referenčného členského štátu Írsko dňa 25. 4. 2018,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/234/O/13/R/2 zo dňa 15. 2. 2013 v znení rozhodnutia č. bio/484/O/16/RM o predĺžení platnosti a nahradza ho týmto rozhodnutím o obnovu autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/234/O/13/R/2 zo dňa 15. 2. 2013 v znení rozhodnutia č. bio/484/O/16/RM o predĺžení platnosti pod pôvodným autorizačným číslom 2012/838/1171/SK/AMR/8897 na trhu do 19. 2. 2019 a ich použitie do 19. 7. 2019 za podmienky, že výrobok je klasifikovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1179.

O dôvod n e :

Žiadateľ LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francúzsko doručením žiadosti číslo BC-DG014625-55 zo dňa 23. 12. 2014 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelennej vzájomným uznáním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie 2012/838/1171/SK/AMR/8897.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Írsko v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 25. 4. 2018 pod číslom IE/BPA 70524 s platnosťou do 25. 4. 2023.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Na základe toho MH SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristik biocidného výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocidného výrobku v súlade s čl. 69 nariadenia o biocídnych výrobkoch a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s čl. 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Toto rozhodnutie o obnove autorizácie biocidného výrobku ruší a nahradza predchádzajúce rozhodnutie o autorizácii č. bio/234/O/13/R/2 zo dňa 15. 2. 2013 v znení rozhodnutia č. bio/484/O/16/RM o predĺžení platnosti.

Ked'že pri obnove autorizácie došlo k zmene čísla autorizácie, MH SR zároveň v súlade s článkom 52 nariadenia o biocídnych výrobkoch stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocidných výrobkov pod pôvodným autorizačným číslom 2012/838/1171/SK/AMR/8897 na trhu do 24. 2. 2019 a ich použitie do 24. 7. 2019 za podmienky, že výrobok je klasifikovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1179.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocidného zákona MH SR vyberá ročné platby za biocidne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Ak ročná platba za biocidny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocidne výrobky. Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocidných výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami čl. 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokial' ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocidných výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocidného výrobku.

P o u č e n i e :

Podľa čl. 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocidne výrobky (R4BP) považuje za oznamenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznamenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky



Doručiť: LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francúzsko

Príloha 1

Bratislava, 24. septembra 2018
Naša značka: 20370/2018-3052-49463
Ref. číslo: bio/1859/O/18/RP

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

Názov výrobku	JADE BLOCK																			
1. Administratívne informácie																				
1.1. Obchodné názvy výrobku																				
Oblasti trhu	Slovensko																			
Obchodné názvy	JADE BLOCK																			
1.2. Držiteľ autorizácie	Názov	LODI S.A.S.																		
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francúzsko																		
Číslo autorizácie	SK13-MRS-002																			
R4BP žiadosť o obnovu č.	BC-DG014625-55																			
Dátum rozhodnutia o obnove	24. septembra 2018																			
Dátum skončenia platnosti autorizácie	26. apríla 2023																			
1.3. Výrobcu výrobku																				
Názov výrobcu	Compagnie Générale des Biocides (CGB)																			
Adresa výrobcu	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Francúzsko																			
Miesto výrobných priestorov	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Francúzsko																			
1.4. Výrobcu účinnej látky																				
Názov látky	Bromadiolón																			
Názov výrobcu	PELGAR																			
Adresa výrobcu	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR, Hampshire Spojené kráľovstvo																			
Miesto výrobných priestorov	Pražská 10 280 02 Kolín Česká republika																			
2. Zloženie a úprava výrobku																				
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku																				
BAS	EC	CAS	Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Obsah (%)														
12	249-205-9	28772-56-7	Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	účinná látka	0,005														
Typ úpravy			Návada na okamžité použitie																	

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	
<i>Výstražné upozornenia</i>	H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H360D Môže poškodiť nenarodene dieťa.
<i>Bezpečnostné upozornenia</i>	P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými predpismi. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia P260 Nevdychujte prach. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah v súlade s vnútrostátnymi predpismi.

4. Autorizované použitia	
4.1. Myš domová – profesionál – vnútorné priestory	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Nerelevantné pre rodenticídy
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štadia)</i>	Myš domová (<i>Mus musculus</i>) – dospelé a mladé jedince
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	20-30 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 2 – 5 metrov v závislosti od zamorenia.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20),

	<p>9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)</p> <p>30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená):</p> <p>20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250*20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)</p> <p>30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v kartónovej škatuľi obsahujúca každá jeden blok 20 g alebo 30 g :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.5 kg (125*20 g) alebo (84*30 g) - 3 kg (150*20 g) alebo (100*30 g) - 4 kg (200*20 g) alebo (134*30 g) - 5 kg (250*20 g) alebo (167*30 g)
--	--

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vnútorné, vnútorné priestory
Kategória používateľov	Profesionáli

<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štátia)</i>	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	60-100 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov pri vysokom zamorení a 10 metrov pri nízkom zamorení.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	<p>Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené</p> <p>Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená): 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v kartónovej škatuli: 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 60 g: 3*20 g alebo 2*30 g; 90 g: 3*30 g; 100 g: 5*20 g</p>
<i>4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i>	Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hľadavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.
<i>4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i>	

-
4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-
4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

4.3. Myš domová a/alebo potkan hnedý – profesionál – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vonkajšie, vonku okolo budov
Kategória používateľov	Profesionáli
Cielové organizmy (vrátane vývojového štadia)	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince Myš domová (<i>Mus musculus</i>) – dospelé a mladé jedince
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady
Opis spôsobu aplikácie	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie	Myši: 20-30 g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 60-100 g návnady na deratizačnú staničku.
Riedenie	
Časový rozvrh	20-30 g (pre myši) a 60-100 g (pre potkany) návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť pre myši 2 m (veľké zamorenie) – 5 m (nízke zamorenie) a pre potkany 5 m (veľké zamorenie) – 10 m (nízke zamorenie).
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)

	<p>Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená):</p> <p>20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20)</p> <p>30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v kartónovej škatuli: 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg</p> <p>60 g: 3*20 g (*odstrániť 2) alebo 2*30 g (*odstrániť 1);</p> <p>90 g: 3*30 g (*odstrániť 2);</p> <p>100 g: 5*20 g (*odstrániť 4)</p> <p>(*Ak je produkt určený na použitie proti myšiam, odstráňte zodpovedajúci počet blokov)</p>
--	--

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky sa majú prezeráť [v prípade myší – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.3.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

4.4. Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vnútorné, vnútorné priestory
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince Myš domová (<i>Mus musculus</i>) – dospelé a mladé jedince
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady

<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	<p>Myši: Veľké zamorenie: 20-30 g návnady každé 2 metre. Nízke zamorenie: 20-30 g návnady každých 5 metrov.</p> <p>Potkany: Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov.</p> <p>Trvalé umiestnenie návnady: Myši: Veľké zamorenie: 20-30 g návnady každé 2 metre. Nízke zamorenie: 20-30 g návnady každých 5 metrov.</p> <p>Potkany: Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov.</p>
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	<p>Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené</p> <p>Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená): 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p>
	Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v

	kartónovej škatuli: 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 60 g: 3*20 g (*odstrániť 2) alebo 2*30 g (*odstrániť 1); 90 g: 3*30 g (*odstrániť 2); 100 g: 5*20 g (*odstrániť 4) (*Ak je produkt určený na použitie proti myšiam, odstráňte zodpovedajúci počet blokov)
--	--

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Trvalé umiestnenie návnady:

Ked' to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Trvalé umiestnenie návnady:

Trvalé umiestnenie návnad je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opäťovnej invázie, ked' sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opäťovné zamorenie.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

4.5. Myši a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vonkajšie, vonku okolo budov
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Potkan hnédý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince Myš domová (<i>Mus musculus</i>) – dospelé a mladé jedince
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady
Opis spôsobu aplikácie	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
Dávkovanie a časový rozvrh	Myši:

	<p>Veľké zamorenie: 20-30 g návnady každé 2 metre. Nízke zamorenie: 20-30 g návnady každých 5 metrov. Potkany: Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov. V brloch: 60-100 g návnady na brloh.</p> <p>Trvalé umiestnenie návnady: Myši: Veľké zamorenie: 20-30 g návnady každé 2 metre. Nízke zamorenie: 20-30 g návnady každých 5 metrov. Potkany: Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov.</p>
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	<p>Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené</p> <p>Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená): 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30)</p> <p>Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v kartónovej škatuli: 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 60 g: 3*20 g (*odstrániť 2) alebo 2*30 g (*odstrániť 1); 90 g: 3*30 g (*odstrániť 2);</p>

	100 g; 5*20 g (*odstrániť 4) (*Ak je produkt určený na použitie proti myšiam, odstráňte zodpovedajúci počet blokov)
--	--

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminované nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Trvalé umiestnenie návnady:

Ked' to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia nerieľových druhov.

Pre použitie v brlochoch: Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia nerieľových druhov zvierat a detí. Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlochov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

4.5.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Trvalé umiestnenie návnady:

Trvalé umiestnenie návnad je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opäťovnej invázie, ked' sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opäťovné zamorenie.

V brlochoch:

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby deratizácií hlodavcov.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.6. Potkany – vyškolení profesionáli – vonkajšie otvorené oblasti a skládky odpadu

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vonkajšie otvorené oblasti a skládky odpadu
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Potkan hnedý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady

<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii . Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
<i>Dávkovanie a časový rozvrh</i>	Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov. V brlochoch: 60-100 g návnady na brloh. Trvalé umiestnenie návnady: Veľké zamorenie: 60-100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60-100 g návnady každých 10 metrov.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Návnady individuálne zabalené do PE alebo PP vrecúška po 20 g a 30 g alebo nezabalené Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg (150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30) Kartónová škatuľa (s vnútornou vložkou z PE ak je návnada rozbalená): 20 g: 2.5 kg (125*20), 3 kg(150*20), 3.5 kg (175*20), 4 kg (200*20), 4.5 kg (225*20), 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20), 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg (500*20) 30 g: 2.5 kg (84*30), 3 kg (100*30), 3.5 kg (117*30), 4 kg (134*30), 4.5 kg (150*30), 5 kg (167*30), 5.5 kg (184*30), 6 kg (200*30), 6.5 kg (217*30), 7 kg (234*30), 7.5 kg (250*30), 8 kg (267*30), 8.5 kg (284*30), 9 kg (300*30), 9.5 kg (347*30), 10 kg (334*30) Prednaplnená deratizačná stanička (z PP, PVC, PS) v kartónovej škatuli: 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 60 g: 3*20 g alebo 2*30 g; 90 g: 3*30 g; 100 g: 5*20 g

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminované nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Trvalé umiestnenie návnady:

Ked' to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

Pre použitie v brlohoch: Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí. Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najroziahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návad.

Trvalé umiestnenie návnady:

Trvalé umiestnenie návad je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opäťovnej invázie, ked' sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opäťovné zamorenie.

V brlohoch:

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby deratizácií hlodavcov.

4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a nádzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete návnady blízko povrchových vód (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.7. Potkany – vyškolení profesionáli – vonkajšie, kanalizácie

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy
Oblasti použitia	Vonkajšie, kanalizácie
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štátia)	Potkan hnédý (<i>Rattus norvegicus</i>) – dospelé a mladé jedince
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady
Opis spôsobu aplikácie	Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou.
Dávkovanie a časový rozvrh	200 – 300 g návnady každých 30 -50 metrov. Veľké zamorenie: 300 g návnady na šachtu.

	Nízke zamorenie: 200 g návnady na šachtu. Trvalé umiestnenie návnady: Veľké zamorenie: 60 - 100 g návnady každých 5 metrov. Nízke zamorenie: 60 - 100 g návnady každých 10 metrov.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 2.5 kg Množstvo návnady: 100 g s háčikom Obalové materiály: Vedro (PE alebo PP) : 100 g: 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100) Kartónová škatuľa s vnútornou vložkou z PE: 100 g: 2.5 kg (25*100), 3 kg (30*100), 3.5 kg (35*100), 4 kg (40*100), 4.5 kg (45*100), 5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)
<i>4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i>	Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Trvalé umiestnenie návnady - Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.
<i>4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i>	Umiestnite návnady len do stokových systémov, ktoré sú pripojené na čistiareň odpadových vôd. Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad. Trvalé umiestnenie návnad je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opäťovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné. Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opäťovné zamorenie.
<i>4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i>	Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.
<i>4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i>	-
<i>4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i>	-

5. Všeobecné pokyny na používanie

5.1. Pokyny na používanie

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a stáčí dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najroziahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Ked' to je možné, musia byť deratizačné staničky pripojené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Ked' sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom nosťe ochranné rukavice odolné voči chemickým látкам (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.

Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní nadľaž konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticidu.

Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Pokyny na použitie, ktoré sú špecifické pre danú návnadu: neotvárajte vrecká obsahujúce návnadu.

Vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a stáčí dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov

(napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Ked' to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Ked' sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných neriešových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom nosť ochranné rukavice odolné voči chemickým látкам (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hladavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu.

Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hladavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu.

Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hladavcov.

Návnada vo vreckách: v prípade nevyprázdniteľných vrečiek – neotvárajte vrecká, ktoré obsahujú návnadu.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Profesionáli

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezáčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hladavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hladavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantrých účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hladavcami alebo na monitorovanie činnosti hladavcov.

V informáciach o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- používateľia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hladavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciach o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hladavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hladavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Vyškolení profesionáli

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezáčastnené osoby o deratizácii hladavcov.

V informáciach o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnatelnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie.

Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mítve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí môžu symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňať krvácanie z nosa a krvácajúce d'asná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárny personálom.

V prípade:

- Dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.
- Zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.
- Orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku.

Ak výrobok prehltnie domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade incidentu zavolajte do Národného toxikologického informačného centra +421 2 54 774 166“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návratu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Odporuča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Uchovávajte iba v originálnej nádobe.

Doba použiteľnosti: 2 roky

6. Ďalšie informácie

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návraty.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látka a farbivo.

- koniec dokumentu -