

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Vertox 25 Pellet Bait

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2018/0066/MRA/IE/BPA 70536

Numărul curent R4BP 3: RO-0020552-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	25
5.1. Instrucțiuni de utilizare	25
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	26
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	26
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	26
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	27
6. Alte informații	27

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Prokum Pelet
Vertox Pelet
Vertox Pellet 25
Vertox Pellet Pro

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța
Numărul curent	RO/2018/0066/MRA/IE/BPA 70536	
Numărul curent R4BP 3	RO-0020552-0000	
Data autorizației	15/03/2023	
Data de expirare a autorizației	01/07/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
	Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, România
	Agrochema 675 02 Konesin Republica Cehă
	Sc Pest Control Expert Depozit Nr 99-101, Sector 1 Drumul Lapus România

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	11 - Brodifacum
Numele producatorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Prazska 54 280 02 Kolin Republica Cehă

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată..

Fraze de precauție

Nu inspirați praful.

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Șoareci de casă – public general – interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: Șoarece de casă
etapă de dezvoltare: Adulți și miinori

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliata:

Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șoareci până la 20 g în stații de momeală.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări.

Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecile sunt active. Șoarecile sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice

momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Cantitatea maximă de momeală pe pachet 50g
15, 20, 25, 30 sau 50 g plicuri de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
Plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în cutii exterioare de carton fibros/carton Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g, 150 g
Momeală liberă până la 20 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli în exterioare de carton.
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: carton exterior 10 g, 15 g, 20 g (ambalate cu multipli de 1/2/4 1/2/4)
Maximul permis 50g
Momeală liberă până la 20 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungii lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: stație de momeală ambalat în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g (ambalate cu multipli de 1/2/4)
Maximul permis 50 g

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci folosiți până la 20 g în stații de momeală. Fixați blocuri de 5 - 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone de infestație înaltă) în zone unde șoarecii sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau vărsată până la terminarea consumului. Repetați reatamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea momelii la fiecare 2-3 zile odată cu inspectarea sau reîncărcarea punctelor de momeală. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 - 3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar. Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și / sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control de dăunătoare.
Nu folosiți acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.
For mice use 5-20g of bait in tamper-resistant bait stations.
Secure 5-20g of bait in tamper-resistant bait stations spaced 5m apart (2m apart in areas of high infestation) in areas where mice are

active. Mice are very inquisitive and it may help the control program to move baits every 2-3 days at the time when bait points are inspected or topped up. Make frequent inspections of the bait points during the first 10-14 days and replace any bait eaten by rodents or that has been damaged by water or contaminated by dirt. If all the bait has been eaten from certain areas, increase the quantity of bait by placing more bait points. Do not increase the bait point size. Replace any bait eaten by rodents or that has been damaged by water or contaminated by dirt.

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary. Using this product should eliminate rodents within 35 days. The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly recommend that in case of suspected lack of efficacy by the end of the treatment (i.e. rodent activity is still observed), the user should seek advice from the product supplier or call a pest control service

Do not use this product for permanent or pulse-baiting.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Șobolani – public general – interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *Rattus norvegicus*
denumirea comună: Șobolan maro
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliata:
Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șobolani până la 60 g în stații de momeală.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:
Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare și acoperite la distanțe de 10 metri.
Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la 10 metri distanțe (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi. Verificați consumul de momeală în mod regulat și înlocuiți momeala consumată sau stricată.
Repetăți tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestări (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mișcați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu se observă activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de șobolani. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungă) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE
Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungă) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE
Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g
Momeală liberă de până la 60 g, ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură, împachetate cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalat cu multipli de 2/4/8/12/15)
Maximul permis 150 g
Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac ambalate în stații de momeală rezistente la manipulare din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: Stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4)
Maximul permis 150g

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați de la 10 g până la 60 g în stații de momeală la distanțe de 10 metri.
Fixați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi.
Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor.
Dacă nu este nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7 - 10 zile, mutați momeala într-un loc cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.
Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile după începutul perioadei de tratament și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați când este necesar.
Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate, până la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.
Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

None

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Șobolani – public general – exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	în aer liber În exterior în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală la distanțe de 10 metri (5 metri în cazul infestațiilor înalte) acolo unde șobolanii sunt activi. Verificați în mod regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezare. Dacă nu este niciun semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de rozătoare mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Momeală liberă de până la 60 g, ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură, împachetate cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g,25g, 50g, 60g (ambalat cu multiplii de

2/4/8/12/15)

Maximul permis 150 g

Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton

Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: Stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4)

Maximul permis 150g

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați de la 10 g până la 60 g în stații de momeală la distanțe de 10 metri.

Fixați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi.

Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor.

Dacă nu este nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7 - 10 zile, mutați momeala într-un loc cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.

Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile după începutul perioadei de tratament și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate, până la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Șoareci de casă – profesioniști – interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: Șoarece de casă etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șoareci folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecile sunt active. Șoarecile sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Mărime minimă de pachet 2,5 kg. Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac țesut din PP cu sac intern PE separat sau sac țesut PP fără sac intern. Ambalaj interio: -

ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în
pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau
hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg,
6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton
căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau
hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg
10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de
carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg
10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: N /A

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg,
6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg
10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani)
împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli
împachetate în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin
căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani)
ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de
momeală rezistente la manipulari din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile,
toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau
manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu
capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton
sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli
lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulari.
Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulari distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații)

înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar.

Urmăriți orice instrucțiuni adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată a sistemului de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și, acolo unde este posibil, metodele fizice de control.

Trebuie luat în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de folosit. În acele zone unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandat alternarea momeliilor conținând anticoagulanți diferiți.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când utilizați produsul în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în perioada de tratament și o notificare explicând riscurile primare și secundare al otrăvirii de către anticoagulant și indicând măsurile primare care trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie pus la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectată la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu utilizați momeli conținând ca substanță activă un anticoagulant, ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelii cu apă este evitată.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Șobolani – profesioniști – interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 10-60g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelei. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelei pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Mărime minimă de pachet 2,5 kg. Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac țesut din PP cu sac intern PE separat sau sac țesut PP fără sac intern. Ambalaj interior: - ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: N /A
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: exterior de carton Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală
Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde șobolani sunt activi.
Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii.
Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu ceșteți mărimea punctului de momeală. Schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar. Urmăriți orice instrucțiuni adiționale furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.
Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem integrat de gestionare al dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice de control.
Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovedea rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandată alternarea momelilor cu anticoagulanți diferiți.
Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este folosit în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notificare explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant precum și indicând măsurile primare care trebuie luate în cazul otrăvirii trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.
Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.
Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).
Nu utilizați momeli care conțin ca substanță activă anticoagulant ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității de rozătoare.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *Mus musculus* and/or *Rattus norvegicus*
denumirea comună: Șoareci de casă și/sau șobolan maro

etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

în aer liber

În exterior în jurul clădirilor.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șoareci folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări. pentru șobolani folosiți 10-60 g în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri.

Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelei. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelei pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărime minimă de pachet 2,5 kg.

Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac țesut din PP cu sac intern PE separat sau sac țesut PP fără sac intern.

Ambalaj interior: -

ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: N /A

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani)

împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton Multipli:

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și țoareci) și până la 60 g (doar șobolani)

ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli:

10g -250

15g - 250

20g - 125, 144

25g - 120, 144

30g - 96, 120, 144

40g - 72, 96, 120, 144

50g - 60, 72, 96, 120, 144

60g - 48, 60, 72, 96, 120

80g - 32, 48, 60, 72, 96

90g - 32, 48, 60, 72, 96

100g - 32, 48, 60, 72, 96

120g - 24, 32, 48, 60, 72

200g - 16, 24, 32, 48, 60

240g - 16, 24, 32, 48, 60

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctelor de momeală.

Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestații înalte) în zonele unde șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zonele care nu sunt predispuse inundațiilor. Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea momeliilor cu substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momeliilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor. Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu aplicați direct acest produs în vizuini.

Nu folosiți momeli care conțin ca substanțe active anticoagulanti ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, să vă asigurați că contactul momelii cu apa este evitată.

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
denumirea comună: Șoareci de casă și/sau șobolan maro
etapă de dezvoltare: Toate

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală

Descriere detaliată:

Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani folosiți 10-60 g momeală în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri.

Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelei. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelei pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea

punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărime minimă de pachet 2,5 kg.
Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac țesut din PP cu sac intern PE separat sau sac țesut PP fără sac intern.
Ambalaj interior: -
ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: N /A
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
Ambalaj exterior: exterior de carton Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală
Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctelor de momeală.

Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestații înalte) în zonele unde șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea momelilor cu substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă.

Dacă este folosit ca momeală în impulsuri: Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maxim 7 zile.

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control.

Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activităților rodenticide.

Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa.

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt

4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – în exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus and/or Rattus norvegicus denumirea comună: Șoarece de casă și/sau șobolan maro etapă de dezvoltare: Toate
Domeniul de utilizare	în aer liber În exterior în jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulare.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani folosiți 10-60 g momeală în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la

fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri.

Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelii pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Mărime minimă de pachet 2,5 kg.
Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac țesut din PP cu sac intern PE separat sau sac țesut PP fără sac intern.

Ambalaj interior: -
Ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/AL/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/AL/PE

Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) Ambalaj interior: N /A
Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungii) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior: -

Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau

manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală
Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctelor de momeală.

Pentru șobolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înaintea aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației țintă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea momeliilor cu substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momeliilor.

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasați stațiile de momeală în locuri care nu sunt predispuse la inundații.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă.

Dacă este folosit ca momeală în impulsuri: Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maxim 7 zile.

4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
When used in burrows: Baits must be placed to minimise the exposure to non-target species and children. Cover or block the entrances of baited burrows to reduce the risks of bait being rejected and spilled.
Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase (EN374).

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.
Purtați mănuși de protecție rezistenți la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelei cu apa este evitată.

4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Nu sunt.

4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți și urmăriți informația de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau care este furnizat la punctul de vânzare, înainte de utilizare.

Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu dopați găurile, îndepărtați mâncarea și băutura potențială cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și de a reduce probabilitatea reinveziei.

Înainte de folosirea produselor rodenticide, trebuie luate în considerare metodele de control nechimice (de exemplu capcane).

Îndepărtați mâncarea care este gata disponibil pentru rozătoare (de exemplu grâu vărsat sau deșeurii alimentare). În afara de acesta să nu curățați zona infestată doar înaintea tratamentului, pentru că acesta doar o să-l deranjeze populația de rozătoare și momeala va fi mai greu acceptată.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (Profioniști instruiți - Doar pentru plicuri negolabile).

Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată.

Acolo, unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri.

Nu plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare unde pot intra în contact cu apa.

Plasați stațiile de momeală departe de mâncare, băutura și furaje animale, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

Plasați stațiile de momeală la locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale domestice și alte animale neștate.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării a produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea acestui produs.

Profioniști și profesioniști instruiți: Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul de momeală nu se oprește, și nu se observă un declin în activitatea de rozătoare, atunci trebuie determinate cauzele probabile. Acolo unde alte elemente au fost excluse, este posibil ca există rozătoare rezistente, deci luați în considerare utilizarea unui rodenticid ne coagulant, acolo unde este disponibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

Profioniști și profesioniști instruiți: - Momeală liberă: Plasați momeala în stațiile de momeală folosind o unealtă de dozare.

Specificați metodele pentru a minimaliza praful (de exemplu ștergere umedă).

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Să nu folosiți produse care conțin brodifacoum ca momeală permanentă (de exemplu pentru prevenirea infestației de rozătoare sau pentru a detecta activitate de rozătoare).

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [Metoda de eliminare trebuie descrisă specificat în SPC-ul național și să fie reflectată pe eticheta produsului].

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin atât de frecvent, cât de frecvent stațiile de momeală sunt inspectate.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate până la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar, că produsul nu trebuie vândut publicului general (de exemplu "doar pentru profesioniști").

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști instruiți:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar că produsul trebuie vândut doar profesioniștilor instruiți care dețin certificat doveditor de conformitate cu cerințele de instruire aplicabile (de exemplu „doar pentru profesioniști instruiți”).

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea vânătăi sau sânge în excremente sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de expunere: Expunere dermală, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

Expunerea ochilor, clătiți ochii cu lichid de clătire a ochilor sau apă, păstrați pleoapele deschise pentru cel puțin 10 minute.

Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu dați niciodată nimic prin gură unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. Dacă este înghițit, cereți ajutor medical și arătați-le containerul și eticheta produsului.

Dacă este înghițit de un animal de companie contactați un medic veterinar.

Stațiile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau numărul de autorizație"; "substanțe active" și "în caz de accident, sunați numărul Centrului Național de Informare Toxicologică (01) 809 2166".

Periculos animalelor sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Purtarea mănușilor este recomandat.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Valabilitate: 24 luni Păstrați într-un loc uscat, răcoros și bine ventila. Țineți ambalajul închis și departe de lumina directă a soarelui. Păstrați în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, și animale de fermă.
Păstrați doar în containerul original.

6. Alte informații

Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor anticoagulant poate lua 4 - 10 zile de a deveni eficienți după consumarea momelei.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și unelte ca clește când îndepărtați pe ele.

Acest produs conține o substanță amară și un colorant.