

**FR**

***ANNEXE***

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

**STERI-PEROX 6%**

**Type(s) de produit**

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à  
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

**Numéro d'autorisation: 1-2**

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: EU-0031643-0002**

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	STERI-PEROX 6%
---------------------------------	----------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresse	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad autre: Netherlands
Numéro de l'autorisation		1-2
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		EU-0031643-0002
Date de l'autorisation		10/07/2024
Date d'expiration de l'autorisation		30/06/2034

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Veltek Associates, Inc.
Adresse du fabricant	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern États-Unis d'Amérique

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Peroxyde d'hydrogène
Nom du fabricant	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Adresse du fabricant	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena États-Unis d'Amérique

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		substance active	7722-84-1	231-765-0	6,4

### 2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence	<p>P264: Se laver le visage et les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter advice.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. 2.1 - Utilisation industrielle – Pulvérisation de liquide - En intérieur - Méta-RCP 2**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Pas de données Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: autre: Pas de données  Nom scientifique: autre: Pas de données Nom commun: autre: Levures Stade de développement: autre: Pas de données  Nom scientifique: autre: Pas de données Nom commun: autre: Champignons Stade de développement: autre: Pas de données
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Désinfectant pour les surfaces, matériaux et équipements inanimés, durs et non poreux qui ne sont pas utilisés pour un contact direct avec des aliments ou des aliments pour animaux. Ne pas utiliser dans les zones médicales. Désinfectant à utiliser dans des sites de production tels que les salles blanches des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 60 ml de produit par m <sup>2</sup>  Dilution (%): Le produit est prêt à l'emploi.  Nombre et fréquence des applications: Fréquence : 3 applications par jour. Temps de contact : 10 minutes (bactéries, levures), 20 minutes (champignons) Température d'utilisation : température ambiante
Catégorie(s) d'utilisateurs	industriels
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon de 473 ml (uniquement stérile). Flacon de 946 ml (uniquement stérile).  Le pulvérisateur à gâchette attachable est fourni séparément.  Matériaux d'emballage :

## Flacons

Les flacons sont en polyéthylène haute densité (opaque). Un pulvérisateur à main séparé possède un tube plongeant en polypropylène. Le bouchon du flacon et le scellé par induction sont en polypropylène. Les flacons et les pulvérisateurs en polyéthylène sont fournis séparément dans des emballages différents. Les pulvérisateurs ne sont pas connectés aux flacons. Les versions stériles sont conditionnées individuellement dans un double emballage thermoscellé. Un quadruple emballage est disponible en option. Les distributeurs vendent uniquement des cartons scellés, pas de récipients individuels.

### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

Nettoyer la surface avant application. Déballer et fixer la gâchette sur le flacon. Nettoyer la surface avant application. Orienter le pulvérisateur vers la surface à une distance de 15-20 cm. Humidifier soigneusement la surface avec le produit et laisser agir pendant au moins 10 minutes (usages bactéricide, levuricide), 20 minutes (fongicide). Laisser sécher la surface à l'air, ou si nécessaire sécher la surface avec une lingette ou un tissu stérile lorsque le temps de contact requis est écoulé.

### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

### **4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation

### **4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation

### **4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation

### **4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation

## **4.2. Description de l'utilisation**

**Tableau 2. 2.2 - Utilisation industrielle – Trempage dans le liquide – En intérieur – Méta-RCP 2**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: autre: Pas de données  Nom commun: autre: Bactéries  Stade de développement: autre: Pas de données</p> <p>Nom scientifique: autre: Pas de données  Nom commun: autre: Levures  Stade de développement: autre: Pas de données</p> <p>Nom scientifique: autre: Pas de données  Nom commun: autre: Champignons  Stade de développement: autre: Pas de données</p> <p>Nom scientifique: autre: Pas de données  Nom commun: autre: Spores bactériennes  Stade de développement: autre: Pas de données</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Nettoyer la surface avant application. Immerger l'article dans une bassine avec du produit et laisser agir pendant au moins 10 minutes (usages bactéricide et levuricide), 20 minutes (usage fongicide) ou 60 minutes (usage sporicide). Lorsque le temps de contact requis est écoulé, laisser sécher la surface à l'air, ou si nécessaire sécher la surface avec une lingette ou un tissu stérile. N'utiliser le bain de trempage qu'une seule fois.</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: autre: Trempage</p> <p>Description détaillée: -</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: -</p> <p>Dilution (%): Le produit est prêt à l'emploi.</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Fréquence : 3 applications par jour.  Temps de contact : 10 minutes (bactéries, levures), 20 minutes (champignons), 60 minutes (spores)  Température d'utilisation : température ambiante</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	industriels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Flacons :</p> <p>Flacon de 473 ml (uniquement stérile)  Flacon de 946 ml (uniquement stérile).</p> <p>Les flacons sont en polyéthylène haute densité (opaque).  Le bouchon du flacon et le scellé par induction sont en</p>

	<p>polypropylène. Les versions stériles sont conditionnées individuellement dans un double emballage thermoscellé. Un quadruple emballage est disponible en option.</p> <p>3,79 litres (stérile et non stérile)</p> <p>Récipients en polyéthylène haute densité (opaque) avec anse de transport moulée et petit bec verseur moulé avec bouchon à visser près du bord supérieur. Le bouchon à visser en polypropylène avec revêtement couvre le bec verseur. Le scellé par induction est en polypropylène. Tous les bouchons de flacon sont de type à visser et réutilisables.</p> <p>Les distributeurs vendent uniquement des cartons scellés, pas de récipients individuels. Les versions stériles sont conditionnées individuellement dans un double emballage thermoscellé. Un quadruple emballage est disponible en option.</p> <p>Fût :</p> <p>200 litres (uniquement stérile)</p> <p>Polyéthylène haute densité (opaque). Col moulé par soufflage, fermé. Anneau supérieur moulé, intégral. Protégé par double emballage et film thermo-rétractable.</p> <p>Pour une distribution sécurisée après ouverture, le fût de 200 litres est muni d'un bouchon à visser en polypropylène saillant de 5 cm sur la face supérieure avec tube plongeant unidirectionnel attaché à un tuyau en caoutchouc Santoprene® 73A FDA de 0,95 cm de long à connecter à une pompe doseuse péristaltique sans contact produit au choix du client (non fournie). La pompe et le tuyau restent attachés et prêts à la distribution durant toute la période d'utilisation. Aucun raccord n'est disponible pour reverser du produit dans le fût.</p>
--	---

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Nettoyer la surface avant application. Immerger l'article dans une bassine avec du produit et laisser agir pendant au moins 10 minutes (usages bactéricide et levuricide), 20 minutes (usage fongicide) ou 60 minutes (usage sporicide). Lorsque le temps de contact requis est écoulé, laisser sécher la surface à l'air, ou si nécessaire sécher la surface avec une lingette ou un tissu stérile. N'utiliser le bain de trempage qu'une seule fois.

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

#### 4.2.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation

---

**4.2.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation

**4.2.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation

**4.2.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation

---

## **Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

Utiliser avec une ventilation adéquate et loin des yeux et du visage.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

Lors de l'application, seul l'utilisateur du produit peut être présent dans la pièce.

Pendant l'application et lors du retour dans la zone traitée, les concentrations de peroxyde d'hydrogène dans l'air ne doivent pas dépasser la limite d'inhalation AEC (concentration d'exposition acceptable) de 1,25 mg/m<sup>3</sup> (ou une valeur de référence nationale pertinente inférieure). Un capteur calibré doit être utilisé pour garantir que les concentrations de peroxyde d'hydrogène dans l'air ne sont pas dépassées.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**EN CAS D'INGESTION :** Rincer la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver la peau à l'eau. En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**EN CAS D'INHALATION :** En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Empêcher toute entrée dans le réseau d'égout ou de distribution d'eau. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux publiques.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Recommandations pour l'élimination des déchets : Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales. Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l'emballage hermétiquement entre deux utilisations pour conserver l'humidité.

Stocker dans le récipient d'origine. Protéger du gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Durée de conservation = 2 ans

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

Nom commercial : STERI-PEROX® 6%