

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: Tri-Fender

Grupa produktowa: Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Numer pozwolenia: PL/2019/0422/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0012645-0001

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	1
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	2
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	2
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	7
5.1. Instrukcje stosowania	7
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	7
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	8
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	8
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	8
6. Inne informacje	8

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

Tri-Fender

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	DeLaval NV
	Adres	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia
Numer pozwolenia	PL/2019/0422/MR/BPF 1-1	

Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0012645-0001
Data udzielenia pozwolenia	16/10/2019
Data ważności pozwolenia	01/08/2029

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji czynnej	DeLaval NV
Adres producenta substancji czynnej	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	1319 - Jod
Nazwa producenta substancji czynnej	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adres producenta substancji czynnej	SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Chile

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		0
Natrium iodide			7681-82-5	231-679-3	0,12

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

<ul style="list-style-type: none"> • płyn, gotowy do użycia na bazie wody (META ChPB1- 4 oraz META ChPB 6-7)

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - 4.1. Zastosowanie 1: Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą zanurzania ręcznego przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	Gr. 03 - Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	brak
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: bakterie Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: drożdże Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: wirusy Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: -
Obszar zastosowania	Wewnątrz Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju
Sposób (-oby) nanoszenia	Ręczna metoda zanurzania przy użyciu kubka zanurzeniowego - Do stosowania po udoju. Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (2 razy dziennie). Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji. Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu: <ul style="list-style-type: none">• krowy: 5 ml/zwierzę• owce: 2,5 ml/zwierzę• kozy: 2,5 ml/zwierzę
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	- - - - -
Kategoria (-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<ul style="list-style-type: none">• Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L,• Beczka (HDPE) o pojemności 200 L,• IBC (HDPE) o pojemności 1000 L.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem.
- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas udoju i aplikacji produktu w celu ochrony skóry oraz zapewnienia higienicznych warunków dojenia.
- Do aplikacji produktu używać czystego kubka zanurzeniowego.

- Przed zastosowaniem produktu, należy wyczyścić i osuszyć wymię i strzyki.
- Natychmiast po udoju zanurzyć każdy strzyk w produkcie. Upewnić się, że produkt pokrył co najmniej 3/4 długości strzyku. W razie potrzeby uzupełnić kubek zanurzeniowy świeżym roztworem w wymaganej ilości.
- Dopilnować aby produkt nie został usunięty przez co najmniej 5 minut po aplikacji (np. utrzymując zwierzę w pozycji stojącej).

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą ręcznego rozpylania przy użyciu rozpylacza przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

brak

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: bakterie
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: drożdże
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: wirusy
Nazwa zwyczajowa: -
Etap rozwoju: -

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju.

Sposób (-oby) nanoszenia	<p>Ręczne rozpylanie przy użyciu rozpylacza - Do stosowania po udoju. Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (2 razy dziennie). Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji. Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krowy: 5 ml/zwierzę • owce: 2,5 ml/zwierzę • kozy: 2,5 ml/zwierzę
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	<p>--- -</p>
Kategoria (-e) użytkowników	<p>Profesjonalny</p>
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<ul style="list-style-type: none"> • Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L, • Beczka (HDPE) o pojemności 200 L, • IBC (HDPE) o pojemności 1000 L.

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem.
- Do aplikacji produktu używać czystego rozpylacza.
- Przed zastosowaniem produktu, należy wyczyścić i osuszyć wymię i strzyki.
- Natychmiast po udoju zaaplikować produkt na każdy strzyk:
 - o rozpylacz ręczny: należy rozpylać produkt na każdy strzyk przez co najmniej 1 sekundę. Upewnić się, że produkt pokrył co najmniej 3/4 długości strzyku. W razie potrzeby uzupełnić rozpylacz świeżym roztworem w wymaganej ilości.
 - o rozpylacz automatyczny: należy rozpylać produkt na każdy strzyk przez co najmniej 1 sekundę.
- Dopilnować aby produkt nie został usunięty przez co najmniej 5 minut po aplikacji (np. utrzymując zwierzę w pozycji stojącej).

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- W trakcie stosowania produktu nosić chemicznie odporne rękawice ochronne (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału)

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.3 Opis użycia

Zastosowanie 3 - Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych: Poudojowa dezynfekcja strzyków metodą automatycznego zanurzania lub rozpylania przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	Gr. 03 - Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	brak
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: bakterie Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: drożdże Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: - Nazwa naukowa: wirusy Nazwa zwyczajowa: - Etap rozwoju: -
Obszar zastosowania	Wewnątrz Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych (krowy mleczne, owce, kozy) do zastosowania po udoju
Sposób (-oby) nanoszenia	Automatyczne zanurzanie lub rozpylanie przy użyciu robota - -
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	----- Do stosowania po udoju. Produkt gotowy do użycia stosować po udoju (3 razy dziennie). Produkt można używać przez cały rok w okresie laktacji. Ilość produktu stosowanego w ciągu jednego zabiegu: <ul style="list-style-type: none">• krowy: 5 ml/zwierzę• owce: 2,5 ml/zwierzę• kozy: 2,5 ml/zwierzę
Kategoria (-e) użytkowników	Profesjonalny <ul style="list-style-type: none">• Puszka (HDPE) o pojemności 5 L; 10 L; 20 L; 60 L,

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- Beczka (HDPE) o pojemności 200 L,
- IBC (HDPE) o pojemności 1000 L.

4.3.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej.
- Produkt należy ogrzać do temperatury powyżej 20°C przed zastosowaniem

4.3.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.3.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.3.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

patrz sekcja 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Jeśli wymagana jest dezynfekcja zarówno przed jak i po udoju, to do dezynfekcji wykonywanej przed udojem należy użyć innego środka, który nie zawiera jodu

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane: Brak innych niż wynikają z klasyfikacji produktu.

Pierwsza pomoc:

Narażenie przez kontakt z oczami: Natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli po przemyciu objawy nadal występują, należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Narażenie przez kontakt ze skórą: Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem po uprzednim usunięciu zanieczyszczonej odzieży i obuwia.

Narażenie przez drogi pokarmowe: Wypłukać usta wodą. W przypadku wystąpienia objawów lub spożycia dużej ilości produktu należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Narażenie przez drogi oddechowe: Należy wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze.

Środki ochrony środowiska:

- Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji.
- W przypadku rozlania lub wycieku należy zebrać produkt w celu bezpiecznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (np. ręczniki papierowe) oraz pozostałości niezużytego produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

- Zużyty produkt można usuwać do systemu ścieków komunalnych lub do gnojowni, w zależności od lokalnych przepisów.
- Unikać przedostania się do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do środowiska.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w temperaturze poniżej 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze poniżej 30°C.

6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia
Aquatic Chronic 3
Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze
Nie dotyczy