

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: TOXIRAT BRODY FORTE

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2019/0160/MRA/ IT/2014/00179/AUT

Numărul curent R4BP 3: RO-0014407-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	7
5.1. Instrucțiuni de utilizare	7
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	11
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	13
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	14
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	15
6. Alte informații	15

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

TOXIRAT BRODY FORTE

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Laboratorios Agrochem S.L.
	Adresa	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Spania
Numărul curent	RO/2019/0160/MRA/ IT/2014/00179/AUT	
Numărul curent R4BP 3	RO-0014407-0000	
Data autorizației	05/02/2014	
Data de expirare a autorizației	01/07/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C/ Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Spania
Adresa locurilor de producție	C/ Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Spania
Numele producatorului	SC AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT L.T.D.
Adresa producătorului	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200. 127258 Judet Buzau România
Adresa locurilor de producție	Sat Pitulicea, Comuna Godeanu Sarat, Pitulicea, nr. 200. 127258 Judet Buzau România

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	11 - Brodifacum
Numele producătorului	Dr. Tezza s.r.l.
Adresa producătorului	Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia
Adresa locurilor de producție	Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.
Purtați mănuși de protecție.
ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Șobolani / șoareci - în și în jurul clădirilor - NON-PROFESIONAL

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Rattus norvegicus
denumirea comună: șobolanul brun
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Rattus norvegicus
denumirea comună: Brown rat
etapă de dezvoltare: Minori

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: Minori

denumirea științifică: Rattus rattus
denumirea comună: Roof rat
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Rattus rattus
denumirea comună: Roof rat
etapă de dezvoltare: Minori

Domeniul de utilizare

de interior

Other

În interiorul și în jurul clădirilor pentru uz privat.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:

	<p>Momeala proaspătă este amplasată manual în stații de momeală rezistente la manipulare, corelată cu eticheta și care se află în zona de infestare a rozătoarelor.</p>
<p>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</p>	<p>Frecvența de aplicare: Șobolani: 3-5 puncte de momeală cu 60-100g de momeală la fiecare 100mp / șoareci: 2 puncte de momeală cu 40g de momeală la fiecare 100 mp Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>dozele:</p> <p>Șobolani: 3-5 puncte de momeală cu 60-100g de momeală la fiecare 100mp Șoareci: 2 puncte de momeală cu 40g de momeală la fiecare 100 mp</p> <p>Înlocuiți momeala consumată la fiecare 2-3 zile.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Pastă de momeală în plicuri de 20g livrate în cutii de 40, 60, 100, 160, 200, 260 și 500g</p>

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Stația de momeală trebuie vizitată cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stația de momeli este intactă și pentru a îndepărta corpurile de rozătoare. Reaplicați momeala când este necesar.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Șobolani și șoareci - interior și exterior - Profesioniști și profesioniști instruiți

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: șobolanul brun etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: șobolanul brun etapă de dezvoltare: Minori</p> <p>denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: șoarecele de casă etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: șoarecele de casă etapă de dezvoltare: Minori</p> <p>denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat</p>

	etapă de dezvoltare: Minori
Domeniul de utilizare	de interior în aer liber Other În interiorul și în jurul clădirilor și pentru uz privat.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeala proaspătă este amplasată manual în stația de momeală rezistentă la manipulare, corelată cu eticheta și care se află în zona de infestare a rozătoarelor.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Șobolani: 3-5 puncte de momeală cu 60-100g de momeală la fiecare 100mp / șoareci: 2 puncte de momeală cu 40g de momeală la fiecare 100 mp Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: dozele: Șobolani: 3-5 puncte de momeală cu 60-100g de momeală la fiecare 100mp Șoareci: 2 puncte de momeală cu 40g de momeală la fiecare 100 mp Înlocuiți momeala consumată la fiecare 2-3 zile.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pastrați momeala în plicuri de 20g livrate în ambalaje de 1, 3, 5, 10, 20 și 25g

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Stația de momeală trebuie vizitată cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stația de momeli este intactă și pentru a îndepărta corpurile de rozătoare. Reaplicați momeala când este necesar

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vă rugăm să consultați acest punct în secțiunea 5, instrucțiuni de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Publicul larg

- Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de a o utiliza.

- Înainte de utilizarea produselor rodenticide, ar trebui luate în considerare metode de control ne-chimice (de exemplu, capcane).

- Îndepărtați alimentele care pot fi ușor obținute pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat.

- Stațiile de momeli ar trebui plasate în imediata vecinătate în care s-a observat activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, locurile de cuibărit, hârliile, găurile, etc.).

=Unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri.

- Nu deschideți plicurile care conțin momeala, cu excepția formulei de cereale în vrac (autorizate numai pentru profesioniști instruiți)

- Nu puneți stațiile de momeală la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă și a altor animale neștințite.

Plasați stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

- Nu amplasați stații de momeli în apropierea sistemelor de drenare a apei în care acestea pot intra în contact cu apa.

- Atunci când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

Scoateți momeala rămasă sau stațiile de momeli în perioada de tratament.

- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistențe la substanța activă.

- Tratamentul trebuie alternat cu alte tipuri de substanțe active pentru a evita apariția rezistenței și rezistenței încrucișate la rodenticide

Produsele rodenticide anticoagulante autorizate pentru utilizare de către utilizatorii publicului larg se utilizează în stațiile de momeală rezistente la intemperii din categoria 1 pentru produsele care urmează să fie autorizate pentru utilizare în clădiri și în jurul acestora, categoria 2, pentru produsele care urmează să fie autorizate numai pentru uz intern, că stațiile de momeală sunt ținute uscate și intacte.

Utilizatori profesioniști

- Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de a o utiliza.

- Efectuați o anchetă pre-dresaj a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării.

Îndepărtați alimentele care pot fi ușor obținute pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat.

- Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de prevenire a controlului (de exemplu, găuri de mufă, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și a reduce probabilitatea de reinvesiune.

- stațiile de momeală ar trebui plasate în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost observată anterior (de exemplu, căi de călătorie, locații de cuibărit, hârtii de alimentare, găuri, burrows etc.).

- Dacă este posibil, stațiile de momeli trebuie fixate la pământ sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise (a se vedea punctul 5.3 pentru informațiile care vor fi indicate pe etichetă).

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și un aviz care explică riscul otrăvirii primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire trebuie să fie să fie puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala ar trebui să fie asigurată astfel încât să nu poată fi trasă departe de stația de momeli.

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a animalelor de fermă și a altor animale nețintă.

- Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

- Atunci când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

Dacă absorbția momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în locurile următoare și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

- În cazul în care, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și nu poate fi observată o scădere a activității rozătoare, cauza probabilă trebuie determinată. În cazul în care au fost excluse alte elemente, este probabil că există rozătoare rezistente, deci luați în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

Scoateți momeala rămasă sau stațiile de momeli la sfârșitul perioadei de tratament.

- Nu deschideți plicurile care conțin momeala.

- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistențe la substanța activă.

- Tratamentul trebuie alternat cu alte tipuri de substanțe active pentru a evita apariția rezistenței și rezistenței încrucișate la rodenticide.

- rodenticide anticoagulante autorizate pentru utilizare de către utilizatori profesioniști se utilizează în stațiile de momeală rezistente la manipulare de categoria 1 pentru produsele care urmează să fie autorizate pentru utilizare în clădiri și în jurul clădirilor, categoria 2, pentru produsele care urmează a fi autorizate exclusiv pentru uz intern, stațiile de momeală sunt păstrate uscate și intacte

Profesioniști instruiți

- Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

- Efectuați o anchetă pre-dresaj a zonei infestată și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării.

- Îndepărtați alimentele care pot fi ușor obținute pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbura numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeală să fie mai dificil de realizat.

Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

- Produsul trebuie plasat în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost explorată anterior (de exemplu, căile de călătorie, locurile de cuibărit, hârliile, gropile, burrowurile etc.).

- Dacă este posibil, stațiile de momeli trebuie fixate la pământ sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise (a se vedea punctul 5.3 pentru informațiile care vor fi indicate pe etichetă).

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și trebuie anunțată o notificare care prezintă riscul otrăvirii primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

- Momeala ar trebui să fie asigurată astfel încât să nu poată fi trasă departe de stația de momeli.

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a animalelor de fermă și a altor animale nețintă.

- Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

- În cazul în care se impune evaluarea riscurilor: Purtați mănuși de protecție din material rezistent chimic de protecție în timpul fazei de manipulare a produsului.

- Atunci când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

Frecvența vizitelor la zona tratată trebuie să fie la discreția operatorului, în lumina anchetei efectuate la începutul tratamentului. Această frecvență ar trebui să fie în concordanță cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant.

- În cazul în care absorbția momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în locurile următoare și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile momelile sunt consumate în continuare și nu poate fi observată o scădere a activității rozătoare, trebuie determinată cauza probabilă. În cazul în care au fost excluse alte elemente, este probabil că există o rozătoare rezistentă, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, dacă este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

- Nu deschideți plicurile care conțin momeala.

- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistențe la substanța activă.

- Tratamentul trebuie alternat cu alte tipuri de substanțe active pentru a evita apariția rezistenței și rezistenței încrucișate la rodenticide



5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Publicul larg

- Luați în considerare măsurile preventive de control (găuri de priză, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinvesiune.

- Nu utilizați rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu, pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru detectarea activității rozătoarelor).

- Informațiile privind produsul (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să demonstreze în mod clar că:

- Produsul trebuie utilizat în stații de momeală rezistente la manipulare (de ex. "Utilizarea în stațiile de momeală rezistente la manipulare").

utilizatorii trebuie să eticheteze corespunzător stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 a CPS (de exemplu, "stații de momeală pentru etichete conform recomandărilor produsului").

- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în decurs de 35 de zile. Informațiile referitoare la produs (de exemplu, eticheta și / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacității până la sfârșitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să cheme un dăunător serviciu de control.

Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală.

- Aruncați rozătoarele în conformitate cu cerințele locale.

- Autorizația impune ca produsul să fie vopsit cu o culoare care să îi facă neatractive pentru fauna sălbatică și, în special, pentru păsări.

- Produsul trebuie să conțină un agent aversiv sau amarant.

Utilizatori profesioniști

- Dacă este posibil, înainte de tratament informați eventualii spectatori (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile acestora) despre campania de control al rozătoarelor.

- Pentru a reduce riscul otrăvirilor secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

- Produsele nu trebuie utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.

- Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau monitorizarea activităților rozătoarelor.

- Informațiile privind produsul (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să demonstreze în mod clar că:

- Produsul nu trebuie furnizat publicului larg (de ex. "Numai pentru profesioniști").

- Produsul trebuie utilizat în stații de momeală rezistente la manipulare (de ex. "Utilizarea în stațiile de momeală rezistente la manipulare").

- Utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 a CPS (de exemplu stațiile de momeală pentru etichete conform recomandărilor produsului).

- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în decurs de 35 de zile. Informațiile referitoare la produs (de exemplu, eticheta și / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacității până la sfârșitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să cheme un dăunător serviciu de control.

- Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

- Aruncați rozătoarele în conformitate cu cerințele locale.

- Autorizația impune ca produsul să fie vopsit cu o culoare care să îi facă neatractive pentru fauna sălbatică și, în special, pentru păsări.

- Produsul trebuie să conțină un agent aversiv sau amarant.

Profesioniști instruiți

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii spectatori despre campania de control al rozătoarelor.

- Informațiile privind produsul (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să demonstreze în mod clar că produsul trebuie furnizat numai utilizatorilor profesioniști instruiți care dețin certificarea care demonstrează respectarea cerințelor de formare aplicabile.

- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă.

- Produsele nu vor fi utilizate mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentelor sau tratamentelor permanente cu momeli în anumite condiții.

Nu rotiți utilizarea diferitelor anticoagulante cu o potență comparabilă sau mai slabă în ceea ce privește gestionarea rezistenței. Pentru utilizarea în rotație, luați în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.

- Nu spălați stațiile de momeală sau vasele folosite în punctele de momeală protejate și protejate cu apă între aplicații.

- Aruncați rozătoarele în conformitate cu cerințele locale.

- Autorizația impune ca produsul să fie vopsit cu o culoare care să îi facă neatractive pentru fauna sălbatică și, în special, pentru păsări.

- Produsul trebuie să conțină un agent aversiv sau amarant.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este ingerat, simptomele, care pot fi amânate, pot include gingii nazale și sângerări. În cazuri severe, pot apărea vânătăi și sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical / veterinar

În caz de:

Expunerea cutanată, spălați pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

Expunerea la ochi, clătiți ochii cu lichid de spălare a ochilor sau apă, păstrați capacul ochilor deschideți cel puțin 10 minute.

Expunerea orală, clătiți gura cu atenție cu apă. Nu da niciodată nimic

gura pentru persoana inconștientă. Nu provocați vărsături. Dacă este înghițit, căutați consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta produsului. Contactați a veterinar în caz de ingestie de către un animal de companie.

**NU LĂSAȚI PERSOANA SINGURĂ ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ
DACĂ ESTE NECESARĂ CONSULTANȚA MEDICALĂ, PĂSTRAȚI CUTIA CU PRODUS SAU ETICHETĂ LA ÎNDEMÂNĂ ȘI
CONTACTAȚI CENTRUL DE TOXICOLOGIE.**

Simptome clinice: diatele hemoragice, derivate din efectul antiprotrombinelor - timpul de protrombină prelungit - care poate fi evident la minim 24 - maximum 72 de ore (Un timp normal de protrombină atunci când pacientul este admis în spital, nu exclude diagnosticul).

Pentru a raporta incidentele de otrăvire la om, chemați centrul relevant de informații privind otrăvurile naționale. Includeți informații despre numărul autorizației produsului, denumirea comercială a produsului și substanța activă. Dacă este posibil, furnizați o copie a etichetei sau a fișei cu date de securitate.

- stațiile de momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: "nu se mișcă sau nu se deschide"; "conține o rodenticidă"; "numele produsului sau numărul autorizației"; "substanță activă (e)" și "în caz de incidente, apelați la un centru de otrăviretel.021.318.36.06

- Periculos pentru fauna sălbatică

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Publicul larg

- La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Utilizarea mănușilor este recomandată.

Utilizatori profesioniști

- La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Profesioniști instruiți

- La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-
- A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.
- Depozitați în locuri împiedicate de accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.
- Perioada de valabilitate: Produsul biocid este stabil timp de 24 de luni

6. Alte informații

-
- Datorită modului lor de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante au nevoie de 4 până la 10 zile pentru a fi eficiente după consumul de momeală.
- Rozătoarele pot fi purtători de boli. Nu atingeți rozătoarele goale cu mâinile goale, folosiți mănuși sau folosiți unelte cum ar fi cleștele atunci când le eliminați.
- Acest produs conține un agent de amarare și un colorant.