

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

DERATION PARAFFINATO

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2019/0003/MRA/ IT/2013/00085 AUT

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0001646-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	DERATION PARAFFINATO
--------------------------------	----------------------

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	COLKIM S.R.L.
	Adresă	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia Italia
Numărul autorizației	RO/2019/0003/MRA/ IT/2013/00085 AUT	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	RO-0001646-0000	
Data autorizației	14/12/2012	
Data de expirare a autorizației	31/12/2026	

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	COLKIM S.R.L.
Adresa producătorului	VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia
Adresa locurilor de producție	VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	ACTIVA S.R.L.
Adresa producătorului	Via Feltre, 32 20132 MILAN Italia
Adresa locurilor de producție	Dr. Tezza S.r.l. - via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	<p>H360D: Poate dăuna fătului.</p> <p>H372: Provoacă leziuni ale organelor SANGE în caz de expunere prelungită sau repetată { 1:indica#i calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol: }.</p>
Fraze de precau#ie	<p>P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite #i în#elese toate măsurile de securitate.</p> <p>P280: Purta#i mănuși de protecție.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P260: Nu inspira#i praful.</p> <p>P501: Arunca#i conținutul la reglementarilor nationale si internationale.</p>

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Soareci de casa- interior – profesioniști

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior INTERIOR
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 40 gr de produs pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Produs de momeală: unități de 20 gr Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie sa fie vizitate cel putin la 2-3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta rozatoarele moarte. Reumpleti cand este necesar.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand

Amplasarea statiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurați-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: pana la 24 de luni

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Sobolani - profesioniști - interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți Denumirea științifică: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior INTERIOR
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliată: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: 60-100 gr de produs pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unită#i de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg</p> <p>Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton</p>

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie vizitate intre 5 – 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamana dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta sobolanii morti. Reumpleti , cand este necesar.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand

Amplasarea statiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: pana la 24 de luni

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Soareci de casa si sobolani – profesionisti - in exterior in jurul cladirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide

Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti</p> <p>Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	<p>utilizare în exterior</p> <p>in exterior in jurul cladirilor</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: În cutii cu momeală</p> <p>Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: Soareci de casa: 40 gr de produs pentru punct de momeala; Sobolani: 60-100 gr de produs pentru punct de momeala</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare: daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unită#i de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg</p> <p>Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton</p>

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- protejati momeala de conditiile atmosferice (de ex. ploaie, zapada,etc.) Amplasati statiile de momeala in zone care nu se inunda.
- statiile de momeala trebuie sa fie vizitate (pentru soareci cel putin la fiecare 2-3 zile), (pentru sobolani numai 5 – 7 zile dupa inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta animalele moarte. Reumpleti, cand este necesar.
- Inlocuiti momeala din statiile de momeala in care momela a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie.

4.3.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu aplicati acest produs direct in zonele de locuinte

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand

Amplasarea statiilor de momeala este aproape de suprafetele de apa: canale , diguri, canale /santuri de irigatie) sau sistemele de scurgere, asigurati-va ca momeala nu este in contact cu apa.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: 24 luni

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Soareci de casa si sobolani – profesioniști instruiți - in interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata : 60-100 gr

	<p>produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare: This page contains the following errors:error on line 1 at column 280: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error. SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala</p> <p>SOBOLANI</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesioni#ti instrui#i
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unită#i de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg</p> <p>Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton</p>

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Indeprtati produsul ramas la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului , informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
 - Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil), pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
 - Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
 - Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie , cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
 - Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- In cazul unei momeli permanente:

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea “ Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Soareci de casa si sobolani – profesioniști instruiți - in exterior in jurul cladirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior in exterior in jurul cladirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare:

	<p>This page contains the following errors:error on line 1 at column 287: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error.</p> <p>SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala</p> <p>SOBOLANI</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unități de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg</p> <p>Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton</p>

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas, la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului, informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil) pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.

In cazul unei momeli permanente:

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa.

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea “ Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Sobolani – profesionisti instruiti - in exterior zone deschise

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti Denumirea stiintifica: Rattus rattus Denumirea comună: roof rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulti
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior in exterior zone deschise
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: În cutii cu momeală Descriere detaliata: momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru mamen, ca statii fixe rezistente de momeala.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial ; profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unități de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg până la 25 kg</p> <p>Material de ambalare: compoziție de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilena); plastic; carton</p>

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la finalul perioadei de folosire:

4.6.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului informați orice trecători posibili (de ex. utilizatori ai zonei tratate și împrejurimilor, cu privire la campania de control a rozătoarelor.
- Luați în considerare măsurile de prevenție (de ex., gauri de intrare, îndepărtați hrana potențială și băuturile cât mai departe posibil) pentru a îmbunătăți consumul și a reduce riscul de reinviație.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, cautați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandărilor furnizate de codul de bună practică.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente în locurile specifice, cu un risc potențial de reinviație când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folosiți produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicați produsul direct în cartiere.

În cazul unei momeli permanente:

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când se amplasează puncte de momeala aproape sistemul de canalizare și scurgere, asigurați-vă ca momeala nu intră în contact cu apa

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: 24 luni

Folosiți condiții specifice de depozitare și de viață a raft a produsului, în condiții normale de depozitare care nu sunt necesare, când condițiile de depozitare și viața de raft ale produsului în condiții normale de depozitare sunt implementate, așa cum este detaliat în secțiunea "Indicații generale de utilizare (profesioniști pregătiți).

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Cititi si urmati informatiile despre produs ca si orice alte informatii care insotesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vanzare inainte de a-l folosi.
- realizati un sondaj, inainte de a pune momeala, asupra zonei infestate si o evaluare in acele locuri pentru a identifica speciile de rozatoare, locul lor de activitate si pentru a determina cauza si extinderea infestarii.
- Indepartati hrana , care poate fi gasita usor de rozatoare (grau imprastiat sau resturi de mancare). In afara de acest aspect, nu curatati zona infestata chiar inainte de tratament, pentru ca aceasta face ca populatia de rozatoare sa fie deranjata si , in acest caz, acceptarea momelii devine mai dificila.
- Produsul trebuie sa fie folosit ca parte a unui sistem de management al infestarii (IPM), care include printre altele, masuri de igiena si, unde este posibil, metode fizice de control.
- Luati in considerare masuri preventive (de ex. gauri de intrare, indepartati mancarea si bautura), pentru a imbunatati inghitirea produsului si pentru a reduce posibilitatea unei reinvazii. Statiile de momeala trebuie sa fie amplasate in imediata vecinatate a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (alei , locuri in care isi fac cuibul, loturi de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).
- Produsul trebuie amplasat in imediata vecinatate a locurilor in care rozatoarele au fost observate anterior, locuri unde isi au cuibul, locuri de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).
- Unde se poate, momeala trebuie asezata pe sol sau pe alte structuri.
- Momeala trebuie sa aiba o eticheta clar scrisa, ca sa se vada ca contine rodenticide si ca nu trebuie mutata sau deschisa (vezi sectiunea 5.3 pentru informatii care trebuie prezentate pe eticheta.).
- Cand produsul este folosit in zone publice, zonele tratate trebuie marcate int impul perioadei tratamentului si trebuie sa existe o notificare , care sa explice riscul de otravire primara sau secundara prin natioagulant, ca si sa se indice primele masuri care trebuie luate in caz de otravire, care sa fie disponibile impreuna cu momeala.
- Momeala trebuie sa fi securizata, incat sa nu poata fi trasa din statia de momeala.
- Amplasati produsul incat sa nu poata fi atins de copii, pasari, animale de companie si animale de ferma si alte animale care nu sunt tinta.
- Amplasati produsul departe de hrana pentru consum, bauturi si hrana pentru animale, ca si departe de ustensile sau suprafete care intra in contact cu acestea.
- Purtati manusi de protectie rezistente la substante chimice (cauciuc) in timpul manuirii produsului.
- Cand folositi produsul, nu mancati, nu beti si nici nu fumati. Spalati-va pe maini si pe pielea direct expusa , dupa ce ati folosit produsul.
- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, conform sondajelor efectuate la inceputul tratamentului. Aceasta frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile furnizate de codul valabil de buna practica.
- Daca ingerarea momelii este scazuta , fata de dimensiunea aparenta a infestarii, considerati inlocuirea punctelor de momeala in alte locuri si posibilitatea de a schimba formula momelii.
- Daca dupa o perioada de 35 de zile de tratament , momeala continua sa fie consumata si activitatea rozatoarelor nu este micsorata, atunci trebuie stabilita cauza. Daca se exclud alte elemente , se pare ca rozatoarele sunt rezistente si trebuie luat in considerare un rodenticid non-anticoagulant, acolo unde se poate, sau se va folosi un rodenticid mai puternic. De asemenea, considerati folosirea de capcane ca o alterantiva a masurii de control.
- Indepartati momeala care ramane in statiile de momeala dupa terminarea tratamentului.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Produsul conține substanțe anticoagulante, dacă sunt ingerate, simptomele, care pot fi întârziate, includ sângerări nazale și ale gingiilor. În cazuri severe, pot apărea învîntirea și apariția sangelui în materiile fecale și în urină.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La finalul tratamentului, aruncați momeala, care nu a fost consumată, și ambalajul, conform cerințelor locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Țineți containerul închis și departe de lumina directă a soarelui.

Depozitați în locuri departe de accesul copiilor, pasărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

Viata de raft: 24 de luni.

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Din cauza modului tarziu de actionare, rodenticidul anticoagulant poate dura de la 4 la 10 zile ca sa fie eficient dupa consumul efectiv al momelii.

Rozatoarele sunt purtatoare de boli. Un atingeti rozatoarele moarte cu mainile goale, folositi manusi sau folositi unelte, cum sunt clestii, cand le aruncati.

Produsul contine un agent amar si o vopsea.